

LEMBRETES IMPORTANTES



PRESERVATIVO:

Retire-o **gratuitamente** em qualquer Centro de Saúde.



TRATAMENTO:

Procure o Centro de Saúde mais próximo de sua casa e **faça o teste de sífilis gratuitamente.**



PRÉ-NATAL:

Se você está, ou pretende ficar **grávida**, vá ao Centro de Saúde.

COMO USAR A CAMISINHA MASCULINA:


-  1 Ponha a camisinha quando o pênis estiver duro.
-  2 Aperte a ponta para sair o ar (é na ponta que o esperma vai ficar).
-  3 Desenrole a camisinha até a base do pênis, cuidadosamente.
-  4 Use somente lubrificante à base de água.
-  5 Tire a camisinha após a relação sexual com o pênis ainda duro.
-  6 Depois, dê um nó e jogue-a no lixo com cuidado.

COMO USAR A CAMISINHA FEMININA:

-  1 Encontre uma posição confortável.
-  2 Segure a camisinha pela argola interna (é a argola que está solta dentro da camisinha).
-  3 Aperte a argola interna e a introduza na vagina com o dedo indicador.
-  4 Empurre a argola com o dedo até sentir o colo do útero (fundo da vagina).
-  5 A camisinha deve cobrir o colo do útero e recobrir a vagina.
-  6 Após a relação sexual, torça a argola externa e puxe a camisinha com cuidado. Jogue-a no lixo e nunca no vaso sanitário.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

- **TODOS OS CENTROS DE SAÚDE** - são 152 unidades distribuídas nas regionais
- **CTA/UAI:** Shopping UAI - R. Saturnino de Brito, 17 - 3º andar - Centro | **3246-7007**
- **CTA/SAE Sagrada Família:** R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | **3277-5757**
- **CTR/DIP Orestes Diniz:** Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | **3277-4341**
- **URS Centro-Sul:** R. Paraíba, 890 - Funcionários | **3277-5356**



Outubro: mês de combate à

SÍFILIS

VOCÊ PODE TER E NÃO SABER



**FAÇA O TESTE.
É SIMPLES, RÁPIDO
E GRATUITO.**

Procure o centro de saúde mais próximo.
Sífilis tem cura. Somos todos vulneráveis.
Use camisinha.



O QUE É

A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou da mãe para o bebê durante a gravidez. No início de seu ciclo, apresenta sintomas que podem desaparecer com o tempo, dando a impressão de que o paciente está curado. No entanto, ela continua se desenvolvendo de maneira crônica e silenciosa.

COMO SE PEGA

Através de relação sexual anal, vaginal e oral sem o uso da camisinha, com pessoa que tem sífilis.

GESTANTE


Durante a gravidez pode ocorrer a transmissão da infecção da mãe para o bebê. É importante que TODAS as gestantes e parcerias sexuais façam os exames para IST no pré-natal.

TRATAMENTO

Está disponível em todos os centros de saúde. Todas as parcerias sexuais devem ser testadas e tratadas para sífilis.

RELAÇÃO SEXUAL SEM CAMISINHA

Se você já fez sexo sem proteção, peça seu exame. Você pode estar com sífilis, mesmo sem sintomas.



SINTOMAS

Sífilis primária

- Queda dos cabelos ou das sobrancelhas
- Ferida na boca
- Ferida no pênis, no ânus, na vagina

Sífilis secundária

- Manchas no corpo e/ou nas palmas das mãos e nas plantas dos pés
- Febre e dor no corpo
- Ínguas

Sífilis latente

- Os sintomas desaparecem sem o tratamento e a infecção permanece silenciosa



manchas nos pés e nas mãos

ATENÇÃO

Os sintomas podem desaparecer sem o tratamento, mas a pessoa **continua infectada**, podendo transmitir a doença e apresentar complicações graves, como:

- cegueira e/ou surdez
- transtornos psiquiátricos
- problemas cardíacos
- paralisia
- doença cerebral
- morte