

HIV, SÍFILIS E HEPATITES B e C PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Preservativo: Retire em qualquer Centro de Saúde.

Testagem para HIV, sífilis e hepatites virais: Procure o Centro de Saúde próximo de sua casa ou um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Pré-natal: Vá ao Centro de Saúde próximo de sua casa, faça acompanhamento e teste para HIV, sífilis e hepatites.

PEP Acidente com material biológico: Procure uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

PEP Sexual: Procure um Serviço de Atenção Especializada (SAE), das 7h às 18h, ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), à noite e nos fins de semana.

PrEP: Faça uma avaliação de indicação para uso nos serviços de atenção especializada - URS Centro-Sul, CTA Sagrada Família, CTA UAI e CTR Orestes Diniz.

Tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis: Procure o Centro de Saúde próximo de sua casa ou serviço de IST da URS Centro-Sul.

Tratamento de HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais:

Sífilis: Centro de Saúde (início imediato).

HIV - Hepatites B e C: URS Centro-Sul, CTR-DIP Orestes Diniz, CTA Sagrada Família e UNIFENAS.

O agendamento para consulta com o médico especialista será realizado em um Centro de Saúde ou um Centro de Testagem.

LOCAIS DE TESTAGEM RÁPIDA

O SUS oferece os testes gratuitamente nos Centros de Saúde e Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Confira os endereços dos 152 Centros de Saúde em pbh.gov.br/saude.

Outras unidades que realizam o teste:

CTA UAI | Shopping UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar - Centro | 3246-7007

CTA/SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757

CTR DIP Orestes Diniz: Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341

URS Centro-Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356

PROTEJA-SE! FAÇA O TESTE RÁPIDO

SÍFILIS · HIV HEPATITES B e C



É RÁPIDO, SIGILOS E GRATUITO.



SUS-BH 

 **PREFEITURA
BELO HORIZONTE**
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

TESTES RÁPIDOS

Práticos e de fácil execução, são realizados com a coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo. O resultado sai em, no máximo, 20 minutos. Veja abaixo as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) que podem ser diagnosticadas pela testagem rápida.

HIV

O teste rápido para HIV deve ser realizado com regularidade e sempre que houver situações de risco (acidentes com material biológico, violência sexual ou relação sexual sem uso de preservativo, por exemplo).

Procure a unidade de saúde até 72 horas após exposição de risco e faça uso da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), conforme orientação do profissional de saúde.

AUTOTESTE - HIV

É um teste rápido que pode ser feito a qualquer momento, em um local conveniente, na companhia de uma pessoa de confiança (caso seja necessário).

O resultado reagente (positivo) indica que a pessoa pode estar infectada pelo HIV. Entretanto, esse resultado não é definitivo. Nesse caso, é necessário procurar o serviço de saúde para realizar outros testes que confirmarão ou não o resultado reagente.

SÍFILIS

O teste rápido para sífilis também deve ser realizado com regularidade e sempre que houver situação de risco (relação sexual sem o uso de preservativo, por exemplo).

A sífilis tem cura! O tratamento está disponível em todos os Centros de Saúde e deve ser realizado imediatamente. Informe-se com um profissional de saúde.

HEPATITES

Os testes de hepatites B e C são recomendados para:

- gestantes, preferencialmente no primeiro trimestre do pré-natal
- pessoas que não foram vacinadas contra a hepatite B
- pessoas que tiveram relação sexual desprotegida ou acidentes com perfurocortantes.

IMPORTANTE: Pessoas que receberam transfusão de sangue e/ou realizaram cirurgias ou transplantes de órgãos antes de 1993 devem realizar o teste para hepatite C. A doença tem cura e pode ser tratada pelo SUS gratuitamente.

Lembre-se de que existe uma vacina para prevenir a hepatite B. Procure uma unidade de saúde para se informar.

GESTANTES

Todas as gestantes e suas parcerias sexuais devem fazer os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, preferencialmente no primeiro trimestre do pré-natal.

A realização dos testes pode ajudar a prevenir a transmissão vertical das infecções para o bebê.

JANELA IMUNOLÓGICA

É o período entre a infecção por um determinado vírus (HIV, hepatites etc.) e a produção de anticorpos pelo organismo em uma quantidade suficiente para serem detectados.

Os testes realizados durante esse período, porém, podem dar resultados negativos, mesmo se a pessoa estiver infectada. Em casos de resultados negativos em que persistir a suspeita de infecção, o teste deve ser repetido após, pelo menos, 30 dias para HIV/sífilis e 60 dias para hepatites virais B e C.