

# SÍFILIS CONGÊNITA

FAÇA O TESTE DURANTE  
O PRÉ-NATAL E PREVINA A  
TRANSMISSÃO DA PESSOA  
GESTANTE PARA O BEBÊ

## LOCAIS DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM SÍFILIS CONGÊNITA

**CENTROS DE SAÚDE** São 152 unidades distribuídas nas 9 Regionais

**CTR/DIP ORESTES DINIZ** Alameda Vereador Álvaro Celso, 241  
Santa Efigênia | 3277-4341

**SERVIÇO DE PEDIATRIA /FELUMA/ CIÊNCIAS MÉDICAS** Avenida dos Andradas, 1.093  
Santa Efigênia | 3248-7159

## LOCAIS DE TESTAGEM

**CENTROS DE SAÚDE** São 152 unidades distribuídas nas 9 Regionais

**CTA/HIPERCENTRO** Shopping Caetés - Rua Caetés, 466, piso Caetés  
Centro | 3246-7007

**CTA/SAE SAGRADA FAMÍLIA** Rua Joaquim Felício, 141  
Sagrada Família | 3277-5757

**CTR/DIP ORESTES DINIZ** Alameda Vereador Álvaro Celso, 241  
Santa Efigênia | 3277-4341

**URS CENTRO-SUL** Rua Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356

MAIS INFORMAÇÕES:  
[PBH.GOV.BR/SIFILIS](http://PBH.GOV.BR/SIFILIS)



SAÚDE



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

trabalhoenergiacorção

## CUIDADOS COM A SÍFILIS

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que possui tratamento e cura! Quando uma pessoa gestante contrai a infecção e não a trata corretamente, ela pode ser transmitida para o feto durante a gestação e o parto. Neste caso ela é chamada de "sífilis congênita".

### FORMAS DE INFECÇÃO

- Relações sexuais (oral, anal e vaginal) sem preservativo com pessoa que tem sífilis.
- Transmissão vertical: da pessoa gestante para o feto durante a gestação ou o parto.

### DIAGNÓSTICO

- Teste Rápido para Sífilis: pode ser realizado em qualquer centro de saúde de Belo Horizonte. O resultado é entregue em apenas 30 minutos.

### ONDE REALIZAR O TRATAMENTO

- O tratamento é realizado gratuitamente em todos os centros de saúde de Belo Horizonte.


### TRANSMISSÃO VERTICAL

- Até 80% da transmissão vertical da sífilis ocorre dentro do útero.
- Das gestações de pessoas com sífilis não tratada adequadamente, estima-se que:
  - 11% resultarão em morte fetal;
  - 13% dos bebês serão prematuros e/ou terão baixo peso ao nascer;
  - 20% de recém-nascidos apresentarão sinais sugestivos de sífilis congênita (má-formação do feto, alterações ósseas, surdez, cegueira, entre outros).

### FORMAS DE PREVENIR A TRANSMISSÃO VERTICAL

- É importante que toda pessoa gestante realize o pré-natal corretamente.
- As parcerias sexuais de gestantes precisam testar e, se necessário, tratar.

## LEMBRETES IMPORTANTES



#### PRESERVATIVO:

Retire-o gratuitamente em qualquer centro de saúde.



#### PARCERIAS:

A testagem e o acompanhamento de gestantes e de suas parcerias sexuais durante o pré-natal contribuem para o controle da sífilis congênita. Faça o teste pelo menos no 1<sup>a</sup> e no 3<sup>a</sup> trimestre de gestação ou em situações de exposições de risco.



#### PRÉ-NATAL:

Se você está gestante ou pretende engravidar, vá ao centro de saúde.

