

PREVENÇÃO COMBINADA

A prevenção combinada busca associar várias formas de proteção para reduzir o risco de transmissão das IST.

PRESERVATIVOS INTERNO (FEMININO) E EXTERNO (MASCULINO)

Eficazes para prevenir as IST e a gravidez não planejada.

IMUNIZAÇÃO

Vacine-se contra o HPV e as hepatites A e B.

TESTES RÁPIDOS

Diagnóstico rápido de HIV, sífilis, hepatites B e C. Faça o teste regularmente!

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Se você passou por uma situação de risco, procure atendimento para tratamento precoce.

ANTIRRETROVIRAL (ARV)

O uso de antirretroviral impede que a infecção do HIV evolua para a aids.

REDUÇÃO DE DANOS

Estratégia que visa minimizar os riscos associados ao uso de drogas.

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO (PEP)

Em caso de exposição de risco ao HIV, busque atendimento em até 72h.

PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PrEP)

Antirretroviral utilizado por pessoas que têm risco aumentado de exposição ao HIV.

PRÉ-NATAL

A testagem rápida deve ser realizada durante a gestação. Busque orientação durante o pré-natal.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

TESTAGEM RÁPIDA

- **TODOS OS CENTROS DE SAÚDE**
- **CTA HIPERCENTRO**
R. Caetés, 466 - Piso Caetés Centro | 3246-7007
- **CTA SAE SAGRADA FAMÍLIA**
R. Joaquim Felício, 141 Sagrada Família | 3277-5757

TRATAMENTO

- **TODOS OS CENTROS DE SAÚDE**
- **URS CENTRO-SUL***
R. Paraíba, 890 Funcionários | 3277-5356
- **CTR DIP ORESTES DINIZ***
Al. Vereador Álvaro Celso, 241 Santa Efigênia | 3277-4341
- **SAE SAGRADA FAMÍLIA***
R. Joaquim Felício, 141 Sagrada Família | 3277-5757
- **HOSP. EDUARDO DE MENEZES***
R. Dr. Cristiano Rezende, 2.213 Bonsucesso | 3328-5000
- **SAE UNIFENAS***
R. Professor Hermínio Guerra, 75 Itapoã | 2536-5655

**Marcação de consulta via agendamento para HIV e hepatites virais.*



Para mais informações, acesse pbh.gov.br/ist

IST

Infecções Sexualmente Transmissíveis

PREVINA-SE.
TRATE-SE.
FAÇA O TESTE.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE

O QUE É UMA IST?

DEFINIÇÃO

As IST são infecções transmitidas sexualmente, causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos.

TRANSMISSÃO

As IST são transmitidas principalmente por contato sexual, incluindo sexo vaginal, anal e oral. Algumas IST podem ser transmitidas de mãe para filho durante a gravidez, o parto e a amamentação.

COMO IDENTIFICAR

As IST podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos ou verrugas no pênis, na vagina, na boca e no ânus. Além desses sintomas, pode haver também dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas, vermelhidão e inchaço.

TRATAMENTO

O uso de medicamentos adequados cura a maior parte das IST. Para o HIV e a hepatite B, o tratamento leva ao controle da infecção e à melhora da qualidade de vida.

Ao perceber algum sinal ou sintoma, procure o serviço de saúde.

SAIBA MAIS SOBRE A PREVENÇÃO ÀS IST


POSSO TER MAIS DE UMA IST?

Sim. Pessoas com IST têm uma chance maior de adquirir outra infecção. Feridas na região genital causadas por sífilis podem facilitar a entrada do HIV no organismo.



QUAIS IST TÊM CURA?

Hepatite C, sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase.



POSSO PEGAR NOVAMENTE A IST APÓS O TRATAMENTO?

Sim. Na ausência de prevenção, pode ocorrer a reinfeção.



AS PARCERIAS SEXUAIS DEVEM SER ALERTADAS QUANDO HOVER UM DIAGNÓSTICO DE IST?

É fundamental que as parcerias sejam testadas e tratadas. Assim, é possível quebrar o ciclo de transmissão.

