

PROVA DO LAÇO

A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de Dengue do **Grupo A**.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



Técnica: 1) Aferir a pressão arterial. 2) Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica. 3) Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. 4) Soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, **abaixo da prega do cotovelo**. 5) Escolher o local de maior concentração de petéquias e posicionar o quadrado vazado ao lado. 6) Contar o número de petéquias dentro do quadrado.

Resultado positivo =>

- ADULTO: 20 ou mais petéquias dentro do quadrado.
- CRIANÇA: 10 ou mais petéquias dentro do quadrado.

PROVA DO LAÇO

A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de Dengue do **Grupo A**.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



Técnica: 1) Aferir a pressão arterial. 2) Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica. 3) Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. 4) Soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, **abaixo da prega do cotovelo**. 5) Escolher o local de maior concentração de petéquias e posicionar o quadrado vazado ao lado. 6) Contar o número de petéquias dentro do quadrado.

Resultado positivo =>

- ADULTO: 20 ou mais petéquias dentro do quadrado.
- CRIANÇA: 10 ou mais petéquias dentro do quadrado.

PROVA DO LAÇO

A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de Dengue do **Grupo A**.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



Técnica: 1) Aferir a pressão arterial. 2) Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica. 3) Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. 4) Soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, **abaixo da prega do cotovelo**. 5) Escolher o local de maior concentração de petéquias e posicionar o quadrado vazado ao lado. 6) Contar o número de petéquias dentro do quadrado.

Resultado positivo =>

- ADULTO: 20 ou mais petéquias dentro do quadrado.
- CRIANÇA: 10 ou mais petéquias dentro do quadrado.

PROVA DO LAÇO

A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de Dengue do **Grupo A**.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



Técnica: 1) Aferir a pressão arterial. 2) Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica. 3) Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. 4) Soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, **abaixo da prega do cotovelo**. 5) Escolher o local de maior concentração de petéquias e posicionar o quadrado vazado ao lado. 6) Contar o número de petéquias dentro do quadrado.

Resultado positivo =>

- ADULTO: 20 ou mais petéquias dentro do quadrado.
- CRIANÇA: 10 ou mais petéquias dentro do quadrado.

PROVA DO LAÇO

A prova do laço deve ser realizada em pacientes com suspeita clínica de Dengue do **Grupo A**.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



Técnica: 1) Aferir a pressão arterial. 2) Insuflar novamente o manguito até o ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica. 3) Manter o manguito insuflado por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. 4) Soltar o ar do manguito, retirá-lo do braço do paciente e procurar por petéquias no antebraço, **abaixo da prega do cotovelo**. 5) Escolher o local de maior concentração de petéquias e posicionar o quadrado vazado ao lado. 6) Contar o número de petéquias dentro do quadrado.

Resultado positivo =>

- ADULTO: 20 ou mais petéquias dentro do quadrado.
- CRIANÇA: 10 ou mais petéquias dentro do quadrado.