



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
EDITAL Nº 1/2024**

CADERNO DE PROVA – TARDE

**PRÉ-REQUISITO
CLÍNICA MÉDICA OU
CIRURGIA GERAL**

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **50 (cinquenta)** questões objetivas, numeradas de **1 a 50**, a respeito do conteúdo de:

- **Clínica Médica;**
- **Cirurgia Geral.**

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de **2 (duas)** horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após o decurso de **1 (uma)** hora do horário de início da prova, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.

8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.

9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.

10. Boa prova!

CLÍNICA MÉDICA**Questão 1**

Paciente de 63 anos com histórico de diabetes mellitus tipo 2 é admitido com quadro de dor precordial associada a sudorese e náuseas. ECG revela infradesnível de ST em derivações anteriores. Qual é a conduta inicial mais indicada?

- (A) Administração de nitroglicerina sublingual.
- (B) Realização de cateterismo cardíaco imediato.
- (C) Anticoagulação e terapia antiplaquetária.
- (D) Início de corticoides intravenosos.

Questão 2

Homem de 57 anos, hipertenso, apresenta cefaleia súbita e intensa acompanhada de náuseas. Ao exame físico, encontra-se com pressão arterial de 180/110 mmHg e rigidez de nuca. O exame mais adequado para o diagnóstico inicial é:

- (A) Ressonância magnética do crânio.
- (B) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste.
- (C) Punção lombar.
- (D) Ultrassonografia doppler de vasos intracranianos.

Questão 3

Paciente de 56 anos apresenta perda de peso, tosse produtiva e sudorese noturna há dois meses. O exame de imagem revela infiltrado pulmonar em lobo superior direito. O próximo passo diagnóstico é:

- (A) Tomografia computadorizada de tórax.
- (B) Prova tuberculínica (PPD).
- (C) Baciloscopia de escarro.
- (D) Teste sorológico para HIV.

Questão 4

Homem de 45 anos é admitido com história de etilismo crônico e icterícia. Apresenta distensão abdominal e edema de membros inferiores. O exame físico revela circulação colateral abdominal e hepatoesplenomegalia. O exame mais indicado para confirmar a etiologia e gravidade da doença hepática é:

- (A) Ressonância magnética de abdome.
- (B) Biópsia hepática.
- (C) Elastografia hepática.
- (D) Ultrassonografia com doppler de abdome.

Questão 5

Mulher de 30 anos, previamente saudável, apresenta quadro súbito de dor torácica pleurítica e dispneia. No exame físico, observa-se taquipneia e diminuição de murmúrio vesicular em hemitórax direito. O diagnóstico mais provável e o exame de imagem inicial são:

- (A) Pneumonia; radiografia de tórax.
- (B) Pneumotórax; tomografia computadorizada de tórax.
- (C) Pneumotórax; radiografia de tórax.
- (D) Derrame pleural; ultrassonografia de tórax.

Questão 6

Homem de 60 anos, com história de hipertensão e diabetes, é admitido com quadro de tontura e fraqueza muscular progressiva. Exames laboratoriais revelam hipocalcemia importante. A condição mais provável que justifica o quadro é:

- (A) Hipoparatiroidismo.
- (B) Síndrome de Cushing.
- (C) Feocromocitoma.
- (D) Doença de Addison.

Questão 7

Mulher de 38 anos apresenta queixa de poliúria, polidipsia e perda de peso. Exames laboratoriais revelam glicemia de jejum de 250 mg/dL e HbA1c de 9%. Qual é a orientação inicial mais indicada?

- (A) Início de metformina e acompanhamento ambulatorial.
- (B) Insulinoterapia e controle rigoroso de glicemia.
- (C) Dieta hipoglicídica e observação.
- (D) Aumento da ingestão hídrica e restrição de sódio.

Questão 8

Paciente de 60 anos com DPOC apresenta episódios de exacerbação com tosse e secreção purulenta. O exame laboratorial confirma aumento de leucócitos e PCR elevado. O antibiótico de escolha para este paciente é:

- (A) Amoxicilina.
- (B) Ceftriaxona.
- (C) Ciprofloxacina.
- (D) Azitromicina.

Questão 9

Homem de 45 anos é atendido com quadro de fraqueza muscular progressiva e ptose palpebral bilateral. Exame de eletroneuromiografia sugere bloqueio de transmissão neuromuscular. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Síndrome de Guillain-Barré.
- (B) Miastenia gravis.
- (C) Esclerose lateral amiotrófica.
- (D) Polineuropatia desmielinizante.

Questão 10

Homem de 28 anos é admitido com quadro de febre, dor abdominal e diarreia sanguinolenta. Exame endoscópico revela inflamação contínua do cólon. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Colite pseudomembranosa.
- (C) Colite ulcerativa.
- (D) Síndrome do intestino irritável.

Questão 11

Paciente de 70 anos com histórico de fibrilação atrial não tratada apresenta dor intensa e súbita em membro inferior direito, com palidez e ausência de pulsos. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Trombose venosa profunda.
- (B) Embolia arterial aguda.
- (C) Doença arterial periférica.
- (D) Síndrome compartimental.

Questão 12

Paciente de 65 anos, diabético e obeso, apresenta dor abdominal no quadrante inferior esquerdo e febre. O exame de imagem mostra diverticulite aguda. Qual é a conduta inicial mais indicada?

- (A) Observação e dieta líquida.
- (B) Antibióticos orais e repouso.
- (C) Cirurgia de urgência.
- (D) Antibióticos intravenosos e internação.

Questão 13

Homem de 40 anos, previamente hígido, é admitido com quadro de febre e dispneia. A radiografia de tórax revela infiltrado intersticial difuso. O diagnóstico mais provável, considerando ausência de comorbidades e hábitos de risco, é:

- (A) Pneumocistose.
- (B) Tuberculose miliar.
- (C) Pneumonia por Mycoplasma.
- (D) Embolia pulmonar.

Questão 14

Paciente de 70 anos com história de insuficiência cardíaca congestiva apresenta hiponatremia e aumento do peso corporal. Qual é a causa mais provável desta hiponatremia?

- (A) Síndrome de secreção inapropriada de ADH.
- (B) Hipovolemia.
- (C) Retenção hídrica secundária à insuficiência cardíaca.
- (D) Hipotireoidismo.

Questão 15

Mulher de 60 anos com queixas de fadiga e palidez. Exames mostram hemoglobina de 8 g/dL e VCM de 70 fL. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia megaloblástica.
- (C) Anemia aplástica.
- (D) Talassemia minor.

Questão 16

Paciente de 50 anos, tabagista, com história de DPOC, é admitido com dispneia intensa e sibilância. Qual dos medicamentos abaixo é mais indicado para alívio imediato dos sintomas?

- (A) Salbutamol inalatório.
- (B) Prednisona oral.
- (C) Brometo de ipratrópio oral.
- (D) Oxigenoterapia contínua.

Questão 17

Mulher de 72 anos com fratura de fêmur proximal. Ao realizar exames pré-operatórios, detecta-se hipercalcemia. A principal hipótese diagnóstica para a hipercalcemia é:

- (A) Hiperparatireoidismo primário.
- (B) Hipovitaminose D.
- (C) Doença de Paget.
- (D) Insuficiência renal.

Questão 18

Homem de 63 anos apresenta edema de membros inferiores e dispneia aos esforços. Exames revelam BNP elevado e fração de ejeção reduzida. Qual é a classe de medicamentos indicada para reduzir a mortalidade neste caso?

- (A) Bloqueadores de canal de cálcio.
- (B) Diuréticos tiazídicos.
- (C) Inibidores da ECA.
- (D) Digoxina.

Questão 19

Paciente de 58 anos, obeso e sedentário, apresenta dor no peito e falta de ar ao esforço físico. Qual exame é o mais indicado para confirmar o diagnóstico de angina estável?

- (A) Cateterismo cardíaco.
- (B) Cintilografia de perfusão miocárdica.
- (C) Eletrocardiograma em repouso.
- (D) Ecocardiograma de estresse.

Questão 20

Homem de 70 anos com história de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresenta aumento súbito de dispneia e sibilos. O próximo passo terapêutico mais adequado é:

- (A) Prednisona oral.
- (B) Oxigenoterapia contínua.
- (C) Diuréticos.
- (D) Ventilação mecânica invasiva.

Questão 21

Paciente de 55 anos apresenta quadro de dor e edema na panturrilha após longa viagem de avião. O exame mais indicado para investigação é:

- (A) Ultrassonografia com doppler venoso.
- (B) Flebografia.
- (C) Tomografia computadorizada.
- (D) Radiografia simples.

Questão 22

Paciente de 50 anos com diagnóstico de hipertensão resistente ao tratamento apresenta episódios de cefaleia intensa e sudorese. O exame mais indicado para investigação da causa é:

- (A) Tomografia de crânio.
- (B) Dosagem de catecolaminas urinárias.
- (C) Ecocardiograma.
- (D) Ressonância magnética de crânio.

Questão 23

Paciente de 47 anos com insuficiência renal crônica é admitido com hipercalemia severa. Qual é a primeira medida terapêutica recomendada?

- (A) Furosemida IV.
- (B) Diálise imediata.
- (C) Insulina e glicose IV.
- (D) Restrição de potássio na dieta.

Questão 24

Homem de 52 anos, tabagista, apresenta tosse crônica e dispneia. A espirometria confirma VEF1 reduzido com padrão obstrutivo. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Asma.
- (B) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- (C) Bronquiolite.
- (D) Tuberculose.

Questão 25

Homem de 60 anos apresenta alteração visual súbita e cefaleia. A fundoscopia revela papiledema. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Hipertensão intracraniana.
- (B) Glaucoma.
- (C) Retinopatia diabética.
- (D) Degeneração macular.

CIRURGIA GERAL**Questão 26**

Um paciente de 54 anos, tabagista e diabético, apresenta dor abdominal intensa e súbita localizada em epigástrio, irradiando para as costas. Exame físico revela sinais de hipotensão. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Úlcera péptica perfurada.
- (B) Pancreatite aguda.
- (C) Dissecção de aorta abdominal.
- (D) Aneurisma de aorta abdominal roto.

Questão 27

Homem de 65 anos apresenta-se com massa pulsátil na região inguinal direita. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hérnia inguinal indireta.
- (B) Aneurisma de artéria femoral.
- (C) Linfadenopatia inguinal.
- (D) Abscesso inguinal.

Questão 28

Paciente de 42 anos, submetido a colecistectomia laparoscópica, apresenta dor abdominal intensa e febre no segundo dia pós-operatório. Qual é o exame diagnóstico mais indicado?

- (A) Radiografia de abdome.
- (B) Tomografia computadorizada de abdome.
- (C) Ultrassonografia abdominal.
- (D) Laparoscopia exploratória.

Questão 29

Uma mulher de 70 anos, com dor abdominal e vômitos, apresenta distensão e timpanismo à percussão abdominal. O exame radiológico mostra níveis hidroaéreos em alças intestinais dilatadas. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Obstrução intestinal.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Úlcera gástrica.

Questão 30

Paciente com história de dor epigástrica crônica apresenta-se com hematêmese. A endoscopia revela uma úlcera no bulbo duodenal com bordas elevadas. Qual é a causa mais provável dessa úlcera?

- (A) Infecção por *H. pylori*.
- (B) Uso de anti-inflamatórios não esteroides.
- (C) Tumor gástrico.
- (D) Refluxo gastroesofágico.

Questão 31

Homem de 50 anos com dor abdominal e icterícia é diagnosticado com colelitíase e coledocolitíase. Qual é a melhor conduta terapêutica inicial?

- (A) Colecistectomia laparoscópica.
- (B) Esfincterotomia endoscópica com retirada do cálculo.
- (C) Administração de antibiótico profilático.
- (D) Observação clínica.

Questão 32

Um paciente de 40 anos é atendido com dor e tumefação no testículo direito após episódio recente de infecção urinária. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Cisto epididimário.
- (B) Epididimite aguda.
- (C) Torção testicular.
- (D) Varicocele.

Questão 33

Homem de 68 anos apresenta disfagia progressiva para sólidos e líquidos, com perda de peso significativa. A endoscopia mostra uma lesão estenosante no esôfago distal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Acalasia.
- (B) Refluxo gastroesofágico.
- (C) Câncer de esôfago.
- (D) Divertículo de Zenker.

Questão 34

Paciente de 57 anos é submetido a uma colectomia devido a diverticulite complicada. No pós-operatório, apresenta febre e dor abdominal. Qual exame é o mais indicado para investigar a causa?

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Tomografia computadorizada de abdome.
- (C) Ultrassonografia abdominal.
- (D) Endoscopia digestiva alta.

Questão 35

Paciente de 72 anos, com histórico de hipertensão, apresenta-se com quadro de obstrução intestinal. A tomografia revela uma massa na região ileocecal. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Câncer de cólon.
- (C) Volvulo de sigmoide.
- (D) Aderências intestinais.

Questão 36

Homem de 60 anos, com histórico de colelitíase, apresenta dor no quadrante superior direito e febre. O ultrassom mostra espessamento da parede da vesícula e líquido pericolecístico. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pancreatite.
- (B) Colecistite aguda.
- (C) Hepatite.
- (D) Cisto hepático.

Questão 37

Homem de 55 anos com hérnia inguinal encarcerada é submetido a cirurgia de emergência. Durante a cirurgia, observa-se necrose do segmento intestinal herniado. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Redução do segmento herniado.
- (B) Ressecção do segmento necrótico com anastomose primária.
- (C) Drenagem da hérnia.
- (D) Observação clínica pós-operatória.

Questão 38

Um paciente de 52 anos apresenta disfagia para sólidos e líquidos, perda de peso e tosse crônica. A endoscopia revela esôfago dilatado e contrações anormais. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Câncer de esôfago.
- (B) Acalasia.
- (C) Refluxo gastroesofágico.
- (D) Estenose esofágica.

Questão 39

Paciente de 28 anos apresenta dor abdominal intensa após trauma contuso. A ultrassonografia revela líquido livre na cavidade abdominal e lesão hepática. Qual é a conduta inicial recomendada?

- (A) Observação clínica.
- (B) Cirurgia exploratória.
- (C) Embolização seletiva.
- (D) Antibioticoterapia profilática.

Questão 40

Uma mulher de 60 anos com histórico de tabagismo e dor abdominal crônica é diagnosticada com aneurisma de aorta abdominal. Qual é o critério de indicação para cirurgia?

- (A) Presença de dor lombar.
- (B) Diâmetro maior que 5,5 cm.
- (C) Idade superior a 65 anos.
- (D) História familiar de aneurisma.

Questão 41

Homem de 50 anos é admitido com dor abdominal intensa e febre após colecistectomia laparoscópica recente. O exame físico revela defesa muscular. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Perfuração intestinal.
- (C) Abscesso subfrênico.
- (D) Obstrução intestinal.

Questão 42

Paciente de 45 anos, previamente saudável, apresenta dor em hipocôndrio direito, icterícia e febre alta. O ultrassom mostra dilatação do colédoco e cálculos biliares. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Colelitíase.
- (B) Coledocolitíase com colangite.
- (C) Hepatite viral aguda.
- (D) Pancreatite aguda.

Questão 43

Homem de 72 anos é admitido com dor abdominal intensa e súbita. A tomografia revela alças intestinais dilatadas e ausência de fluxo sanguíneo em um segmento do intestino delgado. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Isquemia mesentérica aguda.
- (B) Obstrução intestinal por aderências.
- (C) Apendicite aguda.
- (D) Doença diverticular complicada.

Questão 44

Mulher de 60 anos apresenta abaulamento doloroso na cicatriz de uma cirurgia abdominal prévia. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hérnia inguinal.
- (B) Hérnia incisional.
- (C) Lipoma.
- (D) Abscesso de parede.

Questão 45

Paciente de 48 anos apresenta dor abdominal intensa em fossa ilíaca direita com anorexia e febre. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Colecistite aguda.
- (D) Diverticulite.

Questão 46

Um homem de 68 anos apresenta-se com dor abdominal intensa e súbita, associada a hipotensão. O ultrassom revela grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Ruptura de aneurisma de aorta abdominal.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Peritonite por perfuração gástrica.

Questão 47

Um paciente de 30 anos com dor perianal e febre é diagnosticado com abscesso perianal. Qual é o tratamento inicial recomendado?

- (A) Antibioticoterapia isolada.
- (B) Drenagem cirúrgica.
- (C) Aplicação de calor local.
- (D) Observação.

Questão 48

Homem de 60 anos apresenta dor torácica e disfagia. A tomografia mostra dilatação do esôfago e espessamento da parede. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Esofagite infecciosa.
- (B) Acalasia.
- (C) Divertículo de Zenker.
- (D) Câncer de esôfago.

Questão 49

Um paciente de 72 anos, diabético, apresenta-se com úlcera de pressão no calcâneo com sinais de necrose. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Debridamento cirúrgico da úlcera.
- (B) Uso de antibióticos tópicos.
- (C) Curativos secos.
- (D) Aumento da ingesta proteica.

Questão 50

Homem de 65 anos com insuficiência venosa crônica apresenta úlcera varicosa em membro inferior. Qual é o tratamento inicial mais indicado?

- (A) Escleroterapia.
- (B) Compressão elástica e cuidados locais.
- (C) Anticoagulação oral.
- (D) Repouso absoluto.

Realização
Instituto
ACCESS