



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
EDITAL Nº 1/2024**

CADERNO DE PROVA – TARDE

**PRÉ-REQUISITO
CIRÚRGIA GERAL OU
ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA**

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **50 (cinquenta)** questões objetivas, numeradas de **1 a 50**, a respeito do conteúdo de:
 - **Cirurgia Geral.**
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 (duas)** horas.
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após o decurso de **1 (uma)** hora do horário de início da prova, mas somente poderá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos **30 (trinta)** minutos anteriores ao horário determinado para o encerramento da prova.
8. Não será permitida a anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio.
9. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue a folha de respostas.
10. Boa prova!

CIRURGIA GERAL**Questão 1**

Um paciente de 54 anos, tabagista e diabético, apresenta dor abdominal intensa e súbita localizada em epigástrio, irradiando para as costas. Exame físico revela sinais de hipotensão. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Úlcera péptica perforada.
- (B) Pancreatite aguda.
- (C) Dissecção de aorta abdominal.
- (D) Aneurisma de aorta abdominal roto.

Questão 2

Homem de 65 anos apresenta-se com massa pulsátil na região inguinal direita. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hérnia inguinal indireta.
- (B) Aneurisma de artéria femoral.
- (C) Linfadenopatia inguinal.
- (D) Abscesso inguinal.

Questão 3

Paciente de 42 anos, submetido a colecistectomia laparoscópica, apresenta dor abdominal intensa e febre no segundo dia pós-operatório. Qual é o exame diagnóstico mais indicado?

- (A) Radiografia de abdome.
- (B) Tomografia computadorizada de abdome.
- (C) Ultrassonografia abdominal.
- (D) Laparoscopia exploratória.

Questão 4

Uma mulher de 70 anos, com dor abdominal e vômitos, apresenta distensão e timpanismo à percussão abdominal. O exame radiológico mostra níveis hidroaéreos em alças intestinais dilatadas. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Obstrução intestinal.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Úlcera gástrica.

Questão 5

Paciente com história de dor epigástrica crônica apresenta-se com hematêmese. A endoscopia revela uma úlcera no bulbo duodenal com bordas elevadas. Qual é a causa mais provável dessa úlcera?

- (A) Infecção por *H. pylori*.
- (B) Uso de anti-inflamatórios não esteroides.
- (C) Tumor gástrico.
- (D) Refluxo gastroesofágico.

Questão 6

Paciente de 65 anos, com diagnóstico de hérnia inguinal direta, apresenta dor e aumento da hérnia ao esforço físico. Qual é o tratamento mais indicado?

- (A) Uso de suspensório escrotal.
- (B) Observação clínica.
- (C) Reparação cirúrgica eletiva.
- (D) Antibiótico profilático.

Questão 7

Paciente de 45 anos com dor epigástrica intensa e irradiação para o dorso, sem melhora com antiácidos. A amilase sérica está elevada. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Úlcera péptica perforada.
- (B) Pancreatite aguda.
- (C) Colecistite aguda.
- (D) Apendicite aguda.

Questão 8

Mulher de 70 anos com história de perda de peso e anemia é submetida a colonoscopia, que revela uma lesão estenosante no cólon esquerdo. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Doença diverticular.
- (B) Câncer de cólon.
- (C) Colite pseudomembranosa.
- (D) Pólipo adenomatoso.

Questão 9

Homem de 50 anos com dor abdominal e icterícia é diagnosticado com colelitíase e coledocolitíase. Qual é a melhor conduta terapêutica inicial?

- (A) Colecistectomia laparoscópica.
- (B) Esfincterotomia endoscópica com retirada do cálculo.
- (C) Administração de antibiótico profilático.
- (D) Observação clínica.

Questão 10

Paciente de 55 anos apresenta dor abdominal difusa e febre após procedimento endoscópico. O exame de imagem revela gás na cavidade peritoneal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Perfuração intestinal.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Obstrução intestinal.

Questão 11

Um paciente de 40 anos é atendido com dor e tumefação no testículo direito após episódio recente de infecção urinária. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Cisto epididimário.
- (B) Epididimite aguda.
- (C) Torção testicular.
- (D) Varicocele.

Questão 12

Homem de 68 anos apresenta disfagia progressiva para sólidos e líquidos, com perda de peso significativa. A endoscopia mostra uma lesão estenosante no esôfago distal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Acalasia.
- (B) Refluxo gastroesofágico.
- (C) Câncer de esôfago.
- (D) Divertículo de Zenker.

Questão 13

Paciente de 57 anos é submetido a uma colectomia devido a diverticulite complicada. No pós-operatório, apresenta febre e dor abdominal. Qual exame é o mais indicado para investigar a causa?

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Tomografia computadorizada de abdome.
- (C) Ultrassonografia abdominal.
- (D) Endoscopia digestiva alta.

Questão 14

Uma mulher de 35 anos com dor abdominal é diagnosticada com apendicite aguda. O exame de imagem mostra abscesso peri-apendicular. Qual é a conduta inicial recomendada?

- (A) Apendicectomia de urgência.
- (B) Antibioticoterapia e drenagem do abscesso.
- (C) Observação e analgesia.
- (D) Alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial.

Questão 15

Paciente de 72 anos, com histórico de hipertensão, apresenta-se com quadro de obstrução intestinal. A tomografia revela uma massa na região ileocecal. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Câncer de cólon.
- (C) Volvulo de sigmoide.
- (D) Aderências intestinais.

Questão 16

Paciente de 30 anos, previamente saudável, apresenta dor em fossa ilíaca direita, febre e náuseas. Durante a laparoscopia, observa-se líquido purulento ao redor do apêndice. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Drenagem do líquido e antibioticoterapia.
- (B) Apendicectomia e lavagem da cavidade.
- (C) Apenas lavagem da cavidade.
- (D) Fechamento da cavidade sem apendicectomia.

Questão 17

Homem de 60 anos, com histórico de colelitíase, apresenta dor no quadrante superior direito e febre. O ultrassom mostra espessamento da parede da vesícula e líquido pericolecístico. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pancreatite.
- (B) Colecistite aguda.
- (C) Hepatite.
- (D) Cisto hepático.

Questão 18

Mulher de 65 anos, fumante, com perda de peso e história de dor lombar, é diagnosticada com uma massa abdominal palpável. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Aneurisma de aorta abdominal.
- (B) Diverticulite.
- (C) Câncer de pâncreas.
- (D) Pielonefrite.

Questão 19

Paciente de 50 anos, com queixa de azia e regurgitação há 6 meses, não responde a tratamento com inibidor de bomba de prótons. Qual é o próximo exame mais indicado?

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Tomografia de abdome.
- (C) Endoscopia digestiva alta.
- (D) Ecocardiograma.

Questão 20

Paciente de 58 anos apresenta dor abdominal intensa, com defesa muscular e descompressão brusca dolorosa. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Peritonite.
- (D) Colelitíase.

Questão 21

Paciente de 63 anos, com histórico de cirrose hepática, apresenta quadro de ascite, dor abdominal e febre. A paracentese revela contagem elevada de polimorfonucleares. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Ascite refratária.
- (B) Peritonite bacteriana espontânea.
- (C) Infecção urinária.
- (D) Pancreatite aguda.

Questão 22

Homem de 55 anos com hérnia inguinal encarcerada é submetido a cirurgia de emergência. Durante a cirurgia, observa-se necrose do segmento intestinal herniado. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Redução do segmento herniado.
- (B) Ressecção do segmento necrótico com anastomose primária.
- (C) Drenagem da hérnia.
- (D) Observação clínica pós-operatória.

Questão 23

Mulher de 70 anos com história de doença diverticular apresenta dor abdominal intensa e defesa muscular em fossa ilíaca esquerda. O exame de imagem revela abscesso pericólico. Qual é a conduta inicial recomendada?

- (A) Antibioticoterapia e drenagem percutânea.
- (B) Colectomia imediata.
- (C) Observação clínica.
- (D) Administração de analgésicos.

Questão 24

Paciente de 64 anos, com quadro de anemia, apresenta-se com massa palpável em hipocôndrio esquerdo. A tomografia revela esplenomegalia. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Linfoma esplênico.
- (B) Hemangioma hepático.
- (C) Aneurisma de artéria esplênica.
- (D) Pielonefrite.

Questão 25

Um paciente de 52 anos apresenta disfagia para sólidos e líquidos, perda de peso e tosse crônica. A endoscopia revela esôfago dilatado e contrações anormais. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Câncer de esôfago.
- (B) Acalasia.
- (C) Refluxo gastroesofágico.
- (D) Estenose esofágica.

Questão 26

Paciente de 28 anos apresenta dor abdominal intensa após trauma contuso. A ultrassonografia revela líquido livre na cavidade abdominal e lesão hepática. Qual é a conduta inicial recomendada?

- (A) Observação clínica.
- (B) Cirurgia exploratória.
- (C) Embolização seletiva.
- (D) Antibioticoterapia profilática.

Questão 27

Homem de 45 anos apresenta dor no flanco direito, febre e hematuria macroscópica. O exame de imagem mostra cálculos em pelve renal. Qual é o tratamento inicial mais indicado?

- (A) Antibióticos e analgesia.
- (B) Nefrectomia.
- (C) Cistoscopia.
- (D) Drenagem percutânea.

Questão 28

Uma mulher de 60 anos com histórico de tabagismo e dor abdominal crônica é diagnosticada com aneurisma de aorta abdominal. Qual é o critério de indicação para cirurgia?

- (A) Presença de dor lombar.
- (B) Diâmetro maior que 5,5 cm.
- (C) Idade superior a 65 anos.
- (D) História familiar de aneurisma.

Questão 29

Paciente de 35 anos com dor epigástrica e emagrecimento progressivo apresenta na tomografia uma massa pancreática. Qual é o exame indicado para confirmação diagnóstica?

- (A) Radiografia de abdome.
- (B) Ultrassonografia abdominal.
- (C) Tomografia computadorizada de abdome.
- (D) Punção guiada por ultrassom.

Questão 30

Homem de 50 anos é admitido com dor abdominal intensa e febre após colecistectomia laparoscópica recente. O exame físico revela defesa muscular. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Perfuração intestinal.
- (C) Abscesso subfrênico.
- (D) Obstrução intestinal.

Questão 31

Paciente de 45 anos, previamente saudável, apresenta dor em hipocôndrio direito, icterícia e febre alta. O ultrassom mostra dilatação do colédoco e cálculos biliares. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Colelitíase.
- (B) Coledocolitíase com colangite.
- (C) Hepatite viral aguda.
- (D) Pancreatite aguda.

Questão 32

Homem de 72 anos é admitido com dor abdominal intensa e súbita. A tomografia revela alças intestinais dilatadas e ausência de fluxo sanguíneo em um segmento do intestino delgado. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Isquemia mesentérica aguda.
- (B) Obstrução intestinal por aderências.
- (C) Apendicite aguda.
- (D) Doença diverticular complicada.

Questão 33

Mulher de 60 anos apresenta abaulamento doloroso na cicatriz de uma cirurgia abdominal prévia. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hérnia inguinal.
- (B) Hérnia incisional.
- (C) Lipoma.
- (D) Abscesso de parede.

Questão 34

Paciente de 62 anos com histórico de etilismo crônico apresenta hematêmese e melena. A endoscopia revela varizes esofágicas. Qual é a primeira medida terapêutica?

- (A) Administração de inibidor de bomba de prótons.
- (B) Ligadura elástica das varizes.
- (C) Restrição hídrica.
- (D) Alta hospitalar com observação.

Questão 35

Homem de 50 anos apresenta-se com dor epigástrica e náuseas. A tomografia revela um pseudoaneurisma de artéria esplênica. Qual é a indicação de tratamento para essa condição?

- (A) Observação com acompanhamento clínico.
- (B) Embolização endovascular.
- (C) Ressecção esplênica.
- (D) Administração de anticoagulantes.

Questão 36

Paciente de 48 anos apresenta dor abdominal intensa em fossa ilíaca direita com anorexia e febre. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Colecistite aguda.
- (D) Diverticulite.

Questão 37

Mulher de 55 anos com dor abdominal e massa palpável no hipocôndrio esquerdo é diagnosticada com cisto esplênico. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Observação clínica.
- (B) Esplenectomia parcial.
- (C) Drenagem percutânea.
- (D) Antibioticoterapia.

Questão 38

Homem de 70 anos apresenta dor abdominal difusa e parada de eliminação de gases e fezes. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Obstrução intestinal.
- (B) Colecistite aguda.
- (C) Peritonite.
- (D) Úlcera gástrica.

Questão 39

Paciente de 65 anos é admitida com quadro de hemorragia digestiva alta e hipotensão. A endoscopia revela úlcera péptica com vaso visível. Qual é a intervenção mais indicada?

- (A) Ligadura cirúrgica.
- (B) Injeção de adrenalina.
- (C) Observação clínica.
- (D) Radioterapia.

Questão 40

Mulher de 58 anos com dor em cólica abdominal e diarreia é diagnosticada com íleo biliar. Qual é o tratamento indicado?

- (A) Colectomia.
- (B) Laparotomia com remoção do cálculo.
- (C) Administração de antibióticos.
- (D) Ressecção do íleo.

Questão 41

Paciente de 40 anos apresenta lesão perfurada no intestino delgado após trauma abdominal penetrante. Qual é a abordagem cirúrgica inicial mais indicada?

- (A) Sutura primária da lesão.
- (B) Lavagem peritoneal sem reparo.
- (C) Ressecção do segmento afetado com anastomose.
- (D) Observação clínica.

Questão 42

Um homem de 68 anos apresenta-se com dor abdominal intensa e súbita, associada a hipotensão. O ultrassom revela grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Ruptura de aneurisma de aorta abdominal.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Pancreatite aguda.
- (D) Peritonite por perfuração gástrica.

Questão 43

Mulher de 55 anos apresenta massa indolor e fixa na mama direita. O exame de imagem mostra calcificações irregulares. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Fibroadenoma.
- (B) Cisto mamário.
- (C) Câncer de mama.
- (D) Abscesso mamário.

Questão 44

Um paciente de 30 anos com dor perianal e febre é diagnosticado com abscesso perianal. Qual é o tratamento inicial recomendado?

- (A) Antibioticoterapia isolada.
- (B) Drenagem cirúrgica.
- (C) Aplicação de calor local.
- (D) Observação.

Questão 45

Homem de 60 anos apresenta dor torácica e disfagia. A tomografia mostra dilatação do esôfago e espessamento da parede. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Esofagite infecciosa.
- (B) Acalasia.
- (C) Divertículo de Zenker.
- (D) Câncer de esôfago.

Questão 46

Paciente de 67 anos com anemia crônica apresenta dor abdominal vaga e melena. A endoscopia revela lesão ulcerada na região gástrica. Qual é a principal suspeita diagnóstica?

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Úlcera gástrica benigna.
- (C) Câncer gástrico.
- (D) Úlcera duodenal.

Questão 47

Um paciente de 72 anos, diabético, apresenta-se com úlcera de pressão no calcâneo com sinais de necrose. Qual é a conduta mais indicada?

- (A) Debridamento cirúrgico da úlcera.
- (B) Uso de antibióticos tópicos.
- (C) Curativos secos.
- (D) Aumento da ingestão proteica.

Questão 48

Mulher de 38 anos com diagnóstico de litíase vesicular é submetida a colecistectomia. Durante a cirurgia, observa-se lesão no ducto biliar. Qual é a conduta mais apropriada?

- (A) Realizar sutura simples do ducto.
- (B) Instalar dreno e observar.
- (C) Reparação imediata do ducto biliar com drenagem.
- (D) Encerrar o procedimento sem intervenção.

Questão 49

Paciente de 50 anos apresenta massa abdominal pulsátil na linha média. Qual é o exame diagnóstico inicial indicado?

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Ultrassonografia abdominal.
- (C) Ressonância magnética de abdome.
- (D) Colonoscopia.

Questão 50

Homem de 65 anos com insuficiência venosa crônica apresenta úlcera varicosa em membro inferior. Qual é o tratamento inicial mais indicado?

- (A) Escleroterapia.
- (B) Compressão elástica e cuidados locais.
- (C) Anticoagulação oral.
- (D) Repouso absoluto.

Realização
Instituto
ACCESS