




Flöhe

Zecken

Wo kommen Flöhe am häufigsten vor?



Wo kommen Zecken am häufigsten vor?



Wann sind Flöhe am aktivsten?



Wann sind Zecken am aktivsten?



Prävention	Kontrolle	Bekämpfung
Anti-Flohmittel: Pipette, Halsband oder Spray.	Bei Kratzen, Juckreiz oder übermäßigem Lecken das Fell mit einem Flohkamm kontrollieren.	Anti-Flohmittel: Pipette, Halsband oder (Umgebungs-)Spray.

Prävention	Kontrolle	Entfernen
Zeckenabwehrprodukte: Pipette, Halsband oder Spray.	Überprüfen Sie Ihr Haustier täglich. Besonders: Achseln, Leisten und Ohren.	Entfernen Sie die Zecke so schnell wie möglich mit einer Zeckenzange oder einem -haken.

Innerhalb von 24 Stunden

Zecken...

- ... kommen in Wäldern, Mooren, Dünen, Parks und Gärten vor.
- ... saugen Blut und können Borreliose übertragen.
- ... sind das ganze Jahr über, aber meist bei Temperaturen von bis zu 7 °C aktiv.
- ... können mit dem richtigen Schutz, wie z.B. einem Pipetten-Mittel, einem Spray oder einem Halsband abgewehrt werden.
- ... sollten nach dem Biss so wie möglich schnell entfernt werden, um Krankheiten zu verhindern.

Flöhe...

- ... leben auf der Haut Ihres Tieres und die Eier, Larven und Puppen vor allem in der Umgebung Ihres Tieres.
- ... verursachen einen lästigen Juckreiz, der zu schlimmeren Problemen führen kann.
- ... kann man mit einem Flohkamm aufspüren und mit einem Pipetten-Mittel, einem Spray oder einem Halsband fernhalten oder töten.
- ... Eier, Larven und Puppen befinden sich meist im Haus, vergessen Sie nicht ein Umweltspray anzuwenden.

Wann haben Sie Ihr Tier das letzte Mal vor Flöhen und Zecken geschützt?

Verwenden Sie den praktischen Medpets-Kalender, um zu wissen, wann Ihr Tier wieder geschützt werden muss.

Januar	Februar	März
April	Mai	Juni
Juli	August	September
Oktober	November	Dezember



Für weitere Informationen besuchen Sie www.medpets.at
Noch Fragen? Unsere Tierärztin berät Sie kostenlos!

