

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. Oktober 2021 (14.10.2021)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2021/204665 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 257/06 (2006.01) A01N 43/713 (2006.01)
C07D 271/08 (2006.01) A01N 43/82 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2021/058608

(22) Internationales Anmeldedatum:
01. April 2021 (01.04.2021)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
20168349.7 07. April 2020 (07.04.2020) EP

(71) Anmelder: **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**
[DE/DE]; Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen
(DE).

(72) Erfinder: **WALDRAFF, Christian**; Franz-Lehar-Weg 7,
61118 Bad Vilbel (DE). **BRAUN, Ralf**; Bischof-Beck-Stras-
se 1a, 76857 Ramberg (DE). **KÖHN, Arnim**; Ringstra-
ße 12, 55270 Klein-Winternheim (DE). **AHRENS, Hart-
mut**; Im Birkenwäldchen 10, 63225 Langen (DE). **DÖL-
LER, Uwe**; Christian-Morgensternstrasse 11, 63110 Rod-
gau (DE). **ASMUS, Elisabeth**; Kirchenstraße 25, 63768
Hörsbach (DE). **BOLLENBACH-WAHL, Birgit**; Duhl-
wiesen 3, 55413 Weiler/Bingen (DE). **ROSINGER, Chris-
topher Hugh**; Am Hochfeld 33, 65719 Hofheim (DE).
GATZWEILER, Elmar; Am Nauheimer Bach 22, 61231
Bad Nauheim (DE). **DITTGEN, Jan**; Burgstraße 26, 60316
Frankfurt (DE). **MACHETTIRA, Anu Bheemaiah**; Nie-
dernhausener strasse 47, 60326 Frankfurt am Main (DE).

(74) Anwalt: **BIP PATENTS**; Alfred-Nobel-Str. 10, 40789
Monheim am Rhein NRW (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,

TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:


— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: SUBSTITUTED ISOPHTHALIC ACID DIAMIDES

(54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE ISOPHTALSÄUREDIAMIDE



(57) Abstract: The invention relates to isophthalic acid diamides having general formula (I) as herbicides. In this formula (I), X, Y and Z represent radicals such as hydrogen, alkyl and halogen. Q represents a heterocyclic ring such as tetrazolyl.

(57) Zusammenfassung: Es werden Isophthalsäurediamide der allgemeinen Formel (I) als Herbizide beschrieben. In dieser Formel (I) stehen X, Y und Z für Reste wie Wasserstoff, Alkyl und Halogen. Q steht für einen heterocyclischen Ring wie Tetrazolyl.



WO 2021/204665 A1

Substituierte Isophthalsäurediamide


5 Beschreibung

Die Erfindung betrifft das technische Gebiet der Herbizide, insbesondere das der Herbizide zur selektiven Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern in Nutzpflanzen.

10 WO 2012/028579 A1, WO 2012/126932 A1, WO2013/017559 A1 und WO 2017/144402 A1 beschreiben unter anderem herbizid wirksame Isophthalsäurediamide, die sich im Wesentlichen durch die Art der Substituenten an den beiden Amid-Funktionen unterscheiden.





Die dort spezifisch offenbarten Isophthalsäurediamide weisen stets eine tertiäre Amidgruppe auf. Jedoch
15 weisen die aus diesen Schriften bekannten Isophthalsäurediamide nicht immer eine ausreichende herbizide Wirkung und/oder Verträglichkeit gegenüber Kulturpflanzen auf. Es wurde gefunden, dass Isophthalsäurediamide mit einer primären oder sekundären Amidgruppe überlegene Eigenschaften gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Isophthalsäurediamide aufweisen.

Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit Isophthalsäurediamide der Formel (I) oder deren
20 Salze



worin die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

Q bedeutet Q^1 , Q^2 , Q^3 oder Q^4

(Q¹)(Q²)(Q³)(Q⁴)

25

R^1 bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl,

R^2 bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl,

30

- R^x bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkyl-O-(C₁-C₆)-alkyl oder Phenyl,
- R^y bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl oder Halogen-(C₁-C₆)-alkyl,
- 5 R^z bedeutet Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl oder Halogen-(C₁-C₆)-alkyl,
- X bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, R¹O, R²(O)_nS oder R¹O-(C₁-C₆)-Alkyl oder R²S(O)_n-(C₁-C₆)-Alkyl,
- 10 Y bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, R¹O oder R²(O)_nS,
- Z bedeutet Wasserstoff,
jeweils durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus Halogen, Cyano, R¹C(O), R¹OC(O), R¹O und R²(O)_nS substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl-(C₁-C₆)-alkyl,
15 (C₁-C₆)-Alkyl-O-(C₁-C₆)-alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkenyl-(C₁-C₆)-alkyl, (C₂-C₆)-Alkynyl, (C₂-C₆)-Alkynyl-(C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, R²S(O)_n-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹C(O), R¹OC(O), R¹C(O)-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹OC(O)-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹NH-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹₂N-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹NHC(O)-(C₁-C₆)-Alkyl oder R¹₂NC(O)-(C₁-C₆)-Alkyl,
oder
20 jeweils durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, Halogen-(C₁-C₆)-alkoxy, R¹C(O) und R¹OC(O) substituiertes Phenyl, Benzyl, Phenyl, Benzyl, Heterocyclyl oder Heterocyclyl-(C₁-C₆)-alkyl,
- n bedeutet 0, 1 oder 2,
- 25 s bedeutet 0, 1, 2 oder 3.

In der Formel (I) und allen nachfolgenden Formeln können Alkylreste mit mehr als zwei
30 Kohlenstoffatomen geradkettig oder verzweigt sein. Alkylreste bedeuten z.B. Methyl, Ethyl, n- oder i-Propyl, n-, i-, t- oder 2-Butyl, Pentyle, Hexyle, wie n-Hexyl, i-Hexyl und 1,3-Dimethylbutyl. Analog bedeutet Alkenyl z.B. Allyl, 1-Methylprop-2-en-1-yl, 2-Methyl-prop-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-1-yl, 1-Methyl-but-3-en-1-yl und 1-Methyl-but-2-en-1-yl. Alkynyl bedeutet z.B. Propargyl, But-2-in-1-yl, But-3-in-1-yl, 1-Methyl-but-3-in-1-yl. Die Mehrfachbindung kann sich jeweils in
35 beliebiger Position des ungesättigten Rests befinden. Cycloalkyl bedeutet ein carbocyclisches, gesättigtes Ringsystem mit drei bis sechs C-Atomen, z.B. Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl. Durch Halogen substituiertes Alkyl bedeutet geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen,

wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome ersetzt sein können, z.B. C₁-C₂-Halogenalkyl wie Chlormethyl, Brommethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Chlorfluormethyl, Dichlorfluormethyl, Chlordifluormethyl, 1-Chlorethyl, 1-Bromethyl, 1-Fluorethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Chlor-2-fluorethyl, 2-Chlor,2-difluorethyl, 2,2-Dichlor-2-fluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentafluorethyl und 1,1,1-Trifluorprop-2-yl.

Halogen steht für Fluor, Chlor, Brom oder Iod.

10 Ein heterocyclischer Rest (Heterocyclyl) ist ein 5- oder 6-gliedriger cyclischer Rest, der neben C-Atomen mindestens ein Heteroatom aus der Gruppe N, O, S enthält und der gesättigt, ungesättigt, teilgesättigt oder heteroaromatisch ist und dabei unsubstituiert oder substituiert sein kann, wobei die Bindungsstelle an einem Ringatom lokalisiert ist. Beispiele für heterocyclische Reste sind 1- oder 2- oder 3-Pyrrolidinyl, 3,4-Dihydro-2H-pyrrol-2- oder 3-yl, 2,3-Dihydro-1H-pyrrol-1- oder 2- oder 3- oder 15 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydro-1H-pyrrol-1- oder 2- oder 3-yl, 1- oder 2- oder 3- oder 4-Piperidinyl; 2,3,4,5-Tetrahydropyridin-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl oder 6-yl; 1,2,3,6-Tetrahydropyridin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,2,3,4-Tetrahydropyridin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,4-Dihydropyridin-1- oder 2- oder 3- oder 4-yl; 2,3-Dihydropyridin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2,5-Dihydropyridin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl, 1- oder 2- oder 3- oder 4-Azepanyl, 2- oder 3- 20 Oxolanyl (= 2- oder 3-Tetrahydrofuran-yl); 2,3-Dihydrofuran-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydrofuran-2- oder 3-yl, 2- oder 3- oder 4-Oxanyl (= 2- oder 3- oder 4-Tetrahydropyran-yl); 3,4-Dihydro-2H-pyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-pyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2H-Pyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4H-Pyran-2- oder 3- oder 4-yl, 2- oder 3- oder 4-Oxepanyl; 2- oder 3-Tetrahydrothiophenyl; 2,3-Dihydrothiophen-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydrothiophen-2- oder 3-yl; Tetrahydro-2H-thiopyran-2- oder 3- oder 4-yl; 3,4-Dihydro-2H-thiopyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2H-Thiopyran-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4H-Thiopyran-2- oder 3- oder 4-yl; 1- oder 2- oder 3- oder 4-Pyrazolidinyl; 4,5-Dihydro-3H-pyrazol-3- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,3-Dihydro-1H-pyrazol-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 1- oder 2- oder 3- oder 4- Imidazolidinyl; 2,3-Dihydro-1H-imidazol-1- oder 2- oder 3- oder 4-yl; 2,5-Dihydro-1H-imidazol-1- oder 2- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydro-1H-imidazol-1- oder 2- oder 4- oder 5-yl; Hexahydropyridazin-1- oder 2- oder 3- oder 4-yl; 1,2,3,4-Tetrahydropyridazin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,2,3,6-Tetrahydropyridazin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,4,5,6-Tetrahydropyridazin-1- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,4,5,6-Tetrahydropyridazin-3- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydropyridazin-3- oder 4-yl; 3,4-Dihydropyridazin-3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydropyridazin-3- oder 4-yl; 1,6-Dihydropyriazin-1- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; Hexahydropyrimidin-1- oder 2- oder 3- oder 4-yl; 1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-1- oder 2- oder 4- oder

5- oder 6-yl; 1,2,5,6-Tetrahydropyrimidin-1- oder 2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,2,3,4-Tetrahydropyrimidin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,6-Dihydropyrimidin-1- oder 2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,2-Dihydropyrimidin-1- oder 2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2,5-Dihydropyrimidin-2- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydropyrimidin-4- oder 5- oder 6-yl; 1,4-Dihydropyrimidin-1- oder 2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1- oder 2- oder 3-Piperazinyl; 1,2,3,6-Tetrahydropyrazin-1- oder 2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 1,2,3,4-Tetrahydropyrazin-1- oder 2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,2-Dihydropyrazin-1- oder 2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 1,4-Dihydropyrazin-1- oder 2- oder 3-yl; 2,3-Dihydropyrazin-2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 2,5-Dihydropyrazin-2- oder 3-yl; 1,3-Dioxolan-2- oder 4- oder 5-yl; 1,3-Dioxol-2- oder 4-yl; 1,3-Dioxan-2- oder 4- oder 5-yl; 4H-1,3-Dioxin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,4-Dioxan-2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 2,3-Dihydro-1,4-dioxin-2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 1,4-Dioxin-2- oder 3-yl; 1,2-Dithiolan-3- oder 4-yl; 3H-1,2-Dithiol-3- oder 4- oder 5-yl; 1,3-Dithiolan-2- oder 4-yl; 1,3-Dithiol-2- oder 4-yl; 1,2-Dithian-3- oder 4-yl; 3,4-Dihydro-1,2-dithiin-3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-1,2-dithiin-3- oder 4-yl; 1,2-Dithiin-3- oder 4-yl; 1,3-Dithian-2- oder 4- oder 5-yl; 4H-1,3-Dithiin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; Isoxazolidin-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,3-Dihydroisoxazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydroisoxazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydroisoxazol-3- oder 4- oder 5-yl; 1,3-Oxazolidin-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,3-Dihydro-1,3-oxazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydro-1,3-oxazol-2- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2- oder 4- oder 5-yl; 1,2-Oxazinan-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,4-Dihydro-2H-1,2-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-1,2-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-2H-1,2-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-4H-1,2-oxazin-3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2H-1,2-Oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 6H-1,2-Oxazin-3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4H-1,2-Oxazin-3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 1,3-Oxazinan-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,4-Dihydro-2H-1,3-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-1,3-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-2H-1,3-oxazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2H-1,3-Oxazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 6H-1,3-Oxazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4H-1,3-Oxazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; Morpholin-2- oder 3- oder 4-yl; 3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-1,4-oxazin-2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 2H-1,4-oxazin-2- oder 3- oder 5- oder 6-yl; 4H-1,4-oxazin-2- oder 3-yl; Isothiazolidin-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,3-Dihydroisothiazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydroisothiazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydroisothiazol-3- oder 4- oder 5-yl; 1,3-Thiazolidin-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,3-Dihydro-1,3-thiazol-2- oder 3- oder 4- oder 5-yl; 2,5-Dihydro-1,3-thiazol-2- oder 4- oder 5-yl; 4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2- oder 4- oder 5-yl; 1,3-Thiazinan-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,4-Dihydro-2H-1,3-thiazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 3,6-Dihydro-2H-1,3-thiazin-2- oder 3- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-2H-1,3-thiazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 2H-1,3-Thiazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 6H-1,3-Thiazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4H-1,3-Thiazin-2- oder 4- oder 5- oder 6-yl; 4,2-Dioxazolidin-2- oder 3- oder

5-yl; 1,4,2-Dioxazol-3- oder 5-yl; 1,4,2-Dioxazinan-2- oder -3- oder 5- oder 6-yl; 5,6-Dihydro-1,4,2-dioxazin-3- oder 5- oder 6-yl; 1,4,2-Dioxazin-3- oder 5- oder 6-yl.

- 5 Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können je nach Art und Verknüpfung der Substituenten als Stereoisomere vorliegen. Sind beispielsweise ein oder mehrere asymmetrisch substituierte Kohlenstoffatome vorhanden, so können Enantiomere und Diastereomere auftreten. Ebenso treten Stereoisomere auf, wenn n für 1 steht (Sulfoxide). Stereoisomere lassen sich aus den bei der Herstellung anfallenden Gemischen nach üblichen Trennmethoden, beispielsweise durch chromatographische
- 10 Trennverfahren, erhalten. Ebenso können Stereoisomere durch Einsatz stereoselektiver Reaktionen unter Verwendung optisch aktiver Ausgangs- und/oder Hilfsstoffe selektiv hergestellt werden. Die Erfindung betrifft auch alle Stereoisomeren und deren Gemische, die von der allgemeinen Formel (I) umfasst, jedoch nicht spezifisch definiert sind.
- 15 Die Verbindungen der Formel (I) können Salze bilden. Geeignete Basen sind beispielsweise organische Amine, wie Trialkylamine, Morpholin, Piperidin oder Pyridin sowie Ammonium-, Alkali- oder Erdalkalimetallhydroxide, -carbonate und -hydrogen-carbonate, insbesondere Natrium- und Kaliumhydroxid, Natrium- und Kaliumcarbonat und Natrium- und Kaliumhydrogencarbonat. Diese Salze sind Verbindungen, in denen der acide Wasserstoff durch ein für die Landwirtschaft geeignetes
- 20 Kation ersetzt wird, beispielsweise Metallsalze, insbesondere Alkalimetallsalze oder Erdalkalimetallsalze, insbesondere Natrium- und Kaliumsalze, oder auch Ammoniumsalze, Salze mit organischen Aminen oder quartäre (quaternäre) Ammoniumsalze, zum Beispiel mit Kationen der Formel $[NRR'R''R''']^+$, worin R bis R''' jeweils unabhängig voneinander einen organischen Rest, insbesondere Alkyl, Aryl, Aralkyl oder Alkylaryl darstellen. Infrage kommen auch Alkylsulfonium- und
- 25 Alkylsulfoxoniumsalze, wie (C₁-C₄)-Trialkylsulfonium- und (C₁-C₄)-Trialkylsulfoxoniumsalze.





Die Verbindungen der Formel (I) können durch Anlagerung einer geeigneten anorganischen oder organischen Säure, wie beispielsweise Mineralsäuren, wie HCl, HBr, H₂SO₄, H₃PO₄ oder HNO₃, oder organische Säuren, z. B. Carbonsäuren, wie Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Oxalsäure,

30 Milchsäure oder Salicylsäure oder Sulfonsäuren, wie p-Toluolsulfonsäure, an eine basische Gruppe, wie Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Piperidino, Morpholino oder Pyridino, Salze bilden. Diese Salze enthalten dann die konjugierte Base der Säure als Anion.

Bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), wobei die Symbole und Indices folgende

35 Bedeutungen haben:

Q bedeutet Q¹, Q², Q³ oder Q⁴

(Q¹)(Q²)(Q³)(Q⁴)

R^x bedeutet Me, Et, Pr, i-Pr, c-Pr, (CH₂)₂OMe oder Ph,

5 R^y bedeutet Cl, Me, Et oder CF₃,

R^z bedeutet Wasserstoff, Me, Et oder CF₃,

10 X bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, c-Pr, OMe, OEt, SMe, SEt, SO₂Me, SO₂Et, CH₂OMe, CH₂SMe, CH₂SO₂Me, (CH₂)₂SMe oder (CH₂)₂SO₂Me,

Y bedeutet Halogen, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, OMe, SMe, S(O)Me, SO₂Me, SEt, S(O)Et oder SO₂Et,

15 Z bedeutet Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, CH₂c-Pr, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, (CH₂)₂OMe, (CH₂)₂OEt, Allyl, Propinyl, (CH₂)₂SMe, (CH₂)₂SO₂Me, C(O)Me, C(O)cPr, C(O)OMe, C(O)OEt, CH₂-(tetrahydrofuran-2-yl), Oxetan-3-yl, CH₂C(O)Me, CH₂C(O)c-Pr, CH₂C(O)NMe₂, CH₂CN, Ph, CH₂Ph oder CH₂-(thien-2-yl), OMe, OEt, OPr, Oi-Pr.

20 Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), wobei die Symbole und Indices folgende Bedeutungen haben:

Q bedeutet Q₁ oder Q₄,

R^x bedeutet Me, Et oder Pr,

25

R^z bedeutet H oder Me,

X bedeutet F, Cl, Br, I, Me, Et, c-Pr, OMe, SMe, SEt, CH₂OMe oder CF₃,

30 Y bedeutet F, Cl, Br, I, SMe, S(O)Me, SO₂Me, CF₃, CHF₂ oder C₂F₅,

Z bedeutet Wasserstoff, Me, Et, c-Pr, Pr, i-Pr, c-Bu, CH₂-c-Pr, CH₂CHF₂, CH₂CF₃, CH(Me)-c-Pr, (CH₂)₂OMe, (CH₂)₂SMe, CH₂CN, CH₂-(tetrahydrofuran-2-yl), CH₂C(O)NMe₂, Ph oder CH₂-(thien-2-yl), Oxetan-3-yl, OMe, OEt, OPr, Oi-Pr.

5

Erfindungsgemäße Verbindungen können beispielsweise nach der in WO 2012/028579 A1 gemäß Schema 1 angegebenen Methode hergestellt werden. Die entsprechenden Benzoesäurechloride beziehungsweise die ihnen zugrunde liegenden Benzoesäuren sind grundsätzlich bekannt und können beispielsweise gemäß der in WO1997/041105, WO1998/029383, WO1999/021852, EP282944, 10 JP11021280, JP11012275 oder CN103130730 beschriebenen Methoden hergestellt werden. Die weiter unten beschriebenen Ausführungsbeispiele erläutern die Herstellungsweise der erfindungsgemäßen Verbindungen näher.

Die Aufarbeitung der jeweiligen Reaktionsmischungen erfolgt in der Regel nach bekannten Verfahren, 15 beispielsweise durch Kristallisation, wässrig-extraktive Aufarbeitung, durch chromatographische Methoden oder durch Kombination dieser Methoden.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können je nach Art und Verknüpfung der Substituenten als Stereoisomere vorliegen. Sind beispielsweise ein oder mehrere asymmetrisch substituierte 20 Kohlenstoffatome vorhanden, so können Enantiomere und Diastereomere auftreten. Ebenso treten Stereoisomere auf, wenn n für 1 steht (Sulfoxide). Stereoisomere lassen sich aus den bei der Herstellung anfallenden Gemischen nach üblichen Trennmethode, beispielsweise durch chromatographische Trennverfahren, erhalten. Ebenso können Stereoisomere durch Einsatz stereoselektiver Reaktionen unter Verwendung optisch aktiver Ausgangs- und/oder Hilfsstoffe selektiv hergestellt werden. Die Erfindung 25 betrifft auch alle Stereoisomeren und deren Gemische, die von der allgemeinen Formel (I) umfasst, jedoch nicht spezifisch definiert sind.

Kollektionen aus Verbindungen der Formel (I) und/oder deren Salzen, die nach den oben genannten Reaktionen synthetisiert werden können, können auch in parallelisierter Weise hergestellt werden, 30 wobei dies in manueller, teilweise automatisierter oder vollständig automatisierter Weise geschehen kann. Dabei ist es beispielsweise möglich, die Reaktionsdurchführung, die Aufarbeitung oder die Reinigung der Produkte bzw. Zwischenstufen zu automatisieren. Insgesamt wird hierunter eine Vorgehensweise verstanden, wie sie beispielsweise durch D. Tieses in *Combinatorial Chemistry – Synthesis, Analysis, Screening* (Herausgeber Günther Jung), Verlag Wiley 1999, auf den Seiten 1 bis 34 35 beschrieben ist.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) (und/oder deren Salze), im folgenden zusammen als „erfindungsgemäße Verbindungen“ bezeichnet, weisen eine ausgezeichnete herbizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum wirtschaftlich wichtiger mono- und dikotyler annueller Schadpflanzen auf.

5 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen oder zur Wachstumsregulierung von Pflanzen, vorzugsweise in Pflanzenkulturen, worin eine oder mehrere erfindungsgemäße Verbindung(en) auf die Pflanzen (z.B. Schadpflanzen wie mono- oder dikotyle Unkräuter oder unerwünschte Kulturpflanzen), das Saatgut (z.B. Körner, Samen oder vegetative Vermehrungsorgane wie Knollen oder Sprosssteile mit Knospen)
10 oder die Fläche, auf der die Pflanzen wachsen (z.B. die Anbaufläche), ausgebracht werden. Dabei können die erfindungsgemäßen Verbindungen z.B. im Vorsaats- (ggf. auch durch Einarbeitung in den Boden), Vorauf- oder Nachaufverfahren ausgebracht werden. Im einzelnen seien beispielhaft einige Vertreter der mono- und dikotylen Unkrautflora genannt, die durch die erfindungsgemäßen Verbindungen kontrolliert werden können, ohne dass durch die Nennung eine Beschränkung auf
15 bestimmte Arten erfolgen soll.

Monokotyle Schadpflanzen der Gattungen: Aegilops, Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Apera, Avena, Brachiaria, Bromus, Cenchrus, Commelina, Cynodon, Cyperus, Dactyloctenium, Digitaria, Echinochloa, Eleocharis, Eleusine, Eragrostis, Eriochloa, Festuca, Fimbristylis, Heteranthera, Imperata, Ischaemum,
20 Leptochloa, Lolium, Monochoria, Panicum, Paspalum, Phalaris, Phleum, Poa, Rottboellia, Sagittaria, Scirpus, Setaria, Sorghum.

Dikotyle Unkräuter der Gattungen: Abutilon, Amaranthus, Ambrosia, Anoda, Anthemis, Aphanes, Artemisia, Atriplex, Bellis, Bidens, Capsella, Carduus, Cassia, Centaurea, Chenopodium, Cirsium,
25 Convolvulus, Datura, Desmodium, Emex, Erysimum, Euphorbia, Galeopsis, Galinsoga, Galium, Hibiscus, Ipomoea, Kochia, Lamium, Lepidium, Lindernia, Matricaria, Mentha, Mercurialis, Mullugo, Myosotis, Papaver, Pharbitis, Plantago, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Rorippa, Rotala, Rumex, Salsola, Senecio, Sesbania, Sida, Sinapis, Solanum, Sonchus, Sphenoclea, Stellaria, Taraxacum, Thlaspi, Trifolium, Urtica, Veronica, Viola, Xanthium.

30 Werden die erfindungsgemäßen Verbindungen vor dem Keimen auf die Erdoberfläche appliziert, so wird entweder das Auflaufen der Unkrautkeimlinge vollständig verhindert oder die Unkräuter wachsen bis zum Keimblattstadium heran, stellen jedoch dann ihr Wachstum ein.

35 Bei Applikation der Wirkstoffe auf die grünen Pflanzenteile im Nachaufverfahren tritt nach der Behandlung Wachstumsstopp ein und die Schadpflanzen bleiben in dem zum Applikationszeitpunkt vorhandenen Wachstumsstadium stehen oder sterben nach einer gewissen Zeit ganz ab, so dass auf diese

Weise eine für die Kulturpflanzen schädliche Unkrautkonkurrenz sehr früh und nachhaltig beseitigt wird.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in Nutzkulturen Selektivitäten aufweisen und können
5 auch als nichtselektive Herbizide eingesetzt werden.

Aufgrund ihrer herbiziden und pflanzenwachstumsregulatorischen Eigenschaften können die Wirkstoffe auch zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Kulturen von bekannten oder noch zu entwickelnden gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt werden. Die transgenen Pflanzen zeichnen sich in der
10 Regel durch besondere vorteilhafte Eigenschaften aus, beispielsweise durch Resistenzen gegenüber bestimmten in der Agrarindustrie verwendeten Wirkstoff, vor allem bestimmten Herbiziden, Resistenzen gegenüber Pflanzenkrankheiten oder Erregern von Pflanzenkrankheiten wie bestimmten Insekten oder Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien oder Viren. Andere besondere Eigenschaften betreffen z.B. das Erntegut hinsichtlich Menge, Qualität, Lagerfähigkeit, Zusammensetzung und
15 spezieller Inhaltsstoffe. So sind transgene Pflanzen mit erhöhtem Stärkegehalt oder veränderter Qualität der Stärke oder solche mit anderer Fettsäurezusammensetzung des Ernteguts bekannt. Weitere besondere Eigenschaften liegen in einer Toleranz oder Resistenz gegen abiotische Stressoren z.B. Hitze, Kälte, Trockenheit, Salz und ultraviolette Strahlung.

20 Bevorzugt ist die Anwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder deren Salze in wirtschaftlich bedeutenden transgenen Kulturen von Nutz- und Zierpflanzen, Die Verbindungen der Formel (I) können als Herbizide in Nutzpflanzenkulturen eingesetzt werden, welche gegenüber den phytotoxischen Wirkungen der Herbizide resistent sind bzw. gentechnisch resistent gemacht wurden.

25 Herkömmliche Wege zur Herstellung neuer Pflanzen, die im Vergleich zu bisher vorkommenden Pflanzen modifizierte Eigenschaften aufweisen, bestehen beispielsweise in klassischen Züchtungsverfahren und der Erzeugung von Mutanten. Alternativ können neue Pflanzen mit veränderten Eigenschaften mit Hilfe gentechnischer Verfahren erzeugt werden (siehe z.B. EP 0221044,
30 EP 0131624). Beschrieben wurden beispielsweise in mehreren Fällen gentechnische Veränderungen von Kulturpflanzen zwecks Modifikation der in den Pflanzen synthetisierten Stärke (z.B. WO 92/011376 A, WO 92/014827 A, WO 91/019806 A), transgene Kulturpflanzen, welche gegen bestimmte Herbizide vom Typ Glufosinate (vgl. z.B. EP 0242236 A, EP 0242246 A) oder Glyphosate (WO 92/000377 A) oder der Sulfonylharnstoffe (EP 0257993 A, US 5,013,659) oder gegen Kombinationen oder
35 Mischungen dieser Herbizide durch „gene stacking“ resistent sind, wie transgenen Kulturpflanzen z. B. Mais oder Soja mit dem Handelsnamen oder der Bezeichnung Optimum™ GAT™ (Glyphosate ALS Tolerant).

- transgene Kulturpflanzen, beispielsweise Baumwolle, mit der Fähigkeit *Bacillus thuringiensis*-Toxine (Bt-Toxine) zu produzieren, welche die Pflanzen gegen bestimmte Schädlinge resistent machen (EP 0142924 A, EP 0193259 A).
- transgene Kulturpflanzen mit modifizierter Fettsäurezusammensetzung (WO 91/013972 A).
- 5 - gentechnisch veränderte Kulturpflanzen mit neuen Inhalts- oder Sekundärstoffen z.B. neuen Phytoalexinen, die eine erhöhte Krankheitsresistenz verursachen (EP 0309862 A, EP 0464461 A)
- gentechnisch veränderte Pflanzen mit reduzierter Photorespiration, die höhere Erträge und höhere Stresstoleranz aufweisen (EP 0305398 A)
- transgene Kulturpflanzen, die pharmazeutisch oder diagnostisch wichtige Proteine produzieren
10 („molecular pharming“)
- transgene Kulturpflanzen, die sich durch höhere Erträge oder bessere Qualität auszeichnen
- transgene Kulturpflanzen die sich durch eine Kombinationen z.B. der o. g. neuen Eigenschaften auszeichnen („gene stacking“)

15 Zahlreiche molekularbiologische Techniken, mit denen neue transgene Pflanzen mit veränderten Eigenschaften hergestellt werden können, sind im Prinzip bekannt; siehe z.B. I. Potrykus und G. Spangenberg (eds.) *Gene Transfer to Plants*, Springer Lab Manual (1995), Springer Verlag Berlin, Heidelberg. oder Christou, "Trends in Plant Science" 1 (1996) 423-431).

20 Für derartige gentechnische Manipulationen können Nucleinsäuremoleküle in Plasmide eingebracht werden, die eine Mutagenese oder eine Sequenzveränderung durch Rekombination von DNA-Sequenzen erlauben. Mit Hilfe von Standardverfahren können z.B. Basenaustausche vorgenommen, Teilsequenzen entfernt oder natürliche oder synthetische Sequenzen hinzugefügt werden. Für die
25 Verbindung der DNA-Fragmente untereinander können an die Fragmente Adaptoren oder Linker angesetzt werden, siehe z.B. Sambrook et al., 1989, *Molecular Cloning, A Laboratory Manual*, 2. Aufl. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; oder Winnacker "Gene und Klone", VCH Weinheim 2. Auflage 1996

Die Herstellung von Pflanzenzellen mit einer verringerten Aktivität eines Genprodukts kann
30 beispielsweise erzielt werden durch die Expression mindestens einer entsprechenden antisense-RNA, einer sense-RNA zur Erzielung eines Cosuppressionseffektes oder die Expression mindestens eines entsprechend konstruierten Ribozyms, das spezifisch Transkripte des obengenannten Genprodukts spaltet. Hierzu können zum einen DNA-Moleküle verwendet werden, die die gesamte codierende Sequenz eines Genprodukts einschließlich eventuell vorhandener flankierender Sequenzen umfassen, als
35 auch DNA-Moleküle, die nur Teile der codierenden Sequenz umfassen, wobei diese Teile lang genug sein müssen, um in den Zellen einen antisense-Effekt zu bewirken. Möglich ist auch die Verwendung

von DNA-Sequenzen, die einen hohen Grad an Homologie zu den codierten Sequenzen eines Genprodukts aufweisen, aber nicht vollkommen identisch sind.

Bei der Expression von Nucleinsäuremolekülen in Pflanzen kann das synthetisierte Protein in jedem beliebigen Kompartiment der pflanzlichen Zelle lokalisiert sein. Um aber die Lokalisation in einem bestimmten Kompartiment zu erreichen, kann z.B. die codierende Region mit DNA-Sequenzen verknüpft werden, die die Lokalisierung in einem bestimmten Kompartiment gewährleisten. Derartige Sequenzen sind dem Fachmann bekannt (siehe beispielsweise Braun et al., EMBO J. 11 (1992), 3219-3227; Wolter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85 (1988), 846-850; Sonnewald et al., Plant J. 1 (1991), 95-106). Die Expression der Nucleinsäuremoleküle kann auch in den Organellen der Pflanzenzellen stattfinden.

Die transgenen Pflanzenzellen können nach bekannten Techniken zu ganzen Pflanzen regeneriert werden. Bei den transgenen Pflanzen kann es sich prinzipiell um Pflanzen jeder beliebigen Pflanzenspezies handeln, d.h., sowohl monokotyle als auch dikotyle Pflanzen. So sind transgene Pflanzen erhältlich, die veränderte Eigenschaften durch Überexpression, Suppression oder Inhibierung homologer (= natürlicher) Gene oder Gensequenzen oder Expression heterologer (= fremder) Gene oder Gensequenzen aufweisen.

Vorzugsweise können die erfindungsgemäßen Verbindungen (I) in transgenen Kulturen eingesetzt werden, welche gegen Wachstumsstoffe, wie z.B. 2,4-D, Dicamba oder gegen Herbizide, die essentielle Pflanzenenzyme, z.B. Acetolactatsynthasen (ALS), EPSP Synthasen, Glutaminsynthasen (GS) oder Hydroxyphenylpyruvat Dioxygenasen (HPPD) hemmen, respektive gegen Herbizide aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe, der Glyphosate, Glufosinate oder Benzoylisoxazole und analogen Wirkstoffe, oder gegen beliebige Kombinationen dieser Wirkstoffe, resistent sind.

Besonders bevorzugt können die erfindungsgemäßen Verbindungen in transgenen Kulturpflanzen eingesetzt werden, die gegen eine Kombination von Glyphosaten und Glufosinaten, Glyphosaten und Sulfonylharnstoffen oder Imidazolinonen resistent sind. Ganz besonders bevorzugt können die erfindungsgemäßen Verbindungen in transgenen Kulturpflanzen wie z. B. Mais oder Soja mit dem Handelsnamen oder der Bezeichnung Optimum™ GAT™ (Glyphosate ALS Tolerant) eingesetzt werden.

Bei der Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe in transgenen Kulturen treten neben den in anderen Kulturen zu beobachtenden Wirkungen gegenüber Schädlingen oftmals Wirkungen auf, die für die Applikation in der jeweiligen transgenen Kultur spezifisch sind, beispielsweise ein verändertes oder speziell erweitertes Unkrautspektrum, das bekämpft werden kann, veränderte Aufwandmengen, die

für die Applikation eingesetzt werden können, vorzugsweise gute Kombinierbarkeit mit den Herbiziden, gegenüber denen die transgene Kultur resistent ist, sowie Beeinflussung von Wuchs und Ertrag der transgenen Kulturpflanzen.

- 5 Gegenstand der Erfindung ist deshalb auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) als Herbizide zur Bekämpfung von Schadpflanzen in transgenen Kulturpflanzen.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in Form von Spritzpulvern, emulgierbaren Konzentraten, versprühbaren Lösungen, Stäubemitteln oder Granulaten in den üblichen Zubereitungen angewendet
10 werden. Gegenstand der Erfindung sind deshalb auch herbizide und pflanzenwachstumsregulierende Mittel, welche die erfindungsgemäßen Verbindungen enthalten.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können auf verschiedene Art formuliert werden, je nachdem welche biologischen und/oder chemisch-physikalischen Parameter vorgegeben sind. Als
15 Formulierungsmöglichkeiten kommen beispielsweise in Frage: Spritzpulver (WP), wasserlösliche Pulver (SP), wasserlösliche Konzentrate, emulgierbare Konzentrate (EC), Emulsionen (EW), wie Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, versprühbare Lösungen, Suspensionskonzentrate (SC), Dispersionen auf Öl- oder Wasserbasis, ölmischbare Lösungen, Kapselsuspensionen (CS), Stäubemittel (DP), Beizmittel, Granulate für die Streu- und Bodenapplikation, Granulate (GR) in Form von Mikro-,
20 Sprüh-, Aufzugs- und Adsorptionsgranulaten, wasserdispergierbare Granulate (WG), wasserlösliche Granulate (SG), ULV-Formulierungen, Mikrokapseln und Wachse. Diese einzelnen Formulierungstypen sind im Prinzip bekannt und werden beispielsweise beschrieben in:
Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hanser Verlag München, 4. Aufl. 1986,
Wade van Valkenburg, "Pesticide Formulations", Marcel Dekker, N.Y., 1973, K. Martens, "Spray
25 Drying" Handbook, 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd. London.

Die notwendigen Formulierungshilfsmittel wie Inertmaterialien, Tenside, Lösungsmittel und weitere Zusatzstoffe sind ebenfalls bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Watkins, "Handbook of
30 Insecticide Dust Diluents and Carriers", 2nd Ed., Darland Books, Caldwell N.J., H.v. Olphen, "Introduction to Clay Colloid Chemistry", 2nd Ed., J. Wiley & Sons, N.Y., C. Marsden, "Solvents Guide", 2nd Ed., Interscience, N.Y. 1963, McCutcheon's "Detergents and Emulsifiers Annual", MC Publ. Corp., Ridgewood N.J., Sisley and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N.Y. 1964, Schönfeldt, "Grenzflächenaktive Äthylenoxid-addukte", Wiss. Verlagsgesell., Stuttgart 1976, Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hanser Verlag München, 4.
35 Aufl. 1986.

Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen Wirkstoffen, wie z.B. Insektiziden, Akariziden, Herbiziden, Fungiziden, sowie mit Safenern, Düngemitteln und/oder Wachstumsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix.


- 5 Als Kombinationspartner für die erfindungsgemäßen Verbindungen in Mischungsformulierungen oder im Tank-Mix sind beispielsweise bekannte Wirkstoffe, die auf einer Inhibition von beispielsweise Acetolactat-Synthase, Acetyl-CoA-Carboxylase, Cellulose-Synthase, Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase, Glutamin-Synthetase, p-Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase, Phytoendesaturase, Photosystem I, Photosystem II oder Protoporphyrinogen-Oxidase beruhen, einsetzbar, wie sie z.B. aus
- 10 Weed Research 26 (1986) 441-445 oder "The Pesticide Manual", 16th edition, The British Crop Protection Council und the Royal Soc. of Chemistry, 2006 und dort zitierter Literatur beschrieben sind. Nachfolgend werden beispielhaft bekannte Herbizide oder Pflanzenwachstumsregulatoren genannt, die mit den erfindungsgemäßen Verbindungen kombiniert werden können, wobei diese Wirkstoffe entweder mit ihrem "common name" in der englischsprachigen Variante gemäß International Organization for
- 15 Standardization (ISO) oder mit dem chemischen Namen bzw. mit der Codenummer bezeichnet sind. Dabei sind stets sämtliche Anwendungsformen wie beispielsweise Säuren, Salze, Ester sowie auch alle isomeren Formen wie Stereoisomere und optische Isomere umfaßt, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind.


Beispiele für solche herbiziden Mischungspartner sind:

- 20 Acetochlor, acifluorfen, acifluorfen-sodium, aclonifen,alachlor, allidochlor, alloxydim, alloxydim-sodium, ametryn, amicarbazone, amidochlor, amidosulfuron, aminocyclopyrachlor, aminocyclopyrachlor-potassium, aminocyclopyrachlor-methyl, aminopyralid, amitrole, ammoniumsulfamate, anilofos, asulam, atrazine, azafenidin, azimsulfuron, beflubutamid, benazolin, benazolin-ethyl, benfluralin, benfuresate, bensulfuron, bensulfuron-methyl, bensulide, bentazone, benzobicyclon,
- 25 benzofenap, bicyclopyron, bifenox, bilanafos, bilanafos-sodium, bispyribac, bispyribac-sodium, bromacil, bromobutide, bromofenoxim, bromoxynil, bromoxynil-butyrate, -potassium, -heptanoate und -octanoate, busoxinone, butachlor, butafenacil, butamifos, butenachlor, butralin, butoxydim, butylate, cafenstrole, carbetamide, carfentrazone, carfentrazone-ethyl, chloramben, chlorbromuron, chlorfenac, chlorfenac-sodium, chlorfenprop, chlorflurenol, chlorflurenol-methyl, chloridazon, chlorimuron,
- 30 chlorimuron-ethyl, chlorophthalim, chlorotoluron, chlorthal-dimethyl, chlorsulfuron, 3-[5-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-4-hydroxy-1-methylimidazolidin-2-on, cinidon, cinidon-ethyl, cinmethylin, cinosulfuron, clacyfos, clethodim, clodinafop, clodinafop-propargyl, clomazone, clomeprop, clopyralid, cloransulam, cloransulam-methyl, cumyluron, cyanamide, cyanazine, cycloate, cyclopyranil, cyclopyrimorate, cyclosulfamuron, cycloxydim, cyhalofop, cyhalofop-butyl, cyprazine, 2,4-D, 2,4-D-
- 35 butotyl, -butyl, -dimethylammonium, -diolamin, -ethyl, 2-ethylhexyl, -isobutyl, -isooctyl, -

isopropylammonium, -potassium, -triisopropanolammonium und -trolamine, 2,4-DB, 2,4-DB-butyl, -dimethylammonium, isoocetyl, -potassium und -sodium, daimuron (dymron), dalapon, dazomet, n-decanol, desmedipham, detosyl-pyrazolate (DTP), dicamba, dichlobenil, 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one, 2-(2,5-dichlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one, dichlorprop, 5 dichlorprop-P, diclofop, diclofop-methyl, diclofop-P-methyl, diclosulam, difenzoquat, diflufenican, diflufenzopyr, diflufenzopyr-sodium, dimefuron, dimepiperate, dimethachlor, dimethametryn, dimethenamid, dimethenamid-P, dimetrasulfuron, dinitramine, dinoterb, diphenamid, diquat, diquat-dibromid, dithiopyr, diuron, DNOC, endothal, EPTC, esprocarb, ethalfluralin, ethametsulfuron, ethamet-sulfuron-methyl, ethiozin, ethofumesate, ethoxyfen, ethoxyfen-ethyl, ethoxysulfuron, etobenzanid, F-10 9600, F-5231, i.e. N-[2-Chlor-4-fluor-5-[4-(3-fluorpropyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl]-phenyl]-ethansulfonamid, F-7967, i.e. 3-[7-Chlor-5-fluor-2-(trifluormethyl)-1H-benzimidazol-4-yl]-1-methyl-6-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion, fenoxaprop, fenoxaprop-P, fenoxaprop-ethyl, fenoxaprop-P-ethyl, fenoxasulfone, fenquinotrine, fentrazamide, flamprop, flamprop-M-isopropyl, flamprop-M-methyl, flazasulfuron, florasulam, florpyrauxifen, florpyrauxifen-benzyl, fluazifop, fluazifop-P, 15 fluazifop-butyl, fluazifop-P-butyl, flucarbazone, flucarbazone-sodium, flucetosulfuron, fluchloralin, flufenacet, flufenpyr, flufenpyr-ethyl, flumetsulam, flumiclorac, flumiclorac-pentyl, flumioxazin, fluometuron, flurenol, flurenol-butyl, -dimethylammonium und -methyl, fluoroglycofen, fluoroglycofen-ethyl, flupropanate, flupyr-sulfuron, flupyr-sulfuron-methyl-sodium, fluridone, flurochloridone, fluroxypyr, fluroxypyr-meptyl, flurtamone, fluthiacet, fluthiacet-methyl, fomesafen, fomesafen-sodium, 20 foramsulfuron, fosamine, glufosinate, glufosinate-ammonium, glufosinate-P-sodium, glufosinate-P-ammonium, glufosinate-P-sodium, glyphosate, glyphosate-ammonium, -isopropyl-ammonium, -diammonium, -dimethylammonium, -potassium, -sodium und -trimesium, H-9201, i.e. O-(2,4-Dimethyl-6-nitrophenyl)-O-ethyl-isopropylphosphoramidothioat, halauxifen, halauxifen-methyl, halosafen, halosulfuron, halosulfuron-methyl, haloxyfop, haloxyfop-P, haloxyfop-ethoxyethyl, 25 haloxyfop-P-ethoxyethyl, haloxyfop-methyl, haloxyfop-P-methyl, hexazinone, HW-02, i.e. 1-(Dimethoxyphosphoryl)-ethyl-(2,4-dichlorphenoxy)acetat, 4-Hydroxy-1-methoxy-5-methyl-3-[4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]imidazolidin-2-on, 4-Hydroxy-1-methyl-3-[4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]imidazolidin-2-on, imazamethabenz, Imazamethabenz-methyl, imazamox, imazamox-ammonium, imazapic, imazapic-ammonium, imazapyr, imazapyr-isopropylammonium, imazaquin, imazaquin-ammonium, 30 imazethapyr, imazethapyr-immonium, imazosulfuron, indanofan, indaziflam, iodosulfuron, iodosulfuron-methyl-sodium, ioxynil, ioxynil-octanoate, -potassium und sodium, ipfencarbazone, isoproturon, isouron, isoxaben, isoxaflutole, karbutilate, KUH-043, i.e. 3-({[5-(Difluormethyl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl}sulfonyl)-5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol, ketospiradox, lactofen, lenacil, linuron, MCPA, MCPA-butotyl, -dimethylammonium, -2-ethylhexyl, - 35 isopropylammonium, -potassium und -sodium, MCPB, MCPB-methyl, -ethyl und -sodium, mecoprop, mecoprop-sodium, und -butotyl, mecoprop-P, mecoprop-P-butotyl, -dimethylammonium, -2-ethylhexyl und -potassium, mefenacet, mefluidide, mesosulfuron, mesosulfuron-methyl, mesotrione,

methabenzthiazuron, metam, metamifop, metamitron, metazachlor, metazosulfuron,
methabenzthiazuron, methiopyrsulfuron, methiozolin, methyl isothiocyanate, metabromuron,
metolachlor, S-metolachlor, metosulam, metoxuron, metribuzin, metsulfuron, metsulfuron-methyl,
molinat, monolinuron, monosulfuron, monosulfuron-ester, MT-5950, i.e. N-[3-chlor-4-(1-methylethyl)-
5 phenyl]-2-methylpentanamid, NGGC-0111, napropamide, NC-310, i.e. 4-(2,4-Dichlorbenzoyl)-1-methyl-
5-benzyloxy-pyrazol, neburon, nicosulfuron, nonanoic acid (Pelargonsäure), norflurazon, oleic acid (fatty
acids), orbencarb, orthosulfamuron, oryzalin, oxadiargyl, oxadiazon, oxasulfuron, oxaziclomefon,
oxotrione (lancotrione), oxyfluorfen, paraquat, paraquat dichloride, pebulate, pendimethalin,
penoxsulam, pentachlorphenol, pentoxazone, pethoxamid, petroleum oils, phenmedipham, picloram,
10 picolinafen, pinoxaden, piperophos, pretilachlor, primisulfuron, primisulfuron-methyl, prodiamine,
profoxydim, prometon, prometryn, propachlor, propanil, propaquizafop, propazine, propham, prop-
isochlor, propoxycarbazone, propoxycarbazone-sodium, propyrisulfuron, propyzamide, prosulfocarb,
prosulfuron, pyraclonil, pyraflufen, pyraflufen-ethyl, pyrasulfotole, pyrazolynate (pyrazolate), pyrazo-
sulfuron, pyrazosulfuron-ethyl, pyrazoxyfen, pyribambenz, pyribambenz-isopropyl, pyribambenz-
15 propyl, pyribenzoxim, pyributicarb, pyridafol, pyridate, pyrifitalid, pyriminobac, pyriminobac-methyl,
pyrimisulfan, pyrithiobac, pyrithiobac-sodium, pyroxasulfone, pyroxsulam, quinclorac, quinmerac,
quinoclamine, quizalofop, quizalofop-ethyl, quizalofop-P, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl,
rimsulfuron, saflufenacil, sethoxydim, siduron, simazine, simetryn, sulcotrion, sulfentrazone, sulfo-
meturon, sulfometuron-methyl, sulfosulfuron, , SYN-523, SYP-249, i.e. 1-Ethoxy-3-methyl-1-oxobut-
20 3-en-2-yl-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoat, SYP-300, i.e. 1-[7-Fluor-3-oxo-4-
(prop-2-in-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-3-propyl-2-thioxoimidazolidin-4,5-dion, 2,3,6-
TBA, TCA (Trifluoressigsäure), TCA-sodium, tebuthiuron, tefuryltrione, tembotrione, tepraloxydim,
terbacil, terbucarb, terbumeton, terbuthylazin, terbutryn, thenylchlor, thiazopyr, thiencarbazone,
thiencarbazone-methyl, thifensulfuron, thifensulfuron-methyl, thiobencarb, tiafenacil, tolpyralate,
25 topramezone, tralkoxydim, triafamone, tri-allate, triasulfuron, triaziflam, tribenuron, tribenuron-methyl,
triclopyr, trietazine, trifloxysulfuron, trifloxysulfuron-sodium, trifludimoxazin, trifluralin, triflusulfuron,
triflusulfuron-methyl, tritosulfuron, urea sulfate, vernolate, ZJ-0862, i.e. 3,4-Dichlor-N-{2-[(4,6-
dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzyl}anilin, sowie die folgenden Verbindungen:






Beispiele für Pflanzenwachstumsregulatoren als mögliche Mischungspartner sind:

- Acibenzolar, acibenzolar-S-methyl, 5-Aminolävulinsäure, ancymidol, 6-benzylaminopurine, Brassinolid, Catechin, chlormequat chloride, cloprop, cyclanilide, 3-(Cycloprop-1-enyl)propionsäure, daminozide, dazomet, n-decanol, dikegulac, dikegulac-sodium, endothal, endothal-
- 5 dipotassium, -disodium, und mono(N,N-dimethylalkylammonium), ethephon, flumetralin, flurenol, flurenol-butyl, flurprimidol, forchlorfenuron, gibberellic acid, inabenfide, indol-3-acetic acid (IAA), 4-indol-3-ylbutyric acid, isoprothiolane, probenazole, Jasmonsäure, Jasmonsäuremethylester, maleic hydrazide, mepiquat chloride, 1-methylcyclopropene, 2-(1-naphthyl)acetamide, 1-naphthylacetic acid,
- 10 2-naphthyloxyacetic acid, nitrophenolate-mixture, 4-Oxo-4[(2-phenylethyl)amino]buttersäure, paclobutrazol, N-phenylphthalamic acid, prohexadione, prohexadione-calcium, prohydrojasmon, Salicylsäure, Strigolacton, tecnazene, thidiazuron, triacantanol, trinexapac, trinexapac-ethyl, tsitodef, uniconazole, uniconazole-P.
- 15 Safener, die in Kombination mit den erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) und ggf. in Kombinationen mit weiteren Wirkstoffen wie z.B. Insektiziden, Akariziden, Herbiziden, Fungiziden wie oben aufgelistet, eingesetzt werden können, sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:

S1) Verbindungen der Formel (S1),




20 wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

n_A ist eine natürliche Zahl von 0 bis 5, vorzugsweise 0 bis 3;

R_A^1 ist Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, Nitro oder (C₁-C₄)Haloalkyl;

W_A ist ein unsubstituierter oder substituierter divalenter heterocyclischer Rest aus der Gruppe der teilungesättigten oder aromatischen Fünfring-Heterocyclen mit 1 bis 3 Heteroringatomen aus der Gruppe N und O, wobei mindestens ein N-Atom und höchstens ein O-Atom im Ring enthalten ist, vorzugsweise ein Rest aus der Gruppe (W_A^1) bis (W_A^4),

5 m_A ist 0 oder 1;



R_A^2 ist OR_A^3 , SR_A^3 oder $NR_A^3R_A^4$ oder ein gesättigter oder ungesättigter 3- bis 7-gliedriger Heterocyclus mit mindestens einem N-Atom und bis zu 3 Heteroatomen, vorzugsweise aus der Gruppe O und S, der über das N-Atom mit der Carbonylgruppe in (S1) verbunden ist und unsubstituiert oder durch Reste aus der Gruppe (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist, vorzugsweise ein Rest der Formel OR_A^3 , NHR_A^4 oder $N(CH_3)_2$, insbesondere der Formel OR_A^3 ;

R_A^3 ist Wasserstoff oder ein unsubstituierter oder substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, vorzugsweise mit insgesamt 1 bis 18 C-Atomen;

R_A^4 ist Wasserstoff, (C₁-C₆)Alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy oder substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl;

15 R_A^5 ist H, (C₁-C₈)Alkyl, (C₁-C₈)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy(C₁-C₈)Alkyl, Cyano oder $COOR_A^9$, worin R_A^9 Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₁-C₈)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy-(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₆)Hydroxyalkyl, (C₃-C₁₂)Cycloalkyl oder Tri-(C₁-C₄)-alkyl-silyl ist;

R_A^6 , R_A^7 , R_A^8 sind gleich oder verschieden Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₁-C₈)Haloalkyl, (C₃-C₁₂)Cycloalkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl;

20 vorzugsweise:

a) Verbindungen vom Typ der Dichlorphenylpyrazolin-3-carbonsäure (S1^a), vorzugsweise Verbindungen wie 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-2-pyrazolin-3-carbonsäure, 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-2-pyrazolin-3-carbonsäureethylester (S1-1) ("Mefenpyr-diethyl"), und verwandte Verbindungen, wie sie in der WO-A-91/07874 beschrieben sind;

25 b) Derivate der Dichlorphenylpyrazolcarbonsäure (S1^b), vorzugsweise Verbindungen wie 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-methyl-pyrazol-3-carbonsäureethylester (S1-2),

1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-isopropyl-pyrazol-3-carbonsäureethylester (S1-3),

1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(1,1-dimethyl-ethyl)pyrazol-3-carbonsäureethyl-ester (S1-4) und verwandte Verbindungen, wie sie in EP-A-333 131 und EP-A-269 806 beschrieben sind;

c) Derivate der 1,5-Diphenylpyrazol-3-carbonsäure (S1^c), vorzugsweise Verbindungen wie

5 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-phenylpyrazol-3-carbonsäureethylester (S1-5),

1-(2-Chlorphenyl)-5-phenylpyrazol-3-carbonsäuremethylester (S1-6) und verwandte Verbindungen wie sie beispielsweise in der EP-A-268554 beschrieben sind;


d) Verbindungen vom Typ der Triazolcarbonsäuren (S1^d), vorzugsweise Verbindungen wie

10 Fenchlorazol(-ethylester), d.h. 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-trichlormethyl-(1H)-1,2,4-triazol-3-carbonsäure-ethylester (S1-7), und verwandte Verbindungen wie sie in EP-A-174 562 und EP-A-346 620 beschrieben sind;

e) Verbindungen vom Typ der 5-Benzyl- oder 5-Phenyl-2-isoxazolin-3- carbonsäure oder der 5,5-Diphenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäure (S1^e), vorzugsweise Verbindungen wie

15 5-(2,4-Dichlorbenzyl)-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (S1-8) oder 5-Phenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (S1-9) und verwandte Verbindungen, wie sie in WO-A-91/08202 beschrieben sind, bzw. 5,5-Diphenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäure (S1-10) oder 5,5-Diphenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (S1-11) ("Isoxadifen-ethyl") oder -n-propylester (S1-12) oder der 5-(4-Fluorphenyl)-5-phenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (S1-13), wie sie in der Patentanmeldung WO-A-95/07897 beschrieben sind.

20 S2) Chinolinderivate der Formel (S2),



wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

R_B^1 ist Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, Nitro oder (C₁-C₄)Haloalkyl;

n_B ist eine natürliche Zahl von 0 bis 5, vorzugsweise 0 bis 3;

R_B^2 ist OR_B^3 , SR_B^3 oder $NR_B^3R_B^4$ oder ein gesättigter

25 oder ungesättigter 3- bis 7-gliedriger Heterocyclus mit mindestens einem N-Atom und bis zu 3

Heteroatomen, vorzugsweise aus der Gruppe O und S, der über das N-Atom mit der Carbonylgruppe in

(S2) verbunden ist und unsubstituiert oder durch Reste aus der Gruppe (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist, vorzugsweise ein Rest der Formel OR_B³, NHR_B⁴ oder N(CH₃)₂, insbesondere der Formel OR_B³;

R_B³ ist Wasserstoff oder ein unsubstituierter oder substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffrest,
5 vorzugsweise mit insgesamt 1 bis 18 C-Atomen;


R_B⁴ ist Wasserstoff, (C₁-C₆)Alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy oder substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl;

T_B ist eine (C₁ oder C₂)-Alkandiyllkette, die unsubstituiert oder mit einem oder zwei (C₁-C₄)Alkylresten oder mit [(C₁-C₃)-Alkoxy]-carbonyl substituiert ist;

vorzugsweise:

- 10 a) Verbindungen vom Typ der 8-Chinolinoxinessigsäure (S2^a), vorzugsweise
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-(1-methylhexyl)ester ("Cloquintocet-mexyl") (S2-1),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-(1,3-dimethyl-but-1-yl)ester (S2-2),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-4-allyloxy-butylester (S2-3),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-1-allyloxy-prop-2-ylester (S2-4),
15 (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäureethylester (S2-5),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäuremethylester (S2-6),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäureallylester (S2-7),
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-2-(2-propyliden-iminoxy)-1-ethylester (S2-8), (5-Chlor-8-
chinolinoxinessigsäure-2-oxo-prop-1-ylester (S2-9) und verwandte Verbindungen, wie sie in
20 EP-A-86 750, EP-A-94 349 und EP-A-191 736 oder EP-A-0 492 366 beschrieben sind, sowie (5-Chlor-
8-chinolinoxinessigsäure (S2-10), deren Hydrate und Salze, beispielsweise deren Lithium-, Natrium-
Kalium-, Kalzium-, Magnesium-, Aluminium-, Eisen-, Ammonium-, quartäre Ammonium-, Sulfonium-,
oder Phosphoniumsalze wie sie in der WO-A-2002/34048 beschrieben sind;
- b) Verbindungen vom Typ der (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)malonsäure (S2^b), vorzugsweise
25 Verbindungen wie (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)malonsäurediethylester,
(5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)diallylester, (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)methyl-ethylester
und verwandte Verbindungen, wie sie in EP-A-0 582 198 beschrieben sind.

S3) Verbindungen der Formel (S3)



wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

R_C^1 ist (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Haloalkenyl, (C₃-C₇)Cycloalkyl, vorzugsweise Dichlormethyl;


- 5 R_C^2 , R_C^3 sind gleich oder verschieden Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₂-C₄)Haloalkenyl, (C₁-C₄)Alkylcarbamoyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₂-C₄)Alkenylcarbamoyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy-(C₁-C₄)alkyl, Dioxolanyl-(C₁-C₄)alkyl, Thiazolyl, Furyl, Furylalkyl, Thieryl, Piperidyl, substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, oder R_C^2 und R_C^3 bilden zusammen einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Ring, vorzugsweise einen Oxazolidin-,
10 Thiazolidin-, Piperidin-, Morpholin-, Hexahydropyrimidin- oder Benzoxazinring;

vorzugsweise:

Wirkstoffe vom Typ der Dichloracetamide, die häufig als Voraufaufsafener (bodenwirksame Safener) angewendet werden, wie z. B.

- "Dichlormid" (N,N-Diallyl-2,2-dichloracetamid) (S3-1),
15 "R-29148" (3-Dichloracetyl-2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidin) der Firma Stauffer (S3-2),
"R-28725" (3-Dichloracetyl-2,2,-dimethyl-1,3-oxazolidin) der Firma Stauffer (S3-3),
"Benoxacor" (4-Dichloracetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazin) (S3-4),
"PPG-1292" (N-Allyl-N-[(1,3-dioxolan-2-yl)-methyl]-dichloracetamid) der Firma PPG Industries (S3-5),
20 "DKA-24" (N-Allyl-N-[(allylaminocarbonyl)methyl]-dichloracetamid) der Firma Sagro-Chem (S3-6),
"AD-67" oder "MON 4660" (3-Dichloracetyl-1-oxa-3-aza-spiro[4,5]decan) der Firma Nitrokemia bzw. Monsanto (S3-7),
"TI-35" (1-Dichloracetyl-azepan) der Firma TRI-Chemical RT (S3-8),
"Diclonon" (Dicyclonon) oder "BAS145138" oder "LAB145138" (S3-9)
25 ((RS)-1-Dichloracetyl-3,3,8a-trimethylperhydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin-6-on) der Firma BASF,
"Furilazol" oder "MON 13900" ((RS)-3-Dichloracetyl-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidin) (S3-10);
sowie dessen (R)-Isomer (S3-11).

S4) N-Acylsulfonamide der Formel (S4) und ihre Salze,



worin die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

A_D ist $SO_2-NR_D^3-CO$ oder $CO-NR_D^3-SO_2$

X_D ist CH oder N;

5 R_D^1 ist $CO-NR_D^5R_D^6$ oder $NHCO-R_D^7$;

R_D^2 ist Halogen, (C_1-C_4) Haloalkyl, (C_1-C_4) Haloalkoxy, Nitro, (C_1-C_4) Alkyl, (C_1-C_4) Alkoxy, (C_1-C_4) Alkylsulfonyl, (C_1-C_4) Alkoxy-carbonyl oder (C_1-C_4) Alkyl-carbonyl;

R_D^3 ist Wasserstoff, (C_1-C_4) Alkyl, (C_2-C_4) Alkenyl oder (C_2-C_4) Alkinyl;

10 R_D^4 ist Halogen, Nitro, (C_1-C_4) Alkyl, (C_1-C_4) Haloalkyl, (C_1-C_4) Haloalkoxy, (C_3-C_6) Cycloalkyl, Phenyl, (C_1-C_4) Alkoxy, Cyano, (C_1-C_4) Alkylthio, (C_1-C_4) Alkylsulfinyl, (C_1-C_4) Alkylsulfonyl, (C_1-C_4) Alkoxy-carbonyl oder (C_1-C_4) Alkyl-carbonyl;

15 R_D^5 ist Wasserstoff, (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl, (C_2-C_6) Alkenyl, (C_2-C_6) Alkinyl, (C_5-C_6) Cycloalkenyl, Phenyl oder 3- bis 6-gliedriges Heterocyclenyl enthaltend v_D Heteroatome aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, wobei die sieben letztgenannten Reste durch v_D Substituenten aus der Gruppe Halogen, (C_1-C_6) Alkoxy, (C_1-C_6) Haloalkoxy, (C_1-C_2) Alkylsulfinyl, (C_1-C_2) Alkylsulfonyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl, (C_1-C_4) Alkoxy-carbonyl, (C_1-C_4) Alkyl-carbonyl und Phenyl und im Falle cyclischer Reste auch (C_1-C_4) Alkyl und (C_1-C_4) Haloalkyl substituiert sind;

20 R_D^6 ist Wasserstoff, (C_1-C_6) Alkyl, (C_2-C_6) Alkenyl oder (C_2-C_6) Alkinyl, wobei die drei letztgenannten Reste durch v_D Reste aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) Alkyl, (C_1-C_4) Alkoxy und (C_1-C_4) Alkylthio substituiert sind, oder

R_D^5 und R_D^6 gemeinsam mit dem dem sie tragenden Stickstoffatom einen Pyrrolidinyl- oder Piperidinyl-Rest bilden;

25 R_D^7 ist Wasserstoff, (C_1-C_4) Alkylamino, Di- (C_1-C_4) alkylamino, (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl, wobei die 2 letztgenannten Reste durch v_D Substituenten aus der Gruppe Halogen, (C_1-C_4) Alkoxy, (C_1-C_6) Haloalkoxy und (C_1-C_4) Alkylthio und im Falle cyclischer Reste auch (C_1-C_4) Alkyl und (C_1-C_4) Haloalkyl substituiert sind;


n_D ist 0, 1 oder 2;

m_D ist 1 oder 2;

v_D ist 0, 1, 2 oder 3;

davon bevorzugt sind Verbindungen vom Typ der N-Acylsulfonamide, z.B. der nachfolgenden Formel

5 (S4^a), die z. B. bekannt sind aus WO-A-97/45016



worin

R_D^7 (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl, wobei die 2 letztgenannten Reste durch v_D Substituenten aus der Gruppe Halogen, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₆)Haloalkoxy und (C₁-C₄)Alkylthio und im Falle cyclischer

10 Reste auch (C₁-C₄)Alkyl und (C₁-C₄)Haloalkyl substituiert sind;


R_D^4 Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, CF₃;

m_D 1 oder 2;

v_D ist 0, 1, 2 oder 3 bedeutet;

sowie

15 Acylsulfamoylbenzoesäureamide, z.B. der nachfolgenden Formel (S4^b), die z.B. bekannt sind aus WO-A-99/16744,



z.B. solche worin

R_D^5 = Cyclopropyl und (R_D^4) = 2-OMe ist ("Cyprosulfamide", S4-1),

20 R_D^5 = Cyclopropyl und (R_D^4) = 5-Cl-2-OMe ist (S4-2),


R_D^5 = Ethyl und (R_D^4) = 2-OMe ist (S4-3),

R_D^5 = Isopropyl und $(R_D^4) = 5\text{-Cl-2-OMe}$ ist (S4-4) und

R_D^5 = Isopropyl und $(R_D^4) = 2\text{-OMe}$ ist (S4-5).

sowie

5 Verbindungen vom Typ der N-Acylsulfamoylphenylharnstoffe der Formel (S4^c), die z.B. bekannt sind aus der EP-A-365484,



worin

R_D^8 und R_D^9 unabhängig voneinander Wasserstoff, $(C_1\text{-}C_8)$ Alkyl, $(C_3\text{-}C_8)$ Cycloalkyl, $(C_3\text{-}C_6)$ Alkenyl, $(C_3\text{-}C_6)$ Alkinyl,

10 R_D^4 Halogen, $(C_1\text{-}C_4)$ Alkyl, $(C_1\text{-}C_4)$ Alkoxy, CF_3

m_D 1 oder 2 bedeutet;

beispielsweise


1-[4-(N-2-Methoxybenzoylsulfamoyl)phenyl]-3-methylharnstoff („Metcamifen“, S4-6),

1-[4-(N-2-Methoxybenzoylsulfamoyl)phenyl]-3,3-dimethylharnstoff,

15 1-[4-(N-4,5-Dimethylbenzoylsulfamoyl)phenyl]-3-methylharnstoff,

sowie

N-Phenylsulfonylterephthalamide der Formel (S4^d), die z.B. bekannt sind aus CN 101838227,



z.B. solche worin

20 R_D^4 Halogen, $(C_1\text{-}C_4)$ Alkyl, $(C_1\text{-}C_4)$ Alkoxy, CF_3 ;

m_D 1 oder 2;

R_D^5 Wasserstoff, (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, (C₅-C₆)Cycloalkenyl bedeutet.


S5) Wirkstoffe aus der Klasse der Hydroxyaromaten und der aromatisch-aliphatischen Carbonsäurederivate (S5), z.B.

- 5 3,4,5-Triacetoxybenzoesäureethylester, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoesäure, 3,5-Dihydroxybenzoesäure, 4-Hydroxysalicylsäure, 4-Fluorsalicylsäure, 2-Hydroxyzimtsäure, 2,4-Dichlorzimtsäure, wie sie in der WO-A-2004/084631, WO-A-2005/015994, WO-A-2005/016001 beschrieben sind.

S6) Wirkstoffe aus der Klasse der 1,2-Dihydrochinoxalin-2-one (S6), z.B.

- 10 1-Methyl-3-(2-thienyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-on, 1-Methyl-3-(2-thienyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-thion, 1-(2-Aminoethyl)-3-(2-thienyl)-1,2-dihydro-chinoxalin-2-on-hydrochlorid, 1-(2-Methylsulfonylaminoethyl)-3-(2-thienyl)-1,2-dihydro-chinoxalin-2-on, wie sie in der WO-A-2005/112630 beschrieben sind.

S7) Verbindungen der Formel (S7), wie sie in der WO-A-1998/38856 beschrieben sind



15

worin die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

R_E^1, R_E^2 sind unabhängig voneinander Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkylamino, Di-(C₁-C₄)Alkylamino, Nitro;

A_E ist $COOR_E^3$ oder $COSR_E^4$

- 20 R_E^3, R_E^4 sind unabhängig voneinander Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, Cyanoalkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, Phenyl, Nitrophenyl, Benzyl, Halobenzyl, Pyridinylalkyl und Alkylammonium,

n_E^1 ist 0 oder 1

n_E^2, n_E^3 sind unabhängig voneinander 0, 1 oder 2,

vorzugsweise:


Diphenylmethoxyessigsäure,

Diphenylmethoxyessigsäureethylester,

Diphenylmethoxyessigsäuremethylester (CAS-Reg.Nr. 41858-19-9) (S7-1).

- 5 S8) Verbindungen der Formel (S8), wie sie in der WO-A-98/27049 beschrieben sind

worin



X_F CH oder N,

n_F für den Fall, dass $X_F=N$ ist, eine ganze Zahl von 0 bis 4 und

für den Fall, dass $X_F=CH$ ist, eine ganze Zahl von 0 bis 5 ,

- 10 R_F^1 Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Haloalkoxy, Nitro, (C₁-C₄)Alkylthio, (C₁-C₄)-Alkylsulfonyl, (C₁-C₄)Alkoxy-carbonyl, ggf. substituiertes Phenyl, ggf. substituiertes Phenoxy,

R_F^2 Wasserstoff oder (C₁-C₄)Alkyl

- 15 R_F^3 Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, oder Aryl, wobei jeder der vorgenannten C-haltigen Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere, vorzugsweise bis zu drei gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe, bestehend aus Halogen und Alkoxy substituiert ist; bedeuten, oder deren Salze,

vorzugsweise Verbindungen worin

X_F CH,

- 20 n_F eine ganze Zahl von 0 bis 2 ,

R_F^1 Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Haloalkoxy,

R_F^2 Wasserstoff oder (C₁-C₄)Alkyl,


- 25 R_F^3 Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, oder Aryl, wobei jeder der vorgenannten C-haltigen Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere, vorzugsweise bis zu drei gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe, bestehend aus Halogen und Alkoxy substituiert ist,

bedeuten,
oder deren Salze.

S9) Wirkstoffe aus der Klasse der 3-(5-Tetrazolylcarbonyl)-2-chinolone (S9), z.B. 1,2-Dihydro-4-hydroxy-1-ethyl-3-(5-tetrazolylcarbonyl)-2-chinolone (CAS-Reg.Nr. 219479-18-2), 1,2-Dihydro-4-hydroxy-1-methyl-3-(5-tetrazolylcarbonyl)-2-chinolone (CAS-Reg.Nr. 95855-00-8), wie sie in der WO-A-1999/000020 beschrieben sind.

S10) Verbindungen der Formeln (S10^a) oder (S10^b)

wie sie in der WO-A-2007/023719 und WO-A-2007/023764 beschrieben sind



10

worin

R_G^1 Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, Methoxy, Nitro, Cyano, CF₃, OCF₃

Y_G, Z_G unabhängig voneinander O oder S,

n_G eine ganze Zahl von 0 bis 4,

15 R_G^2 (C₁-C₁₆)Alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl, Aryl; Benzyl, Halogenbenzyl,

R_G^3 Wasserstoff oder (C₁-C₆)Alkyl bedeutet.

S11) Wirkstoffe vom Typ der Oxyimino-Verbindungen (S11), die als Saatbeizmittel bekannt sind, wie z. B.

20 "Oxabetrinil" ((Z)-1,3-Dioxolan-2-ylmethoxyimino(phenyl)acetonitril) (S11-1), das als Saatbeiz-Safener für Hirse gegen Schäden von Metolachlor bekannt ist,

"Fluxofenim" (1-(4-Chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1-ethanon-O-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-oxim) (S11-2), das als Saatbeiz-Safener für Hirse gegen Schäden von Metolachlor bekannt ist, und

"Cyometrinil" oder "CGA-43089" ((Z)-Cyanomethoxyimino(phenyl)acetonitril) (S11-3), das als Saatbeiz-Safener für Hirse gegen Schäden von Metolachlor bekannt ist.

5 S12) Wirkstoffe aus der Klasse der Isothiochromanone (S12), wie z.B. Methyl-[(3-oxo-1H-2-benzothiopyran-4(3H)-yliden)methoxy]acetat (CAS-Reg.Nr. 205121-04-6) (S12-1) und verwandte Verbindungen aus WO-A-1998/13361.

S13) Eine oder mehrere Verbindungen aus Gruppe (S13):

"Naphthalic anhydrid" (1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid) (S13-1), das als Saatbeiz-Safener für Mais gegen Schäden von Thiocarbamatherbiziden bekannt ist,

10 "Fenclorim" (4,6-Dichlor-2-phenylpyrimidin) (S13-2), das als Safener für Pretilachlor in gesättem Reis bekannt ist,

"Flurazole" (Benzyl-2-chlor-4-trifluormethyl-1,3-thiazol-5-carboxylat) (S13-3), das als Saatbeiz-Safener für Hirse gegen Schäden von Alachlor und Metolachlor bekannt ist,

15 "CL 304415" (CAS-Reg.Nr. 31541-57-8) (4-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-essigsäure) (S13-4) der Firma American Cyanamid, das als Safener für Mais gegen Schäden von Imidazolinonen bekannt ist,

"MG 191" (CAS-Reg.Nr. 96420-72-3) (2-Dichlormethyl-2-methyl-1,3-dioxolan) (S13-5) der Firma Nitrokemia, das als Safener für Mais bekannt ist,

"MG 838" (CAS-Reg.Nr. 133993-74-5) (2-propenyl 1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan-4-carbodithioat) (S13-6) der Firma Nitrokemia,

20 "Disulfoton" (O,O-Diethyl S-2-ethylthioethyl phosphordithioat) (S13-7),

"Dietholate" (O,O-Diethyl-O-phenylphosphorothioat) (S13-8),

"Mephenate" (4-Chlorphenyl-methylcarbamat) (S13-9).

S14) Wirkstoffe, die neben einer herbiziden Wirkung gegen Schadpflanzen auch Safenerwirkung an Kulturpflanzen wie Reis aufweisen, wie z. B.

25 "Dimepiperate" oder "MY 93" (S-1-Methyl-1-phenylethyl-piperidin-1-carbothioat), das als Safener für Reis gegen Schäden des Herbizids Molinate bekannt ist,


"Daimuron" oder "SK 23" (1-(1-Methyl-1-phenylethyl)-3-p-tolyl-harnstoff), das als Safener für Reis gegen Schäden des Herbizids Imazosulfuron bekannt ist,

"Cumyluron" = "JC 940" (3-(2-Chlorphenylmethyl)-1-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)harnstoff, siehe JP-A-60087254), das als Safener für Reis gegen Schäden einiger Herbizide bekannt ist,

"Methoxyphenon" oder "NK 049" (3,3'-Dimethyl-4-methoxy-benzophenon), das als Safener für Reis gegen Schäden einiger Herbizide bekannt ist,

- 5 "CSB" (1-Brom-4-(chlormethylsulfonyl)benzol) von Kumiai, (CAS-Reg.Nr. 54091-06-4), das als Safener gegen Schäden einiger Herbizide in Reis bekannt ist.

S15) Verbindungen der Formel (S15) oder deren Tautomere



wie sie in der WO-A-2008/131861 und WO-A-2008/131860 beschrieben sind

- 10 worin

R_H^1 einen (C_1-C_6) Haloalkylrest bedeutet und

R_H^2 Wasserstoff oder Halogen bedeutet und

R_H^3, R_H^4 unabhängig voneinander Wasserstoff, (C_1-C_{16}) Alkyl, (C_2-C_{16}) Alkenyl oder (C_2-C_{16}) Alkinyl,

- wobei jeder der letztgenannten 3 Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Cyano, (C_1-C_4) Alkoxy, (C_1-C_4) Haloalkoxy, (C_1-C_4) Alkylthio, (C_1-C_4) Alkylamino, Di $[(C_1-C_4)$ alkyl]-amino, $[(C_1-C_4)$ Alkoxy]-carbonyl, $[(C_1-C_4)$ Haloalkoxy]-carbonyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, Phenyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, und Heterocyclyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, substituiert ist,

- oder (C_3-C_6) Cycloalkyl, (C_4-C_6) Cycloalkenyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl, das an einer Seite des Rings mit einem 4 bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten carbocyclischen Ring kondensiert ist, oder (C_4-C_6) Cycloalkenyl, das an einer Seite des Rings mit einem 4 bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten carbocyclischen Ring kondensiert ist,

- wobei jeder der letztgenannten 4 Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Cyano, (C_1-C_4) Alkyl, (C_1-C_4) Haloalkyl, (C_1-C_4) Alkoxy, (C_1-C_4) Haloalkoxy, (C_1-C_4) Alkylthio, (C_1-C_4) Alkylamino, Di $[(C_1-C_4)$ alkyl]-amino, $[(C_1-C_4)$ Alkoxy]-carbonyl,

[(C₁-C₄)Haloalkoxy]-carbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, Phenyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, und Heterocyclyl, das unsubstituiert oder substituiert ist, substituiert ist,

bedeutet oder

- 5 R_H³ (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₂-C₄)Alkenyloxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder (C₂-C₄)Haloalkoxy bedeutet und
R_H⁴ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl bedeutet oder

- R_H³ und R_H⁴ zusammen mit dem direkt gebundenen N-Atom einen vier- bis achtgliedrigen heterocyclischen Ring, der neben dem N-Atom auch weitere Heteroringatome, vorzugsweise bis zu zwei weitere Heteroringatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann und der unsubstituiert oder durch
10 einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Haloalkoxy und (C₁-C₄)Alkylthio substituiert ist, bedeutet.

S16) Wirkstoffe, die vorrangig als Herbizide eingesetzt werden, jedoch auch Safenerwirkung auf Kulturpflanzen aufweisen, z.B.

- (2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure (2,4-D),
15 (4-Chlorphenoxy)essigsäure,
(R,S)-2-(4-Chlor-o-tolyloxy)propionsäure (Mecoprop),
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB),
(4-Chlor-o-tolyloxy)essigsäure (MCPA),
4-(4-Chlor-o-tolyloxy)buttersäure,
20 4-(4-Chlorphenoxy)buttersäure,
3,6-Dichlor-2-methoxybenzoesäure (Dicamba),
1-(Ethoxycarbonyl)ethyl-3,6-dichlor-2-methoxybenzoat (Lactidichlor-ethyl).

- Besonders bevorzugte Safener sind Mefenpyr-diethyl, Cyprosulfamid, Isoxadifen-ethyl, Cloquintocet-
25 mexyl, Benoxacor, Dichlormid und Metcamifen.

- Spritzpulver sind in Wasser gleichmäßig dispergierbare Präparate, die neben dem Wirkstoff außer einem Verdünnungs- oder Inertstoff noch Tenside ionischer und/oder nichtionischer Art (Netzmittel, Dispergiermittel), z.B. polyoxyethylierte Alkylphenole, polyoxethylierte Fettalkohole, polyoxethylierte
30 Fettamine, Fettalkoholpolyglykolether-sulfate, Alkansulfonate, Alkylbenzolsulfonate, ligninsulfonsaures Natrium, 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium, dibutylinaphthalin-sulfonsaures Natrium oder auch oleoymethyltaurinsaures Natrium enthalten. Zur Herstellung der Spritzpulver werden die herbiziden Wirkstoffe beispielsweise in üblichen Apparaturen

wie Hammermühlen, Gebläsemühlen und Luftstrahlmühlen feingemahlen und gleichzeitig oder anschließend mit den Formulierungshilfsmitteln vermischt.

Emulgierbare Konzentrate werden durch Auflösen des Wirkstoffes in einem organischen Lösungsmittel
5 z.B. Butanol, Cyclohexanon, Dimethylformamid, Xylol oder auch höhersiedenden Aromaten oder Kohlenwasserstoffen oder Mischungen der organischen Lösungsmittel unter Zusatz von einem oder mehreren Tensiden ionischer und/oder nichtionischer Art (Emulgatoren) hergestellt. Als Emulgatoren können beispielsweise verwendet werden: Alkylarylsulfonsaure Calcium-Salze wie
10 Ca-Dodecylbenzolsulfonat oder nichtionische Emulgatoren wie Fettsäurepoly-glykolester, Alkylarylpolyglykolether, Fettalkoholpolyglykolether, Propylenoxid-Ethylen-oxid-Kondensationsprodukte, Alkylpolyether, Sorbitanester wie z.B. Sorbitanfett-säureester oder Polyoxethylensorbitanester wie z.B. Polyoxyethylensorbitan-fettsäureester.

Stäubemittel erhält man durch Vermahlen des Wirkstoffes mit fein verteilten festen Stoffen, z.B.
15 Talkum, natürlichen Tonen, wie Kaolin, Bentonit und Pyrophyllit, oder Diatomeenerde.

Suspensionskonzentrate können auf Wasser- oder Ölbasis sein. Sie können beispielsweise durch Naß-Vermahlung mittels handelsüblicher Perlmühlen und gegebenenfalls Zusatz von Tensiden, wie sie
20 z.B. oben bei den anderen Formulierungstypen bereits aufgeführt sind, hergestellt werden.

Emulsionen, z.B. Öl-in-Wasser-Emulsionen (EW), lassen sich beispielsweise mittels Rührern, Kolloidmühlen und/oder statischen Mischern unter Verwendung von wäßrigen organischen
Lösungsmitteln und gegebenenfalls Tensiden, wie sie z.B. oben bei den anderen Formulierungstypen bereits aufgeführt sind, herstellen.

25 Granulate können entweder durch Verdüsen des Wirkstoffes auf adsorptionsfähiges, granuliertes Inertmaterial hergestellt werden oder durch Aufbringen von Wirkstoffkonzentraten mittels Klebemitteln, z.B. Polyvinylalkohol, polyacrylsaurem Natrium oder auch Mineralölen, auf die Oberfläche von Trägerstoffen wie Sand, Kaolinite oder von granuliertem Inertmaterial. Auch können
30 geeignete Wirkstoffe in der für die Herstellung von Düngemittelgranulaten üblichen Weise - gewünschtenfalls in Mischung mit Düngemitteln - granuliert werden.

Wasserdispergierbare Granulate werden in der Regel nach den üblichen Verfahren wie Sprühtrocknung, Wirbelbett-Granulierung, Teller-Granulierung, Mischung mit Hochgeschwindigkeitsmischern und
35 Extrusion ohne festes Inertmaterial hergestellt.

Zur Herstellung von Teller-, Fließbett-, Extruder- und Sprühgranulate siehe z.B. Verfahren in "Spray-Drying Handbook" 3rd ed. 1979, G. Goodwin Ltd., London, J.E. Browning, "Agglomeration", Chemical and Engineering 1967, Seiten 147 ff, "Perry's Chemical Engineer's Handbook", 5th Ed., McGraw-Hill, New York 1973, S. 8-57.

5

Für weitere Einzelheiten zur Formulierung von Pflanzenschutzmitteln siehe z.B. G.C. Klingman, "Weed Control as a Science", John Wiley and Sons, Inc., New York, 1961, Seiten 81-96 und J.D. Freyer, S.A. Evans, "Weed Control Handbook", 5th Ed., Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1968, Seiten 101-103.

10

Die agrochemischen Zubereitungen enthalten in der Regel 0.1 bis 99 Gew.-%, insbesondere 0.1 bis 95 Gew.-%, erfindungsgemäße Verbindungen. In Spritzpulvern beträgt die Wirkstoffkonzentration z.B. etwa 10 bis 90 Gew.-%, der Rest zu 100 Gew.-% besteht aus üblichen Formulierungsbestandteilen. Bei emulgierbaren Konzentraten kann die Wirkstoffkonzentration etwa 1 bis 90, vorzugsweise 5 bis 80

15

Gew.-% betragen. Staubförmige Formulierungen enthalten 1 bis 30 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise meistens 5 bis 20 Gew.-% an Wirkstoff, versprühbare Lösungen enthalten etwa 0.05 bis 80, vorzugsweise 2 bis 50 Gew.-% Wirkstoff. Bei wasser-dispergierbaren Granulaten hängt der

20

Wirkstoffgehalt zum Teil davon ab, ob die wirksame Verbindung flüssig oder fest vorliegt und welche Granulierhilfsmittel, Füllstoffe usw. verwendet werden. Bei den in Wasser dispergierbaren Granulaten liegt der Gehalt an Wirkstoff beispielsweise zwischen 1 und 95 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 10 und 80 Gew.-%.

25

Daneben enthalten die genannten Wirkstoffformulierungen gegebenenfalls die jeweils üblichen Haft-, Netz-, Dispergier-, Emulgier-, Penetrations-, Konservierungs-, Frostschutz- und Lösungsmittel, Füll-, Träger- und Farbstoffe, Entschäumer, Verdunstungshemmer und den pH-Wert und die Viskosität beeinflussende Mittel.

30

Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen pestizid wirksamen Stoffen, wie z.B. Insektiziden, Akariziden, Herbiziden, Fungiziden, sowie mit Safenern, Düngemitteln und/oder Wachstumsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix.

35

Zur Anwendung werden die in handelsüblicher Form vorliegenden Formulierungen gegebenenfalls in üblicher Weise verdünnt z.B. bei Spritzpulvern, emulgierbaren Konzentraten, Dispersionen und wasserdispergierbaren Granulaten mittels Wasser. Staubförmige Zubereitungen, Boden- bzw. Streugranulate sowie versprühbare Lösungen werden vor der Anwendung üblicherweise nicht mehr mit weiteren inerten Stoffen verdünnt.

Mit den äußeren Bedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, der Art des verwendeten Herbizids, u.a. variiert die erforderliche Aufwandmenge der Verbindungen der Formel (I) und deren Salze. Sie kann innerhalb weiter Grenzen schwanken, z.B. zwischen 0,001 und 10,0 kg/ha oder mehr Aktivsubstanz, vorzugsweise liegt sie jedoch zwischen 0,005 bis 5 kg/ha, weiter bevorzugt im Bereich von 0,01 bis 1,5 kg/ha, insbesondere bevorzugt im Bereich von 0,05 bis 1 kg/ha g/ha. Dies gilt sowohl für die Anwendung im Voraufbau oder im Nachaufbau.

Trägerstoff bedeutet eine natürliche oder synthetische, organische oder anorganische Substanz, mit welchen die Wirkstoffe zur besseren Anwendbarkeit, v.a. zum Aufbringen auf Pflanzen oder Pflanzenteile oder Saatgut, gemischt oder verbunden sind. Der Trägerstoff, welcher fest oder flüssig sein kann, ist im Allgemeinen inert und sollte in der Landwirtschaft verwendbar sein.

Als feste oder flüssige Trägerstoffe kommen infrage: z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und natürliche oder synthetische Silikate, Harze, Wachse, feste Düngemittel, Wasser, Alkohole, besonders Butanol, organische Solventien, Mineral- und Pflanzenöle sowie Derivate hiervon. Mischungen solcher Trägerstoffe können ebenfalls verwendet werden. Als feste Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel.

Als verflüssigte gasförmige Streckmittel oder Trägerstoffe kommen solche Flüssigkeiten infrage, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe, sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabikum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kepheline und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie Xylol, Toluol oder Alkylnaphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Dichlormethan, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methyl-ethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.

Die erfindungsgemäßen Mittel können zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, wie z.B. oberflächenaktive Stoffe. Als oberflächenaktive Stoffe kommen Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser oberflächenaktiven Stoffe infrage. Beispiele hierfür sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulphonsäure, Salze von Phenolsulphonsäure oder Naphthalinsulphonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulphobornsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenole, Fettsäureester von Polyolen, und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulphate, Sulphonate und Phosphate, z.B. Alkylarylpolyglycolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist notwendig, wenn einer der Wirkstoff und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt. Der Anteil an oberflächenaktiven Stoffen liegt zwischen 5 und 40 Gewichtsprozent des erfindungsgemäßen Mittels. Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe, wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Gegebenenfalls können auch andere zusätzliche Komponenten enthalten sein, z.B. schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Stabilisatoren, Sequestermittel, Komplexbildner. Im Allgemeinen können die Wirkstoffe mit jedem festen oder flüssigen Additiv, welches für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden. Im Allgemeinen enthalten die erfindungsgemäßen Mittel und Formulierungen zwischen 0,05 und 99 Gew.-%, 0,01 und 98 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,1 und 95 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 % Wirkstoff, ganz besonders bevorzugt zwischen 10 und 70 Gewichtsprozent. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können als solche oder in Abhängigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie Aerosole, Kapselsuspensionen, Kaltnebelkonzentrate, Heißnebelkonzentrate, verkapselte Granulate, Feingranulate, fließfähige Konzentrate für die Behandlung von Saatgut, gebrauchsfertige Lösungen, verstäubbare Pulver, emulgierbare Konzentrate, Öl-in-Wasser-Emulsionen, Wasser-in-Öl-Emulsionen, Makrogranulate, Mikrogranulate, Öl dispergierbare Pulver, Öl mischbare fließfähige Konzentrate, Öl mischbare Flüssigkeiten, Schäume, Pasten, Pestizid ummanteltes Saatgut, Suspensionskonzentrate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, lösliche Konzentrate, Suspensionen, Spritzpulver, lösliche Pulver, Stäubemittel und Granulate, wasserlösliche Granulate oder Tabletten, wasserlösliche Pulver für Saatgut-behandlung, benetzbare Pulver, Wirkstoff-imprägnierte Natur- und synthetische Stoffe sowie Feinstverkapselungen in polymeren

Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen eingesetzt werden.

Die genannten Formulierungen können in an sich bekannter Weise hergestellt werden, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit mindestens einem üblichen Streckmittel, Lösungs- bzw. Verdünnungsmittel, Emulgator, Dispergier- und/oder Binde- oder Fixiermittels, Netzmittel, Wasser-Repellent, gegebenenfalls Sikkative und UV-Stabilisatoren und gegebenenfalls Farbstoffen und Pigmenten, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline sowie weiteren Verarbeitungshilfsmitteln.

Die erfindungsgemäßen Mittel umfassen nicht nur Formulierungen, welche bereits anwendungsfertig sind und mit einer geeigneten Apparatur auf die Pflanze oder das Saatgut ausgebracht werden können, sondern auch kommerzielle Konzentrate, welche vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden müssen. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren (handelsüblichen) Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen (bekannten) Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, Wachstumsregulatoren, Herbiziden, Düngemitteln, Safener bzw. Semiochemicals vorliegen.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen bzw. Mitteln erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, (Ver-)Spritzen, (Ver-)Sprühen, Berieseln, Verdampfen, Zerstäuben, Vernebeln, (Ver-)Streuen, Verschäumen, Bestreichen, Verstreichen, Gießen (drenchen), Tröpfchenbewässerung und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch Trockenbeizen, Nassbeizen, Schlammbeizen, Inkrustieren, ein- oder mehrschichtiges Umhüllen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren.

Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung ist es, dass aufgrund der besonderen systemischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel die Behandlung des Saatguts mit diesen Wirkstoffen bzw. Mitteln nicht nur das Saatgut selbst, sondern auch die daraus hervorgehenden Pflanzen nach dem Auflaufen vor phytopathogenen Pilzen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbare Behandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danach entfallen.

Ebenso ist es als vorteilhaft anzusehen, dass die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel insbesondere auch bei transgenem Saatgut eingesetzt werden können, wobei die aus diesem Saatgut wachsende Pflanze in der Lage ist, ein Protein zu exprimieren, welches gegen Schädlinge wirkt. Durch

die Behandlung solchen Saatguts mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen bzw. Mitteln können bereits durch die Expression des beispielsweise insektiziden Proteins bestimmte Schädlinge bekämpft werden. Überraschenderweise kann dabei ein weiterer synergistischer Effekt beobachtet werden, welcher zusätzlich die Effektivität zum Schutz gegen den Schädlingsbefall vergrößert.

5

Die erfindungsgemäßen Mittel eignen sich zum Schutz von Saatgut jeglicher Pflanzensorte, die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten oder im Garten- und Weinbau eingesetzt wird.

Insbesondere handelt es sich dabei um Saatgut von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hirse und Hafer), Mais, Baumwolle, Soja, Reis, Kartoffeln, Sonnenblume, Bohne, Kaffee, Rübe (z.B.

10 Zuckerrübe und Futterrübe), Erdnuss, Raps, Mohn, Olive, Kokosnuss, Kakao, Zuckerrohr, Tabak, Gemüse (wie Tomate, Gurke, Zwiebeln und Salat), Rasen und Zierpflanzen (siehe auch unten).

Besondere Bedeutung kommt der Behandlung des Saatguts von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale und Hafer), Mais und Reis zu.

Wie auch weiter unten beschrieben, ist die Behandlung von transgenem Saatgut mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen bzw. Mitteln von besonderer Bedeutung. Dies betrifft das Saatgut von Pflanzen, die

15 wenigstens ein heterologes Gen enthalten, das die Expression eines Polypeptids oder Proteins mit insektiziden Eigenschaften ermöglicht. Das heterologe Gen in transgenem Saatgut kann z.B. aus

Mikroorganismen der Arten Bacillus, Rhizobium, Pseudomonas, Serratia, Trichoderma, Clavibacter, Glomus oder Gliocladium stammen. Bevorzugt stammt dieses heterologe Gen aus Bacillus sp., wobei

20 das Genprodukt eine Wirkung gegen den Maiszünsler (European corn borer) und/oder Western Corn Rootworm besitzt. Besonders bevorzugt stammt das heterologe Gen aus Bacillus thuringiensis.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße Mittel alleine oder in einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem Zustand

25 behandelt, in dem so stabil ist, dass keine Schäden bei der Behandlung auftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedem Zeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen.

Üblicherweise wird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben, Schalen, Stängeln, Hülle, Wolle oder Fruchtfleisch befreit wurde. So kann zum Beispiel Saatgut verwendet

werden, das geerntet, gereinigt und bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 Gew.-% getrocknet wurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das nach dem Trocknen z.B. mit Wasser

30 behandelt und dann erneut getrocknet wurde.

Im Allgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtet werden, dass die Menge des auf das Saatgut aufgebrachten erfindungsgemäßen Mittels und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird,

35 geschädigt wird. Dies ist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwandmengen phytotoxische Effekte zeigen können.

Die erfindungsgemäßen Mittel können unmittelbar aufgebracht werden, also ohne weitere Komponenten zu enthalten und ohne verdünnt worden zu sein. In der Regel ist es vorzuziehen, die Mittel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufzubringen. Geeignete Formulierungen und Verfahren für die Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt und werden z.B. in den
5 folgenden Dokumenten beschrieben: US 4,272,417 A, US 4,245,432 A, US 4,808,430, US 5,876,739, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675 A1, WO 2002/028186 A2.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Wirkstoffe können in die üblichen Beizmittel-Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Slurries oder andere
10 Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, indem man die Wirkstoffe mit üblichen Zusatzstoffen vermischt, wie zum Beispiel übliche Streckmittel sowie Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Netzmittel, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline und auch Wasser.
15

Als Farbstoffe, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke üblichen Farbstoffe in Betracht. Dabei sind sowohl in Wasser wenig lösliche Pigmente als auch in Wasser lösliche Farbstoffe verwendbar. Als Beispiele
20 genannt seien die unter den Bezeichnungen Rhodamin B, C.I. Pigment Red 112 und C.I. Solvent Red 1 bekannten Farbstoffe.

Als Netzmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen, die Benetzung fördernden Stoffe in Frage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkyl-naphthalin-Sulfonate, wie Diisopropyl- oder Diisobutyl-naphthalin-Sulfonate.
25

Als Dispergiermittel und/oder Emulgatoren, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen
30 Wirkstoffen üblichen nichtionischen, anionischen und kationischen Dispergiermittel in Betracht. Vorzugsweise verwendbar sind nichtionische oder anionische Dispergiermittel oder Gemische von nichtionischen oder anionischen Dispergiermitteln. Als geeignete nichtionische Dispergiermittel sind insbesondere Ethylenoxid-Propylenoxid Blockpolymere, Alkylphenolpolyglykoether sowie Tristrylphenolpolyglykoether und deren phosphatierte oder sulfatierte Derivate zu nennen. Geeignete
35 anionische Dispergiermittel sind insbesondere Ligninsulfonate, Polyacrylsäuresalze und Arylsulfonat-Formaldehydkondensate.

Als Entschäumer können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen schaumhemmenden Stoffe enthalten sein. Vorzugsweise verwendbar sind Silikonentschäumer und Magnesiumstearat.

- 5 Als Konservierungsmittel können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe vorhanden sein. Beispielfhaft genannt seien Dichlorophen und Benzylalkoholhemiformal.

10 Als sekundäre Verdickungsmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise in Betracht kommen Cellulosederivate, Acrylsäurederivate, Xanthan, modifizierte Tone und hochdisperse Kieselsäure.

15 Als Kleber, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen in Beizmitteln einsetzbaren Bindemittel in Frage. Vorzugsweise genannt seien Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Tylose.

20 Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen können entweder direkt oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser zur Behandlung von Saatgut der verschiedensten Art, auch von Saatgut transgener Pflanzen, eingesetzt werden. Dabei können im Zusammenwirken mit den durch Expression gebildeten Substanzen auch zusätzliche synergistische Effekte auftreten.

25 Zur Behandlung von Saatgut mit den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder den daraus durch Zugabe von Wasser hergestellten Zubereitungen kommen alle üblicherweise für die Beizung einsetzbaren Mischgeräte in Betracht. Im einzelnen geht man bei der Beizung so vor, dass man das Saatgut in einen Mischer gibt, die jeweils gewünschte Menge an Beizmittel-Formulierungen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser hinzufügt und bis zur gleichmäßigen Verteilung der Formulierung auf dem Saatgut mischt. Gegebenenfalls schließt sich ein Trocknungsvorgang an.

30 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblütertoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes. Sie können vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam.

35 Als Pflanzen, welche erfindungsgemäß behandelt werden können, seien folgende Hauptanbaupflanzen erwähnt: Mais, Sojabohne, Baumwolle, Brassica Ölsaaten wie Brassica napus (z.B. Canola), Brassica

rapa, *B. juncea* (z.B. (Acker-)Senf) und *Brassica carinata*, Reis, Weizen Zuckerrübe, Zuckerrübe, Hafer, Roggen, Gerste, Hirse, Triticale, Flachs, Wein und verschiedene Früchte und Gemüse von verschiedenen botanischen Taxa wie z.B. Rosaceae sp. (beispielsweise Kernfrüchte wie Apfel und Birne, aber auch Steinfrüchte wie Aprikosen, Kirschen, Mandeln und Pfirsiche und Beerenfrüchte wie Erdbeeren), Ribesioideae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (beispielsweise Bananenbäume und -plantagen), Rubiaceae sp. (beispielsweise Kaffee), Theaceae sp., Sterculiaceae sp., Rutaceae sp. (beispielsweise Zitronen, Orangen und Grapefruit); Solanaceae sp. (beispielsweise Tomaten, Kartoffeln, Pfeffer, Auberginen), Liliaceae sp., Compositae sp. (beispielsweise Salat, Artischocke and Chicoree – einschließlich Wurzelchicoree, Endivie oder gemeinen Chicoree), Umbelliferae sp. (beispielsweise Karotte, Petersilie, Stangensellerie und Knollensellerie), Cucurbitaceae sp. (beispielsweise Gurke – einschließlich Gewürzgurke, Kürbis, Wassermelone, Flaschenkürbis und Melonen), Alliaceae sp. (beispielsweise Lauch und Zwiebel), Cruciferae sp. (beispielsweise Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Kohlrabi, Radieschen, Meerrettich, Kresse und Chinakohl), Leguminosae sp. (beispielsweise Erdnüsse, Erbsen, und Bohnen – wie z.B. Stangenbohne und Ackerbohne), Chenopodiaceae sp. (beispielsweise Mangold, Futterrübe, Spinat, Rote Rübe), Malvaceae (beispielsweise Okra), Asparagaceae (beispielsweise Spargel); Nutzpflanzen und Zierpflanzen in Garten und Wald; sowie jeweils genetisch modifizierte Arten dieser Pflanzen.

Wie oben erwähnt, können erfindungsgemäß alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden wild vorkommende oder durch konventionelle biologische Zuchtmethoden, wie Kreuzung oder Protoplastenfusion erhaltenen Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden transgene Pflanzen und Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und deren Teile behandelt. Der Begriff „Teile“ bzw. „Teile von Pflanzen“ oder „Pflanzenteile“ wurde oben erläutert. Besonders bevorzugt werden erfindungsgemäß Pflanzen der jeweils handelsüblichen oder in Gebrauch befindlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit neuen Eigenschaften („Traits“), die sowohl durch konventionelle Züchtung, durch Mutagenese oder durch rekombinante DNA-Techniken gezüchtet worden sind. Dies können Sorten, Rassen, Bio- und Genotypen sein.

Das erfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann für die Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z. B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden. Genetisch modifizierte Pflanzen (oder transgene Pflanzen) sind Pflanzen, bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom integriert worden ist. Der Begriff "heterologes Gen" bedeutet im wesentlichen ein Gen, das außerhalb der Pflanze

bereitgestellt oder assembliert wird und das bei Einführung in das Zellkerngenom, das Chloroplastengenom oder das Mitochondriengenom der transformierten Pflanze dadurch neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Eigenschaften verleiht, dass es ein interessierendes Protein oder Polypeptid exprimiert oder dass es ein anderes Gen, das in der Pflanze vorliegt bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen, herunterreguliert oder abschaltet (zum Beispiel mittels Antisense-Technologie, Cosuppressionstechnologie oder RNAi-Technologie [RNA Interference]). Ein heterologes Gen, das im Genom vorliegt, wird ebenfalls als Transgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch sein spezifisches Vorliegen im Pflanzengenom definiert ist, wird als Transformations- bzw. transgenes Event bezeichnet.

10 In Abhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten, ihrem Standort und ihren Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) kann die erfindungsgemäße Behandlung auch zu überadditiven ("synergistischen") Effekten führen. So sind zum Beispiel die folgenden Effekte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen: verringerte Aufwandmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrum und/oder erhöhte Wirksamkeit der Wirkstoffe
15 und Zusammensetzungen, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüber Trockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhere Erträge, größere Früchte, größere Pflanzenhöhe, intensiver grüne Farbe des Blatts, frühere Blüte, höhere Qualität und/oder höherer Nährwert der Ernteprodukte, höhere
20 Zuckerkonzentration in den Früchten, bessere Lagerfähigkeit und/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.

In gewissen Aufwandmengen können die erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen auch eine stärkende Wirkung auf Pflanzen ausüben. Sie eignen sich daher für die Mobilisierung des pflanzlichen
25 Abwehrsystems gegen Angriff durch unerwünschte phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder Viren. Dies kann gegebenenfalls einer der Gründe für die erhöhte Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Kombinationen sein, zum Beispiel gegen Pilze. Pflanzenstärkende (resistenzinduzierende) Substanzen sollen im vorliegenden Zusammenhang auch solche Substanzen oder Substanzkombinationen bedeuten, die fähig sind, das pflanzliche Abwehrsystem so zu stimulieren,
30 dass die behandelten Pflanzen, wenn sie im Anschluss daran mit unerwünschten phytopathogenen Pilzen inokuliert wurde, einen beträchtlichen Resistenzgrad gegen diese unerwünschten phytopathogenen Pilze aufweisen. Die erfindungsgemäßen Substanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriff durch die erwähnten Pathogene innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, über den eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im
35 Allgemeinen von 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Zu Pflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgut verfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützliche Merkmale verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oder Biotechnologie erzielt wurde).

5 Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, sind gegen einen oder mehrere biotische Stressfaktoren resistent, d.h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierische und mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben, phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.

Beispiele für Nematoden-resistente Pflanzen sind z.B. folgenden US Patentanmeldungen beschrieben:
10 11/765,491, 11/765,494, 10/926,819, 10/782,020, 12/032,479, 10/783,417, 10/782,096, 11/657,964, 12/192,904, 11/396,808, 12/166,253, 12/166,239, 12/166,124, 12/166,209, 11/762,886, 12/364,335, 11/763,947, 12/252,453, 12/209,354, 12/491,396 und 12/497,221.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen oder mehrere abiotische Stressfaktoren resistent sind. Zu den abiotischen
15 Stressbedingungen können zum Beispiel Dürre, Kälte- und Hitzebedingungen, osmotischer Stress, Staunässe, erhöhter Bodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien, Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeit von Stickstoffnährstoffen, beschränkte Verfügbarkeit von Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.

20 Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhte Ertragseigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhter Ertrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter Pflanzenphysiologie, verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung, wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung, erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese, verstärkter Keimkraft
25 und beschleunigter Abreife beruhen. Der Ertrag kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur (unter Stress- und Nicht-Stress-Bedingungen) beeinflusst werden, darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blüte für die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit, Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße, Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten- oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre, Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerter Samenausfall,
30 verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit. Zu weiteren Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzung wie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung, Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.

35 Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosis bzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im Allgemeinen zu höherem Ertrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheit und besserer Resistenz gegen biotische und abiotische

Stressfaktoren führt. Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, dass man eine
ingezüchtete pollensterile Elternlinie (den weiblichen Kreuzungspartner) mit einer anderen
ingezüchteten pollenfertilen Elternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. Das Hybridsaatgut
wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntet und an Vermehrer verkauft. Pollensterile
5 Pflanzen können manchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen (d.h. mechanischem Entfernen der
männlichen Geschlechtsorgane bzw. der männlichen Blüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher,
dass die Pollensterilität auf genetischen Determinanten im Pflanzengenom beruht. In diesem Fall,
insbesondere dann, wenn es sich bei dem gewünschten Produkt, da man von den Hybridpflanzen ernten
will, um die Samen handelt, ist es üblicherweise günstig, sicherzustellen, dass die Pollenfertilität in
10 Hybridpflanzen, die die für die Pollensterilität verantwortlichen genetischen Determinanten enthalten,
völlig restoriert wird. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, dass die männlichen
Kreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorerogene besitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität
in Hybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die für die Pollensterilität verantwortlich sind,
enthalten, zu restorieren. Genetische Determinanten für Pollensterilität können im Cytoplasma
15 lokalisiert sein. Beispiele für cytoplasmatische Pollensterilität (CMS) wurden zum Beispiel für Brassica-
Arten beschrieben. Genetische Determinanten für Pollensterilität können jedoch auch im Zellkerngenom
lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen können auch mit Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie
Gentechnik, erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugung von pollensterilen Pflanzen
ist in WO 89/10396 beschrieben, wobei zum Beispiel eine Ribonuklease wie eine Barnase selektiv in
20 den Tapetumzellen in den Staubblättern exprimiert wird. Die Fertilität kann dann durch Expression
eines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriert werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie, wie der Gentechnik,
erhalten werden), die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h.
25 Pflanzen, die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbiziden tolerant gemacht worden sind.
Solche Pflanzen können entweder durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen,
die eine Mutation enthalten, die solch eine Herbizidtoleranz verleiht, erhalten werden.

Herbizidtolerante Pflanzen sind zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die
30 gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzen tolerant gemacht worden sind. Pflanzen können
mit verschiedenen Methoden tolerant gegenüber Glyphosate gemacht werden. So können zum Beispiel
glyphosatetolerante Pflanzen durch Transformation der Pflanze mit einem Gen, das für das Enzym 5-
Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS) kodiert, erhalten werden. Beispiele für solche
EPSPS-Gene sind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakteriums *Salmonella typhimurium* (Comai et
35 al., 1983, *Science* 221, 370-371), das CP4-Gen des Bakteriums *Agrobacterium* sp. (Barry et al., 1992,
Curr. Topics Plant Physiol. 7, 139-145), die Gene, die für eine EPSPS aus der Petunie (Shah et al., 1986,
Science 233, 478-481), für eine EPSPS aus der Tomate (Gasser et al., 1988, *J. Biol. Chem.* 263, 4280-

4289) oder für eine EPSPS aus Eleusine (WO 01/66704) kodieren. Es kann sich auch um eine mutierte EPSPS handeln. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-Oxidoreduktase-Enzym kodiert. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-acetyltransferase-Enzym kodiert. Glyphosattolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man Pflanzen, die natürlich vorkommende Mutationen der oben erwähnten Gene enthalten, selektiert. Pflanzen, die EPSPS Gene, welche Glyphosate-Toleranz verleihen, exprimieren, sind beschrieben. Pflanzen, welche andere Gene, die Glyphosate-Toleranz verleihen, z.B. Decarboxylase-Gene, sind beschrieben.

10
Sonstige herbizidresistente Pflanzen sind zum Beispiel Pflanzen, die gegenüber Herbiziden, die das Enzym Glutaminsynthase hemmen, wie Bialaphos, Phosphinotricin oder Glufosinate, tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können dadurch erhalten werden, dass man ein Enzym exprimiert, das das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutaminsynthase, das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch ein wirksames entgiftendes Enzym ist zum Beispiel ein Enzym, das für ein Phosphinotricin-acetyltransferase kodiert (wie zum Beispiel das bar- oder pat-Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogene Phosphinotricin-acetyltransferase exprimieren, sind beschrieben.

Weitere herbizidtolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüber den Herbiziden, die das Enzym Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase (HPPD) hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvatdioxygenasen handelt es sich um Enzyme, die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP) zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüber HPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das für ein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert, oder einem Gen, das für ein mutiertes oder chimäres HPPD-Enzym kodiert, transformiert werden, wie in WO 96/38567, WO 99/24585, WO 99/24586, WO 2009/144079, WO 2002/046387 oder US 6,768,044 beschrieben. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch erzielt werden, dass man Pflanzen mit Genen transformiert, die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisat trotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen. Solche Pflanzen sind in WO 99/34008 und WO 02/36787 beschrieben. Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch verbessert werden, dass man Pflanzen zusätzlich zu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert, mit einem Gen transformiert, das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzym kodiert, wie in WO 2004/024928 beschrieben ist. Außerdem können Pflanzen noch toleranter gegen HPPD-Hemmern gemacht werden, indem man ein Gen in ihr Genom einfügt, welches für ein Enzym kodiert, das HPPD-Hemmer metabolisiert oder abbaut, wie z.B. CYP450 Enzyme (siehe WO 2007/103567 und WO 2008/150473).

Weitere herbizidresistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüber Acetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind. Zu bekannten ALS-Hemmern zählen zum Beispiel Sulfonylharnstoff, Imidazolinon, Triazolopyrimidine, Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyl-triazolinon-Herbizide. Es ist bekannt, dass verschiedene Mutationen im Enzym ALS (auch als

5 Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen von Herbiziden verleihen wie z.B. in Tranel und Wright (Weed Science 2002, 50, 700-712) beschrieben ist. Die Herstellung von sulfonylharnstofftoleranten Pflanzen und imidazolinontoleranten Pflanzen ist beschrieben. Weitere sulfonylharnstoff- und imidazolinontolerante Pflanzen sind auch beschrieben.

10 Weitere Pflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstoff tolerant sind, können durch induzierte Mutagenese, Selektion in Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhalten werden (vgl. z.B. für Sojabohne US 5,084,082, für Reis WO 97/41218, für Zuckerrübe US 5,773,702 und WO 99/057965, für Salat US 5,198,599 oder für Sonnenblume WO

15 01/065922).

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind insektenresistente transgene Pflanzen, d.h. Pflanzen, die gegen Befall mit gewissen Zielinsekten resistent gemacht wurden.

20 Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Insektenresistenz verleiht, erhalten werden.

Der Begriff „insektenresistente transgene Pflanze“ umfasst im vorliegenden Zusammenhang jegliche Pflanze, die mindestens ein Transgen enthält, das eine Kodiersequenz umfasst, die für folgendes kodiert:

- 25 1) ein insektizides Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen insektiziden Teil davon, wie die insektiziden Kristallproteine, aufgelistet von Crickmore et al. (Microbiology and Molecular Biology Reviews 1998, 62, 807-813), aktualisiert von Crickmore et al. (2005) bei der *Bacillus thuringiensis* Toxin Nomenclatur, online bei: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/, oder insektizide Teile davon, z.B. Proteine der Cry-Proteinklassen Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Aa, or Cry3Bb oder insektizide Teile davon (z.B. EP-A 1999141 und WO
- 30 2007/107302), oder solche Proteine, kodiert durch synthetische Gene wie in US Patentanmeldung 12/249,016 beschrieben ist; oder
- 35 2) ein Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen Teil davon, der in Gegenwart eines zweiten, anderen Kristallproteins als *Bacillus thuringiensis* oder eines Teils davon insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Kristallproteinen Cy34 und Cy35 besteht (Nat. Biotechnol. 2001, 19, 668-72; Applied Environm. Microbiol. 2006, 71, 1765-1774) oder das binäre Toxin, das aus den Cry1A oder

Cry1F Proteinen besteht und die Cry2Aa oder Cry2Ab oder Cry2Ae Proteine (US Patentanmeldung 12/214,022 und EP08010791.5); oder

- 3) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von zwei unterschiedlichen insektiziden Kristallproteinen aus *Bacillus thuringiensis* umfasst, wie zum Beispiel ein Hybrid aus den Proteinen von
5 1) oben oder ein Hybrid aus den Proteinen von 2) oben, z. B. das Protein Cry1A.105, das von dem Mais-Event MON98034 produziert wird (WO 2007/027777); oder
- 4) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden
10 Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden, wie das Protein Cry3Bb1 in Mais-Events MON863 oder MON88017 oder das Protein Cry3A im Mais-Event MIR 604;
- 5) ein insektizides sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* oder einen insektiziden Teil davon, wie die vegetativ wirkenden insektentoxischen Proteine (vegetative insecticidal
15 proteins, VIP), die unter http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html angeführt sind, z. B. Proteine der Proteinklasse VIP3Aa; oder
- 6) ein sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*, das in Gegenwart eines zweiten sezernierten Proteins aus *Bacillus thuringiensis* oder *B. cereus* insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP1A und VIP2A besteht (WO 94/21795); oder
20 7) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von verschiedenen sezernierten Proteinen von *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* umfasst, wie ein Hybrid der Proteine von 1) oder ein Hybrid der Proteine von 2) oben; oder
- 8) ein Protein gemäß einem der Punkte 5) bis 7) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden
25 Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Protein erhalten bleibt), wie das Protein VIP3Aa im Baumwoll-Event COT 102; oder
- 9) ein sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*, das in Gegenwart eines
30 Kristallproteins von *Bacillus thuringiensis* insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP3 und Cry1A oder Cry1F besteht (US Patentanmeldungen 61/126083 und 61/195019), oder das binäre Toxin, das aus dem VIP3 Protein und den Cry2Aa oder Cry2Ab oder Cry2Ae Proteinen besteht (US Patentanmeldung 12/214,022 und EP 08010791.5); oder
- 10) ein Protein gemäß Punkt 9) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine
35 andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu

erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Protein erhalten bleibt). Natürlich zählt zu den insektenresistenten transgenen Pflanzen im vorliegenden Zusammenhang auch jegliche Pflanze, die eine Kombination von Genen umfasst, die für die Proteine von einer der oben
5 genannten Klassen 1 bis 10 kodieren. In einer Ausführungsform enthält eine insektenresistente Pflanze mehr als ein Transgen, das für ein Protein nach einer der oben genannten 1 bis 10 kodiert, um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern oder um die Entwicklung einer Resistenz der Insekten gegen die Pflanzen dadurch hinauszuzögern, dass man verschiedene Proteine einsetzt, die für dieselbe Zielinsektenart insektizid sind, jedoch eine unterschiedliche Wirkungsweise, wie Bindung
10 an unterschiedliche Rezeptorbindungsstellen im Insekt, aufweisen.

Eine „insekten-resistente transgene Pflanze“ umfasst im vorliegenden Zusammenhang weiterhin jede Pflanze, die wenigstens ein Transgen enthält, welches eine Sequenz zur Herstellung einer Doppelstrang-RNA umfasst, die nach Nahrungsaufnahme durch einen Insektenschädling das Wachstum dieses
15 Schädlings hindert.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind gegenüber abiotischen Stressfaktoren tolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion
20 von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Stressresistenz verleiht, erhalten werden. Zu besonders nützlichen Pflanzen mit Stresstoleranz zählen folgende:

- a. Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag.
- b. Pflanzen, die ein stresstoleranzförderndes Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität
25 der für PARP kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzieren vermag;
- c. Pflanzen, die ein stresstoleranzförderndes Transgen enthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzym des Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs kodiert, darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase, Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase, Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase.

30 Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, weisen eine veränderte Menge, Qualität und/oder Lagerfähigkeit des Ernteprodukts und/oder veränderte Eigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf, wie zum Beispiel:

- 1) Transgene Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehalts oder des Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads, der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung der Seitenketten, des Viskositäts-

verhaltens, der Gelfestigkeit, der Stärkekorngröße und/oder Stärkekormorphologie im Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtyppflanzenzellen oder -pflanzen verändert ist, so dass sich diese modifizierte Stärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.

- 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymere synthetisieren, oder
- 5 Nichtstärkekohlenhydratpolymere, deren Eigenschaften im Vergleich zu Wildtyppflanzen ohne genetische Modifikation verändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose, insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, Pflanzen, die alpha-1,4-Glucane produzieren, Pflanzen, die alpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren und Pflanzen, die Alternan produzieren.
- 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren.
- 10 4) Transgene Pflanzen oder Hybridpflanzen wie Zwiebeln mit bestimmten Eigenschaften wie „hohem Anteil an löslichen Feststoffen“ („high soluble solids content“), geringe Schärfe („low pungency“, LP) und/oder lange Lagerfähigkeit („long storage“, LS).

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie

15 Baumwollpflanzen mit veränderten Fasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthasegenen
- 20 enthalten,
- b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von rsw2- oder rsw3-homologen Nukleinsäuren enthalten, wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosephosphatynthase;
- c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosesynthase;
- 25 d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt der Durchlaßsteuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelle verändert ist, z. B. durch Herunterregulieren der faserselektiven β -1,3-Glucanase;
- e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderter Reaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens, darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen.

30 Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Öleigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- 35 a) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt produziere;
- b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen Linolensäuregehalt produzieren.
- c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen gesättigten Fettsäuregehalt produzieren.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden können), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Kartoffeln, welche Virus-resistent sind z.B. gegen den Kartoffelvirus Y (Event SY230 und SY233 von Tecnoplant, Argentinien), oder welche resistent gegen Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule (potato late blight) (z.B. RB Gen), oder welche eine verminderte kälteinduzierte Süße zeigen (welche die Gene Nt-Inh, II-INV tragen) oder welche den Zwerg-Phänotyp zeigen (Gen A-20 Oxidase).

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften im Samenausfall (seed shattering). Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Eigenschaften verleihen, und umfassen Pflanzen wie Raps mit verzögertem oder vermindertem Samenausfall.

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit Transformationsevents oder Kombinationen von Transformationsevent, welche in den USA beim Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of the United States Department of Agriculture (USDA) Gegenstand von erteilten oder anhängigen Petitionen für den nicht-regulierten Status sind. Die Information hierzu ist jederzeit beim APHIS (4700 River Road Riverdale, MD 20737, USA) erhältlich, z.B. über die Internetseite http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html. Am Anmeldetag dieser Anmeldung waren beim APHIS die Petitionen mit folgenden Informationen entweder erteilt oder anhängig:

- Petition: Identifikationsnummer der Petition. Die Technische Beschreibung des Transformations-events kann im einzelnen Petitionsdokument erhältlich von APHIS auf der Website über die Petitionsnummer gefunden werden. Diese Beschreibungen sind hiermit per Referenz offenbart.
- Erweiterung einer Petition: Referenz zu einer frühere Petition, für die eine Erweiterung oder Verlängerung beantragt wird.
- Institution: Name der die Petition einreichenden Person.
- Regulierter Artikel: die betroffenen Pflanzenspecies.
- Transgener Phänotyp: die Eigenschaft („Trait“), die der Pflanze durch das Transformationsevent verliehen wird.
- Transformationsevent oder -linie: der Name des oder der Events (manchmal auch als Linie(n) bezeichnet), für die der nicht-regulierte Status beantragt ist.
- APHIS Dokumente: verschiedene Dokumente, die von APHIS bzgl. der Petition veröffentlicht worden oder von APHIS auf Anfrage erhalten werden können.

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit einem oder mehreren Genen, die für ein oder mehrere Toxine kodieren, sind die transgenen Pflanzen, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: YIELD GARD® (zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohnen), KnockOut® (zum Beispiel Mais), BiteGard® (zum Beispiel Mais), BT-Xtra® (zum Beispiel Mais), StarLink® (zum Beispiel Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle), Nucotn 33B® (Baumwolle), NatureGard® (zum Beispiel Mais), Protecta® und NewLeaf® (Kartoffel).
Herbizidtolerante Pflanzen, die zu erwähnen sind, sind zum Beispiel Maissorten, Baumwollsorten und Sojabohnensorten, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: Roundup Ready® (Glyphosatetoleranz, zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohne), Liberty Link® (Phosphinotricintoleranz, zum Beispiel Raps), IMI® (Imidazolinontoleranz) und SCS® (Sylfonylhamstofftoleranz), zum Beispiel Mais. Zu den herbizidresistenten Pflanzen (traditionell auf Herbizidtoleranz gezüchtete Pflanzen), die zu erwähnen sind, zählen die unter der Bezeichnung Clearfield® angebotenen Sorten (zum Beispiel Mais).

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events, oder eine Kombination von Transformations-Events, enthalten und die zum Beispiel in den Dateien von verschiedenen nationalen oder regionalen Behörden angeführt sind (siehe zum Beispiel http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx und http://cera-gmc.org/index.php?evidcode=&hstIDXCode=&gType=&AbbrCode=&atCode=&stCode=&coIDCode=&action=gm_crop_database&mode=Submit).

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können außerdem im Materialschutz zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall und Zerstörung durch unerwünschte Mikroorganismen, wie z.B. Pilzen und Insekten, eingesetzt werden.

Weiter können die erfindungsgemäßen Verbindungen allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu verstehen, die für die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind. Beispielsweise können technische Materialien, die durch erfindungsgemäße Wirkstoffe vor mikrobieller Veränderung oder Zerstörung geschützt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier, Wandpappe und Karton, Textilien, Teppiche, Leder, Holz, Anstrichmittel und Kunststoffartikel, Kühlschmierstoffe und andere Materialien sein, die von Mikroorganismen befallen oder zersetzt werden können. Im Rahmen der zu schützenden Materialien seien auch Teile von Produktionsanlagen und Gebäuden, z.B. Kühlwasserkreisläufe, Kühl- und Heizsysteme und Belüftungs- und Klimaanlage, genannt, die durch Vermehrung von Mikroorganismen beeinträchtigt werden können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung seien als technische Materialien

vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Anstrichmittel, Kühlschmiermittel und Wärmeübertragungsflüssigkeiten genannt, besonders bevorzugt Holz. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern. Außerdem können die erfindungsgemäßen Verbindungen zum Schutz vor

5 Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von Schiffskörpern, Sieben, Netzen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, eingesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bekämpfen von unerwünschten Pilzen kann auch zum Schutz von so genannten Storage Goods verwendet werden. Unter „Storage Goods“ werden dabei natürliche Substanzen

10 pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder deren Verarbeitungsprodukte, welche der Natur entnommen wurden und für die Langzeitschutz gewünscht ist, verstanden. Storage Goods pflanzlichen Ursprungs, wie z.B. Pflanzen oder Pflanzenteile, wie Stiele, Blätter, Knollen, Samen, Früchte, Körner, können in frisch geerntetem Zustand oder nach Verarbeitung durch (Vor-)Trocknen, Befeuchten, Zerkleinern, Mahlen, Pressen oder Rösten, geschützt werden. Storage Goods umfasst auch Nutzholz, sei es unverarbeitet, wie

15 Bauholz, Stromleitungsmasten und Schranken, oder in Form fertiger Produkte, wie Möbel. Storage Goods tierischen Ursprungs sind beispielsweise Felle, Leder, Pelze und Haare. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern.

Beispielhaft, aber nicht begrenzend, seien einige Erreger von pilzlichen Erkrankungen, die erfindungsgemäß

20 behandelt werden können, genannt: Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des Echten Mehltaus wie z.B. *Blumeria*-Arten, wie beispielsweise *Blumeria graminis*; *Podosphaera*-Arten, wie beispielsweise *Podosphaera leucotricha*; *Sphaerotheca*-Arten, wie beispielsweise *Sphaerotheca fuliginea*; *Uncinula*-Arten, wie beispielsweise *Uncinula necator*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger von Rostkrankheiten wie z.B. *Gymnosporangium*-Arten, wie beispielsweise *Gymnosporangium sabiniae*; *Hemileia*-Arten, wie

25 beispielsweise *Hemileia vastatrix*; *Phakopsora*-Arten, wie beispielsweise *Phakopsora pachyrhizi* und *Phakopsora meibomiae*; *Puccinia*-Arten, wie beispielsweise *Puccinia recondita* oder *Puccinia triticina*; *Uromyces*-Arten, wie beispielsweise *Uromyces appendiculatus*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger der Gruppe der Oomyceten wie z.B. *Bremia*-Arten, wie beispielsweise *Bremia lactucae*; *Peronospora*-Arten, wie beispielsweise *Peronospora pisi* oder *P. brassicae*; *Phytophthora*-Arten, wie beispielsweise *Phytophthora*

30 *infestans*; *Plasmopara*-Arten, wie beispielsweise *Plasmopara viticola*; *Pseudoperonospora*-Arten, wie beispielsweise *Pseudoperonospora humuli* oder *Pseudoperonospora cubensis*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*; Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufen durch z.B. *Alternaria*-Arten, wie beispielsweise *Alternaria solani*; *Cercospora*-Arten, wie beispielsweise *Cercospora beticola*; *Cladosporium*-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cucumerinum*; *Cochliobolus*-Arten, wie

35 beispielsweise *Cochliobolus sativus* (Konidienform: *Drechslera*, Syn: *Helminthosporium*); *Colletotrichum*-Arten, wie beispielsweise *Colletotrichum lindemuthanium*; *Cyloconium*-Arten, wie beispielsweise *Cyloconium oleaginum*; *Diaporthe*-Arten, wie beispielsweise *Diaporthe citri*; *Elsinoe*-Arten, wie

beispielsweise *Elsinoe fawcettii*; Gloeosporium-Arten, wie beispielsweise *Gloeosporium laeticolor*; Glomerella-Arten, wie beispielsweise *Glomerella cingulata*; Guignardia-Arten, wie beispielsweise *Guignardia bidwelli*; Leptosphaeria-Arten, wie beispielsweise *Leptosphaeria maculans*; Magnaporthe-Arten, wie beispielsweise *Magnaporthe grisea*; Microdochium-Arten, wie beispielsweise *Microdochium nivale*;
5 Mycosphaerella-Arten, wie beispielsweise *Mycosphaerella graminicola* und *M. fijiensis*; Phaeosphaeria-Arten, wie beispielsweise *Phaeosphaeria nodorum*; Pyrenophora-Arten, wie beispielsweise *Pyrenophora teres*; Ramularia-Arten, wie beispielsweise *Ramularia collo-cygni*; Rhynchosporium-Arten, wie beispielsweise *Rhynchosporium secalis*; Septoria-Arten, wie beispielsweise *Septoria apii*; Typhula-Arten, wie beispielsweise *Typhula incarnata*; Venturia-Arten, wie beispielsweise *Venturia inaequalis*; Wurzel- und
10 Stängelkrankheiten, hervorgerufen durch z.B. Corticium-Arten, wie beispielsweise *Corticium graminearum*; Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium oxysporum*; Gaeumannomyces-Arten, wie beispielsweise *Gaeumannomyces graminis*; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; Tapesia-Arten, wie beispielsweise *Tapesia acuformis*; Thielaviopsis-Arten, wie beispielsweise *Thielaviopsis basicola*; Ähren- und Rispenkrankungen (inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z.B. Alternaria-Arten, wie
15 beispielsweise *Alternaria* spp.; Aspergillus-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*; Cladosporium-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cladosporioides*; Claviceps-Arten, wie beispielsweise *Claviceps purpurea*; Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*; Gibberella-Arten, wie beispielsweise *Gibberella zeae*; Monographella-Arten, wie beispielsweise *Monographella nivalis*; Septoria-Arten, wie beispielsweise *Septoria nodorum*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B. Sphacelotheca-
20 Arten, wie beispielsweise *Sphacelotheca reiliana*; Tilletia-Arten, wie beispielsweise *Tilletia caries*, *T. controversa*; Urocystis-Arten, wie beispielsweise *Urocystis occulta*; Ustilago-Arten, wie beispielsweise *Ustilago nuda*, *U. nuda tritici*; Fruchtfäule hervorgerufen durch z.B. Aspergillus-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*; Botrytis-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*; Penicillium-Arten, wie beispielsweise *Penicillium expansum* und *P. purpurogenum*; Sclerotinia-Arten, wie beispielsweise
25 *Sclerotinia sclerotiorum*; Verticillium-Arten, wie beispielsweise *Verticillium alboatrum*; Samen- und bodenbürtige Fäulen und Welken, sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen durch z.B. Fusarium-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*; Phytophthora Arten, wie beispielsweise *Phytophthora cactorum*; Pythium-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; Sclerotium-Arten, wie beispielsweise *Sclerotium rolfsii*; Krebserkrankungen, Gallen und
30 Hexenbesen, hervorgerufen durch z.B. Nectria-Arten, wie beispielsweise *Nectria galligena*; Welkeerkrankungen hervorgerufen durch z.B. Monilinia-Arten, wie beispielsweise *Monilinia laxa*; Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten, hervorgerufen durch z.B. Taphrina-Arten, wie beispielsweise *Taphrina deformans*; Degenerationserkrankungen holziger Pflanzen, hervorgerufen durch z.B. Esca-Arten, wie beispielsweise *Phaemoniella clamydospora* und *Phaeoacremonium aleophilum* und
35 *Fomitiporia mediterranea*; Blüten- und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z.B. Botrytis-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*; Erkrankungen von Pflanzenknollen, hervorgerufen durch z.B. Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; Helminthosporium-Arten, wie beispielsweise

Helminthosporium solani; Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erreger wie z.B. Xanthomonas-Arten, wie beispielsweise Xanthomonas campestris pv. oryzae; Pseudomonas-Arten, wie beispielsweise Pseudomonas syringae pv. lachrymans; Erwinia-Arten, wie beispielsweise Erwinia amylovora;

- 5 Bevorzugt können die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpft werden:
 Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln, Schoten und Samen verursacht durch z.B. Alternaria leaf spot (Alternaria spec. atrans tenuissima), Anthracnose (Colletotrichum gloeosporoides dematium var. truncatum), Brown spot (Septoria glycines), Cercospora leaf spot and blight (Cercospora kikuchii), Choanephora leaf blight (Choanephora infundibulifera trispora (Syn.)), Dactuliophora leaf spot (Dactuliophora glycines),
 10 Downy Mildew (Peronospora manshurica), Drechslera blight (Drechslera glycini), Frogeye Leaf spot (Cercospora sojina), Leptosphaerulina Leaf Spot (Leptosphaerulina trifolii), Phyllosticta Leaf Spot (Phyllosticta sojaecola), Pod and Stem Blight (Phomopsis sojiae), Powdery Mildew (Microsphaera diffusa), Pyrenochaeta Leaf Spot (Pyrenochaeta glycines), Rhizoctonia Aerial, Foliage, and Web Blight (Rhizoctonia solani), Rust (Phakopsora pachyrhizi, Phakopsora meibomiae), Scab (Sphaceloma glycines), Stemphylium
 15 Leaf Blight (Stemphylium botryosum), Target Spot (Corynespora cassiicola).

- Pilzkrankheiten an Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z.B. Black Root Rot (Calonectria crotalariae), Charcoal Rot (Macrophomina phaseolina), Fusarium Blight or Wilt, Root Rot, and Pod and Collar Rot (Fusarium oxysporum, Fusarium orthoceras, Fusarium semitectum, Fusarium equiseti),
 20 Mycoleptodiscus Root Rot (Mycoleptodiscus terrestris), Neocosmospora (Neocosmospora vasinfecta), Pod and Stem Blight (Diaporthe phaseolorum), Stem Canker (Diaporthe phaseolorum var. caulivora), Phytophthora Rot (Phytophthora megasperma), Brown Stem Rot (Phialophora gregata), Pythium Rot (Pythium aphanidermatum, Pythium irregulare, Pythium debaryanum, Pythium myriotylum, Pythium ultimum), Rhizoctonia Root Rot, Stem Decay, and Damping-Off (Rhizoctonia solani), Sclerotinia Stem
 25 Decay (Sclerotinia sclerotiorum), Sclerotinia Southern Blight (Sclerotinia rolfsii), Thielaviopsis Root Rot (Thielaviopsis basicola).

- Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderung der technischen Materialien bewirken können, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise
 30 wirken die erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, Holz verfärbende und Holz zerstörende Pilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen. Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt: Alternaria, wie Alternaria tenuis; Aspergillus, wie Aspergillus niger; Chaetomium, wie Chaetomium globosum; Coniophora, wie Coniophora puetana; Lentinus, wie Lentinus tigrinus; Penicillium, wie Penicillium glaucum; Polyporus, wie Polyporus versicolor; Aureobasidium, wie Aureobasidium pullulans; Sclerophoma, wie Sclerophoma pityophila;
 35 Trichoderma, wie Trichoderma viride; Escherichia, wie Escherichia coli; Pseudomonas, wie Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus, wie Staphylococcus aureus.

Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auch sehr gute antimykotische Wirkungen auf. Sie besitzen ein sehr breites antimykotisches Wirkungsspektrum, insbesondere gegen Dermatophyten und Sprosspilze, Schimmel und diphasische Pilze (z.B. gegen Candida-Spezies wie *Candida albicans*, *Candida glabrata*) sowie Epidermophyton floccosum, Aspergillus-Spezies wie *Aspergillus niger* und *Aspergillus fumigatus*, Trichophyton-Spezies wie *Trichophyton mentagrophytes*, Microsporon-Spezies wie *Microsporon canis* und *audouinii*. Die Aufzählung dieser Pilze stellt keinesfalls eine Beschränkung des erfassbaren mykologischen Spektrums dar, sondern hat nur erläuternden Charakter.

- 10 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können daher sowohl in medizinischen als auch in nicht-medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (*Mycoplasma-like-organism*) und RLO (*Rickettsia-like-organism*) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

- 20 Die nachstehenden Beispiele erläutern die Erfindung.

A. Chemische Beispiele

Synthese von 4-Brom-2-chlor-N³-ethyl-N¹-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)isophthalamid (Beispiel-Nr. 1-178)

- 25 Schritt 1: Herstellung von 6-Brom-2-chlor-3-(methoxycarbonyl)benzoesäure
1.47 g (5.29 mmol) Methyl-4-brom-2-chlor-3-formylbenzoat wurden 100 ml Aceton vorgelegt. Eine Lösung von 636 mg (6.35 mmol) Chrom(VI)oxid in schwefelsaurem Wasser (H₂O:H₂SO₄ 3:1) wurden langsam zugetropft. Die Mischung wurde auf Raumtemperatur erwärmt und 12 Stunden gerührt. Danach wurde wenig Isopropanol zugegeben und die Mischung im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wurde in
30 Wasser aufgenommen und mit Ethylacetat extrahiert, die organische Phase getrocknet und ins Trockne eingedampft. Man erhielt 1.23 g 6-Brom-2-chlor-3-(methoxycarbonyl)benzoesäure.

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 14.30 (br s, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 3.88 (s, 3H).

Schritt 2: Herstellung von Methyl-4-brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoat

- 35 753 mg (2.56 mmol) 6-Brom-2-chlor-3-(methoxycarbonyl)benzoesäure wurden in 30 ml Dichlormethan vorgelegt und mit katalytischen Mengen Dimethylformamid versetzt. Danach werden bei Raumtemperatur 498 mg (3.84 mmol) Oxalylchlorid zugegeben und 1 Stunde nachgerührt. Die

Mischung wurde ins Trockne eingedampft und der Rückstand mit Toluol ko-evaporiert. Der resultierende Rückstand wurde in 5 ml Dichlormethan aufgenommen. 1.9 ml (3.84 mmol) einer 2.5M Lösung von Ethylamin in Tetrahydrofuran und 663 mg (5.13 mmol) Hünig-Base wurden in 50 ml Dichlormethan vorgelegt und bei 0°C mit der Säurechlorid-Lösung versetzt. Die Mischung wurde 4 Stunden bei Raumtemperatur nachgerührt. Danach wurden 100 ml Dichlormethan zugegeben und mit wässriger 2M Salzsäure gewaschen. Die organische Phase wurde getrocknet und in Trockne eingengt. Man erhielt 773 mg Methyl-4-brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoate.

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 8.68 (t, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 3.87 (s, 3H); 3.28 (m, 2H); 1.12 (t, 3H).

10

Schritt 3: Herstellung von 4-Brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoesäure

773 mg (2.41 mmol) Methyl-4-brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoat wurden im 80 ml Methanol vorgelegt und bei Raumtemperatur mit 192 mg (4.82 mmol) wässriger 1M Natronlauge versetzt. Die Mischung wurde 12 Stunden bei 50°C gerührt und danach ins Trockne eingedampft. Der Rückstand wurde in wenig Wasser aufgenommen und die Lösung mittels wässriger 2M Salzsäure sauer gestellt, und mit Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wurde getrocknet und eingedampft. Man erhielt 582 mg 4-Brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoesäure.

15

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 13.69 (br s, 1H); 8.65 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 3.26 (m, 2H); 1.12 (t, 3H).

20

Schritt 4: Herstellung von 4-Brom-2-chlor-N³-ethyl-N¹-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)isophthalamid

189 mg (0.61 mmol) 4-Brom-2-chlor-3-(ethylcarbamoyl)benzoesäure und 93.5 mg (0.92 mmol) 5-Amino-1-methyl-1H-tetrazol wurden in 3 ml Pyridin vorgelegt und bei Raumtemperatur mit 155 mg (1.22 mmol) Oxalylchlorid versetzt. Die Mischung wurde 12 Stunden nachgerührt. Nach Zugabe von 10 ml Wasser wurde mit Dichlormethan extrahiert, die organischen Phasen wurden getrocknet und eingengt. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch gereinigt (HPLC, C18, Gradient: Acetonitril/Wasser (+0.05% Trifluoressigsäure) 10/90 → 100/0 in 30 min). Man erhielt 66 mg 4-Brom-2-chlor-N³-ethyl-N¹-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)isophthalamid (Beispiel-Nr. 1-178).

25

Die in nachfolgenden Tabellen aufgeführten Beispiele wurden analog oben genannten Methoden hergestellt beziehungsweise sind analog oben genannten Methoden erhältlich. Diese Verbindungen sind ganz besonders bevorzugt.


30

Die hier verwendeten Abkürzungen bedeuten:

Me = Methyl Bu = Butyl Et = Ethyl Pr = Propyl c = cyclo
Ph = Phenyl

35

Tabelle 1: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q¹ und R^x für Methyl stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



Nr.	X	Y	Z
1-1	Me	F	Me
1-2	Me	F	Et
1-3	Me	F	c-Pr
1-4	Me	Cl	Me
1-5	Me	Cl	Et
1-6	Me	Cl	c-Pr
1-7	Me	Br	Me
1-8	Me	Br	Et
1-9	Me	Br	c-Pr
1-10	Me	I	Me
1-11	Me	I	Et
1-12	Me	I	c-Pr
1-13	Me	SMe	Me
1-14	Me	SMe	Et
1-15	Me	SMe	c-Pr
1-16	Me	S(O)Me	Me
1-17	Me	S(O)Me	Et
1-18	Me	S(O)Me	c-Pr
1-19	Me	SO ₂ Me	Me
1-20	Me	SO ₂ Me	Et
1-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
1-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
1-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
1-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
1-25	Me	CF ₃	Me
1-26	Me	CF ₃	Et
1-27	Me	CF ₃	c-Pr
1-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
1-31	Me	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
1-32	Me	CF ₃	Pr
1-33	Me	CF ₃	i-Pr
1-34	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
1-35	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
1-36	Me	CF ₃	CH ₂ CN
1-37	Me	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-38	Me	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-39	Me	CF ₃	Ph
1-40	Me	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-41	Me	CF ₃	Oxetan-3-yl
1-42	Me	CF ₃	c-Bu
1-43	Me	CF ₃	c-Pentyl
1-44	Me	CHF ₂	Me
1-45	Me	CHF ₂	Et
1-46	Me	CHF ₂	c-Pr
1-47	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-48	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-49	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-50	Me	C ₂ F ₅	Me
1-51	Me	C ₂ F ₅	Et
1-52	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
1-53	OMe	Cl	Me
1-54	OMe	Cl	Et
1-55	OMe	Cl	c-Pr
1-56	OMe	CF ₃	Me
1-57	OMe	CF ₃	Et
1-58	OMe	CF ₃	c-Pr
1-59	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-60	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-71	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-72	OMe	CHF ₂	Me
1-73	OMe	CHF ₂	Et
1-74	OMe	CHF ₂	c-Pr
1-75	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-76	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
1-77	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-78	SMe	SO ₂ Me	Me
1-79	SMe	SO ₂ Me	Et
1-80	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
1-81	SMe	CF ₃	Me
1-82	SMe	CF ₃	Et
1-83	SMe	CF ₃	c-Pr
1-84	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-85	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-86	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-87	SMe	CHF ₂	Me
1-88	SMe	CHF ₂	Et
1-89	SMe	CHF ₂	c-Pr
1-90	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-91	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-92	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-93	SEt	CF ₃	Me
1-94	SEt	CF ₃	Et
1-95	SEt	CF ₃	c-Pr
1-96	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-97	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-98	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-99	SEt	CHF ₂	Me
1-100	SEt	CHF ₂	Et
1-101	SEt	CHF ₂	c-Pr
1-102	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-103	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-104	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-105	F	CF ₃	Me
1-106	F	CF ₃	Et
1-107	F	CF ₃	c-Pr
1-108	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-109	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-110	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-111	F	CHF ₂	Me
1-112	F	CHF ₂	Et

Nr.	X	Y	Z
1-113	F	CHF ₂	c-Pr
1-114	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-115	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-116	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-117	Cl	SMe	Me
1-118	Cl	SMe	Et
1-119	Cl	SMe	c-Pr
1-120	Cl	S(O)Me	Me
1-121	Cl	S(O)Me	Et
1-122	Cl	S(O)Me	c-Pr
1-123	Cl	SO ₂ Me	Me
1-124	Cl	SO ₂ Me	Et
1-125	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
1-126	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
1-127	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
1-128	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
1-129	Cl	CF ₃	Me
1-130	Cl	CF ₃	Et
1-131	Cl	CF ₃	c-Pr
1-132	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-133	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-134	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-135	Cl	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
1-136	Cl	CF ₃	Pr
1-137	Cl	CF ₃	iPr
1-138	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
1-139	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
1-140	Cl	CF ₃	CH ₂ CN
1-141	Cl	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-142	Cl	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-143	Cl	CF ₃	Ph
1-144	Cl	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-145	Cl	CF ₃	Oxetan-3-yl
1-146	Cl	CF ₃	cBu
1-147	Cl	CHF ₂	Me
1-148	Cl	CHF ₂	Et

Nr.	X	Y	Z
1-149	Cl	CHF ₂	c-Pr
1-150	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-151	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-152	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-153	Cl	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
1-154	Cl	CHF ₂	Pr
1-155	Cl	CHF ₂	iPr
1-156	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
1-157	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
1-158	Cl	CHF ₂	CH ₂ CN
1-159	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-160	Cl	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-161	Cl	CHF ₂	Ph
1-162	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-163	Cl	CHF ₂	Oxetan-3-yl
1-164	Cl	CHF ₂	cBu
1-165	Cl	C ₂ F ₅	Me
1-166	Cl	C ₂ F ₅	Et
1-167	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
1-168	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
1-169	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
1-170	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
1-171	Cl	Cl	Me
1-172	Cl	Cl	Et
1-173	Cl	Cl	c-Pr
1-174	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
1-175	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
1-176	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
1-177	Cl	Br	Me
1-178	Cl	Br	Et
1-179	Cl	Br	c-Pr
1-180	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
1-181	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
1-182	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
1-183	Cl	Br	CH(Me)-c-Pr
1-184	Cl	Br	Pr

Nr.	X	Y	Z
1-185	Cl	Br	i-Pr
1-186	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ OMe
1-187	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ SMe
1-188	Cl	Br	CH ₂ CN
1-189	Cl	Br	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-190	Cl	Br	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-191	Cl	Br	Ph
1-192	Cl	Br	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-193	Cl	Br	Oxetan-3-yl
1-194	Cl	Br	cBu
1-195	Cl	I	Me
1-196	Cl	I	Et
1-197	Cl	I	c-Pr
1-198	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
1-199	Cl	I	CH ₂ CF ₃
1-200	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
1-201	Br	SO ₂ Me	Me
1-202	Br	SO ₂ Me	Et
1-203	Br	SO ₂ Me	c-Pr
1-204	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
1-205	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
1-206	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
1-207	Br	CF ₃	Me
1-208	Br	CF ₃	Et
1-209	Br	CF ₃	c-Pr
1-210	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-211	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-212	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-213	Br	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
1-214	Br	CF ₃	Pr
1-215	Br	CF ₃	i-Pr
1-216	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
1-217	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
1-218	Br	CF ₃	CH ₂ CN
1-219	Br	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-220	Br	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂


Nr.	X	Y	Z
1-221	Br	CF ₃	Ph
1-222	Br	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-223	Br	CF ₃	Oxetan-3-yl
1-224	Br	CF ₃	c-Bu
1-225	Br	CHF ₂	Me
1-226	Br	CHF ₂	Et
1-227	Br	CHF ₂	c-Pr
1-228	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-229	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-230	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-231	Br	C ₂ F ₅	Me
1-232	Br	C ₂ F ₅	Et
1-233	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
1-234	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
1-235	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
1-236	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
1-237	I	SO ₂ Me	Me
1-238	I	SO ₂ Me	Et
1-239	I	SO ₂ Me	c-Pr
1-240	I	CF ₃	Me
1-241	I	CF ₃	Et
1-242	I	CF ₃	c-Pr
1-243	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-244	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-245	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-246	I	CHF ₂	Me
1-247	I	CHF ₂	Et
1-248	I	CHF ₂	c-Pr
1-249	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-250	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-251	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-252	I	C ₂ F ₅	Me
1-253	I	C ₂ F ₅	Et
1-254	I	C ₂ F ₅	c-Pr
1-255	CH ₂ OMe	CF ₃	Me
1-256	CH ₂ OMe	CF ₃	Et

Nr.	X	Y	Z
1-257	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
1-258	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-259	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-260	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-261	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
1-262	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
1-263	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
1-264	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-265	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-266	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-267	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
1-268	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
1-269	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
1-270	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
1-271	Et	CF ₃	Me
1-272	Et	CF ₃	Et
1-273	Et	CF ₃	c-Pr
1-274	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-275	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-276	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-277	Et	CHF ₂	Me
1-278	Et	CHF ₂	Et
1-279	Et	CHF ₂	c-Pr
1-280	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-281	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-282	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-283	Et	C ₂ F ₅	Me
1-284	Et	C ₂ F ₅	Et
1-285	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
1-286	c-Pr	CF ₃	Me
1-287	c-Pr	CF ₃	Et
1-288	c-Pr	CF ₃	c-Pr
1-289	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-290	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-291	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-292	c-Pr	CF ₃	CH(Me)-c-Pr

Nr.	X	Y	Z
1-293	c-Pr	CF ₃	Pr
1-294	c-Pr	CF ₃	iPr
1-295	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
1-296	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
1-297	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CN
1-298	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-299	c-Pr	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-300	c-Pr	CF ₃	Ph
1-301	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-302	c-Pr	CF ₃	Oxetan-3-yl
1-303	c-Pr	CF ₃	c-Bu
1-304	c-Pr	CHF ₂	Me
1-305	c-Pr	CHF ₂	Et
1-306	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
1-307	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
1-308	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
1-309	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
1-310	c-Pr	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
1-311	c-Pr	CHF ₂	Pr
1-312	c-Pr	CHF ₂	i-Pr
1-313	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
1-314	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
1-315	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CN
1-316	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
1-317	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
1-318	c-Pr	CHF ₂	Ph
1-319	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
1-320	c-Pr	CHF ₂	Oxetan-3-yl
1-321	c-Pr	CHF ₂	cBu
1-322	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
1-323	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
1-324	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr
1-325	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
1-326	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
1-327	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
1-328	c-Pr	SO ₂ Me	Me

Nr.	X	Y	Z
1-329	c-Pr	SO ₂ Me	Et
1-330	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
1-331	CF ₃	CF ₃	Me
1-332	CF ₃	CF ₃	Et
1-333	CF ₃	CF ₃	c-Pr
1-334	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
1-335	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
1-336	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
1-337	Cl	CF ₃	Acetyl
1-338	Cl	CF ₃	H
1-339	Me	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
1-340	Br	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
1-341	Et	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
1-342	Br	Br	Me
1-343	Br	Br	Et
1-344	Br	Br	c-Pr
1-345	Me	CHF ₂	Pr
1-346	Me	CHF ₂	i-Pr
1-347	Me	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
1-348	Me	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
1-349	Br	Cl	Me
1-350	Br	Cl	Et
1-351	Br	Cl	c-Pr
1-352	SMe	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
1-353	SMe	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
1-354	Cl	OMe	Me
1-355	Cl	OMe	Et
1-356	Cl	OMe	c-Pr
1-357	Cl	CF ₃	OMe
1-358	Cl	CF ₃	OEt
1-359	Cl	CF ₃	OPr
1-360	Cl	CF ₃	Oi-Pr
1-361	Cl	CHF ₂	OMe
1-362	Cl	CHF ₂	OEt
1-363	Cl	CHF ₂	OPr
1-364	Cl	CHF ₂	Oi-Pr

Tabelle 2: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q¹ und R^x für Ethyl stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



Nr.	X	Y	Z
2-1	Me	F	Me
2-2	Me	F	Et
2-3	Me	F	c-Pr
2-4	Me	Cl	Me
2-5	Me	Cl	Et
2-6	Me	Cl	c-Pr
2-7	Me	Br	Me
2-8	Me	Br	Et
2-9	Me	Br	c-Pr
2-10	Me	I	Me
2-11	Me	I	Et
2-12	Me	I	c-Pr
2-13	Me	SMe	Me
2-14	Me	SMe	Et
2-15	Me	SMe	c-Pr
2-16	Me	S(O)Me	Me
2-17	Me	S(O)Me	Et
2-18	Me	S(O)Me	c-Pr
2-19	Me	SO ₂ Me	Me
2-20	Me	SO ₂ Me	Et
2-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
2-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
2-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
2-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
2-25	Me	CF ₃	Me
2-26	Me	CF ₃	Et
2-27	Me	CF ₃	c-Pr
2-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
2-31	Me	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
2-32	Me	CF ₃	Pr
2-33	Me	CF ₃	i-Pr
2-34	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
2-35	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
2-36	Me	CF ₃	CH ₂ CN
2-37	Me	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-38	Me	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-39	Me	CF ₃	Ph
2-40	Me	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-41	Me	CF ₃	Oxetan-3-yl
2-42	Me	CF ₃	c-Bu
2-43	Me	CF ₃	c-Pentyl
2-44	Me	CHF ₂	Me
2-45	Me	CHF ₂	Et
2-46	Me	CHF ₂	c-Pr
2-47	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-48	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-49	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-50	Me	C ₂ F ₅	Me
2-51	Me	C ₂ F ₅	Et
2-52	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
2-53	OMe	Cl	Me
2-54	OMe	Cl	Et
2-55	OMe	Cl	c-Pr
2-56	OMe	CF ₃	Me
2-57	OMe	CF ₃	Et
2-58	OMe	CF ₃	c-Pr
2-59	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-60	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-71	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-72	OMe	CHF ₂	Me
2-73	OMe	CHF ₂	Et
2-74	OMe	CHF ₂	c-Pr
2-75	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-76	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
2-77	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-78	SMe	SO ₂ Me	Me
2-79	SMe	SO ₂ Me	Et
2-80	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
2-81	SMe	CF ₃	Me
2-82	SMe	CF ₃	Et
2-83	SMe	CF ₃	c-Pr
2-84	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-85	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-86	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-87	SMe	CHF ₂	Me
2-88	SMe	CHF ₂	Et
2-89	SMe	CHF ₂	c-Pr
2-90	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-91	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-92	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-93	SEt	CF ₃	Me
2-94	SEt	CF ₃	Et
2-95	SEt	CF ₃	c-Pr
2-96	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-97	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-98	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-99	SEt	CHF ₂	Me
2-100	SEt	CHF ₂	Et
2-101	SEt	CHF ₂	c-Pr
2-102	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-103	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-104	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-105	F	CF ₃	Me
2-106	F	CF ₃	Et
2-107	F	CF ₃	c-Pr
2-108	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-109	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-110	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-111	F	CHF ₂	Me
2-112	F	CHF ₂	Et

Nr.	X	Y	Z
2-113	F	CHF ₂	c-Pr
2-114	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-115	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-116	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-117	Cl	SMe	Me
2-118	Cl	SMe	Et
2-119	Cl	SMe	c-Pr
2-120	Cl	S(O)Me	Me
2-121	Cl	S(O)Me	Et
2-122	Cl	S(O)Me	c-Pr
2-123	Cl	SO ₂ Me	Me
2-124	Cl	SO ₂ Me	Et
2-125	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
2-126	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
2-127	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
2-128	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
2-129	Cl	CF ₃	Me
2-130	Cl	CF ₃	Et
2-131	Cl	CF ₃	c-Pr
2-132	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-133	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-134	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-135	Cl	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
2-136	Cl	CF ₃	Pr
2-137	Cl	CF ₃	i-Pr
2-138	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
2-139	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
2-140	Cl	CF ₃	CH ₂ CN
2-141	Cl	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-142	Cl	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-143	Cl	CF ₃	Ph
2-144	Cl	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-145	Cl	CF ₃	Oxetan-3-yl
2-146	Cl	CF ₃	c-Bu
2-147	Cl	CHF ₂	Me
2-148	Cl	CHF ₂	Et

Nr.	X	Y	Z
2-149	Cl	CHF ₂	c-Pr
2-150	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-151	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-152	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-153	Cl	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
2-154	Cl	CHF ₂	Pr
2-155	Cl	CHF ₂	i-Pr
2-156	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
2-157	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
2-158	Cl	CHF ₂	CH ₂ CN
2-159	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-160	Cl	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-161	Cl	CHF ₂	Ph
2-162	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-163	Cl	CHF ₂	Oxetan-3-yl
2-164	Cl	CHF ₂	c-Bu
2-165	Cl	C ₂ F ₅	Me
2-166	Cl	C ₂ F ₅	Et
2-167	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
2-168	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
2-169	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
2-170	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
2-171	Cl	Cl	Me
2-172	Cl	Cl	Et
2-173	Cl	Cl	c-Pr
2-174	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
2-175	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
2-176	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
2-177	Cl	Br	Me
2-178	Cl	Br	Et
2-179	Cl	Br	c-Pr
2-180	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
2-181	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
2-182	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
2-183	Cl	Br	CH(Me)-c-Pr
2-184	Cl	Br	Pr

Nr.	X	Y	Z
2-185	Cl	Br	i-Pr
2-186	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ OMe
2-187	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ SMe
2-188	Cl	Br	CH ₂ CN
2-189	Cl	Br	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-190	Cl	Br	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-191	Cl	Br	Ph
2-192	Cl	Br	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-193	Cl	Br	Oxetan-3-yl
2-194	Cl	Br	c-Bu
2-195	Cl	I	Me
2-196	Cl	I	Et
2-197	Cl	I	c-Pr
2-198	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
2-199	Cl	I	CH ₂ CF ₃
2-200	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
2-201	Br	SO ₂ Me	Me
2-202	Br	SO ₂ Me	Et
2-203	Br	SO ₂ Me	c-Pr
2-204	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
2-205	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
2-206	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
2-207	Br	CF ₃	Me
2-208	Br	CF ₃	Et
2-209	Br	CF ₃	c-Pr
2-210	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-211	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-212	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-213	Br	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
2-214	Br	CF ₃	Pr
2-215	Br	CF ₃	i-Pr
2-216	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
2-217	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
2-218	Br	CF ₃	CH ₂ CN
2-219	Br	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-220	Br	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂


Nr.	X	Y	Z
2-221	Br	CF ₃	Ph
2-222	Br	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-223	Br	CF ₃	Oxetan-3-yl
2-224	Br	CF ₃	c-Bu
2-225	Br	CHF ₂	Me
2-226	Br	CHF ₂	Et
2-227	Br	CHF ₂	c-Pr
2-228	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-229	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-230	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-231	Br	C ₂ F ₅	Me
2-232	Br	C ₂ F ₅	Et
2-233	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
2-234	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
2-235	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
2-236	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
2-237	I	SO ₂ Me	Me
2-238	I	SO ₂ Me	Et
2-239	I	SO ₂ Me	c-Pr
2-240	I	CF ₃	Me
2-241	I	CF ₃	Et
2-242	I	CF ₃	c-Pr
2-243	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-244	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-245	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-246	I	CHF ₂	Me
2-247	I	CHF ₂	Et
2-248	I	CHF ₂	c-Pr
2-249	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-250	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-251	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-252	I	C ₂ F ₅	Me
2-253	I	C ₂ F ₅	Et
2-254	I	C ₂ F ₅	c-Pr
2-255	CH ₂ OMe	CF ₃	Me
2-256	CH ₂ OMe	CF ₃	Et

Nr.	X	Y	Z
2-257	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
2-258	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-259	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-260	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-261	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
2-262	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
2-263	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
2-264	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-265	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-266	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-267	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
2-268	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
2-269	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
2-270	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
2-271	Et	CF ₃	Me
2-272	Et	CF ₃	Et
2-273	Et	CF ₃	c-Pr
2-274	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-275	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-276	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-277	Et	CHF ₂	Me
2-278	Et	CHF ₂	Et
2-279	Et	CHF ₂	c-Pr
2-280	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-281	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-282	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-283	Et	C ₂ F ₅	Me
2-284	Et	C ₂ F ₅	Et
2-285	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
2-286	c-Pr	CF ₃	Me
2-287	c-Pr	CF ₃	Et
2-288	c-Pr	CF ₃	c-Pr
2-289	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-290	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-291	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-292	c-Pr	CF ₃	CH(Me)-c-Pr

Nr.	X	Y	Z
2-293	c-Pr	CF ₃	Pr
2-294	c-Pr	CF ₃	i-Pr
2-295	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
2-296	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
2-297	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CN
2-298	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-299	c-Pr	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-300	c-Pr	CF ₃	Ph
2-301	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-302	c-Pr	CF ₃	Oxetan-3-yl
2-303	c-Pr	CF ₃	c-Bu
2-304	c-Pr	CHF ₂	Me
2-305	c-Pr	CHF ₂	Et
2-306	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
2-307	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
2-308	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
2-309	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
2-310	c-Pr	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
2-311	c-Pr	CHF ₂	Pr
2-312	c-Pr	CHF ₂	i-Pr
2-313	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
2-314	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
2-315	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CN
2-316	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
2-317	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
2-318	c-Pr	CHF ₂	Ph
2-319	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
2-320	c-Pr	CHF ₂	Oxetan-3-yl
2-321	c-Pr	CHF ₂	c-Bu
2-322	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
2-323	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
2-324	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr
2-325	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
2-326	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
2-327	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
2-328	c-Pr	SO ₂ Me	Me

Nr.	X	Y	Z
2-329	c-Pr	SO ₂ Me	Et
2-330	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
2-331	CF ₃	CF ₃	Me
2-332	CF ₃	CF ₃	Et
2-333	CF ₃	CF ₃	c-Pr
2-334	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
2-335	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
2-336	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
2-337	Cl	CF ₃	Acetyl
2-338	Cl	CF ₃	H
2-339	Me	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
2-340	Br	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
2-341	Et	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
2-342	Br	Br	Et
2-343	Br	Br	c-Pr
2-344	Me	CHF ₂	Pr
2-345	Me	CHF ₂	i-Pr
2-346	Me	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
2-347	Me	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
2-348	Br	Cl	Et
2-349	Br	Cl	c-Pr
2-350	SMe	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
2-351	SMe	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
2-352	Cl	OMe	Me
2-353	Cl	OMe	Et
2-354	Cl	OMe	c-Pr
2-355	Br	Br	Me
2-356	Br	Cl	Me
2-357	Cl	CF ₃	OMe
2-358	Cl	CF ₃	OEt
2-359	Cl	CF ₃	OPr
2-360	Cl	CF ₃	Oi-Pr
2-361	Cl	CHF ₂	OMe
2-362	Cl	CHF ₂	OEt
2-363	Cl	CHF ₂	OPr
2-364	Cl	CHF ₂	Oi-Pr

Tabelle 3: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q¹ und R^x für Propyl stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



Nr.	X	Y	Z
3-1	Me	F	Me
3-2	Me	F	Et
3-3	Me	F	c-Pr
3-4	Me	Cl	Me
3-5	Me	Cl	Et
3-6	Me	Cl	c-Pr
3-7	Me	Br	Me
3-8	Me	Br	Et
3-9	Me	Br	c-Pr
3-10	Me	I	Me
3-11	Me	I	Et
3-12	Me	I	c-Pr
3-13	Me	SMe	Me
3-14	Me	SMe	Et
3-15	Me	SMe	c-Pr
3-16	Me	S(O)Me	Me
3-17	Me	S(O)Me	Et
3-18	Me	S(O)Me	c-Pr
3-19	Me	SO ₂ Me	Me
3-20	Me	SO ₂ Me	Et
3-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
3-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
3-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
3-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
3-25	Me	CF ₃	Me
3-26	Me	CF ₃	Et
3-27	Me	CF ₃	c-Pr
3-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
3-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-31	Me	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
3-32	Me	CF ₃	Pr
3-33	Me	CF ₃	i-Pr
3-34	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
3-35	Me	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
3-36	Me	CF ₃	CH ₂ CN
3-37	Me	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-38	Me	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-39	Me	CF ₃	Ph
3-40	Me	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-41	Me	CF ₃	Oxetan-3-yl
3-42	Me	CF ₃	c-Bu
3-43	Me	CF ₃	c-Pentyl
3-44	Me	CHF ₂	Me
3-45	Me	CHF ₂	Et
3-46	Me	CHF ₂	c-Pr
3-47	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-48	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-49	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-50	Me	C ₂ F ₅	Me
3-51	Me	C ₂ F ₅	Et
3-52	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
3-53	OMe	Cl	Me
3-54	OMe	Cl	Et
3-55	OMe	Cl	c-Pr
3-56	OMe	CF ₃	Me
3-57	OMe	CF ₃	Et
3-58	OMe	CF ₃	c-Pr
3-59	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-60	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-71	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-72	OMe	CHF ₂	Me
3-73	OMe	CHF ₂	Et
3-74	OMe	CHF ₂	c-Pr
3-75	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr

Nr.	X	Y	Z
3-76	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-77	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-78	SMe	SO ₂ Me	Me
3-79	SMe	SO ₂ Me	Et
3-80	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
3-81	SMe	CF ₃	Me
3-82	SMe	CF ₃	Et
3-83	SMe	CF ₃	c-Pr
3-84	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-85	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-86	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-87	SMe	CHF ₂	Me
3-88	SMe	CHF ₂	Et
3-89	SMe	CHF ₂	c-Pr
3-90	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-91	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-92	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-93	SEt	CF ₃	Me
3-94	SEt	CF ₃	Et
3-95	SEt	CF ₃	c-Pr
3-96	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-97	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-98	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-99	SEt	CHF ₂	Me
3-100	SEt	CHF ₂	Et
3-101	SEt	CHF ₂	c-Pr
3-102	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-103	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-104	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-105	F	CF ₃	Me
3-106	F	CF ₃	Et
3-107	F	CF ₃	c-Pr
3-108	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-109	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-110	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-111	F	CHF ₂	Me

Nr.	X	Y	Z
3-112	F	CHF ₂	Et
3-113	F	CHF ₂	c-Pr
3-114	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-115	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-116	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-117	Cl	SMe	Me
3-118	Cl	SMe	Et
3-119	Cl	SMe	c-Pr
3-120	Cl	S(O)Me	Me
3-121	Cl	S(O)Me	Et
3-122	Cl	S(O)Me	c-Pr
3-123	Cl	SO ₂ Me	Me
3-124	Cl	SO ₂ Me	Et
3-125	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
3-126	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
3-127	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
3-128	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
3-129	Cl	CF ₃	Me
3-130	Cl	CF ₃	Et
3-131	Cl	CF ₃	c-Pr
3-132	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-133	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-134	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-135	Cl	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
3-136	Cl	CF ₃	Pr
3-137	Cl	CF ₃	i-Pr
3-138	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
3-139	Cl	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
3-140	Cl	CF ₃	CH ₂ CN
3-141	Cl	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-142	Cl	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-143	Cl	CF ₃	Ph
3-144	Cl	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-145	Cl	CF ₃	Oxetan-3-yl
3-146	Cl	CF ₃	c-Bu
3-147	Cl	CHF ₂	Me

Nr.	X	Y	Z
3-148	Cl	CHF ₂	Et
3-149	Cl	CHF ₂	c-Pr
3-150	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-151	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-152	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-153	Cl	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
3-154	Cl	CHF ₂	Pr
3-155	Cl	CHF ₂	i-Pr
3-156	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
3-157	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
3-158	Cl	CHF ₂	CH ₂ CN
3-159	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-160	Cl	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-161	Cl	CHF ₂	Ph
3-162	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-163	Cl	CHF ₂	Oxetan-3-yl
3-164	Cl	CHF ₂	c-Bu
3-165	Cl	C ₂ F ₅	Me
3-166	Cl	C ₂ F ₅	Et
3-167	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
3-168	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
3-169	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
3-170	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
3-171	Cl	Cl	Me
3-172	Cl	Cl	Et
3-173	Cl	Cl	c-Pr
3-174	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
3-175	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
3-176	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
3-177	Cl	Br	Me
3-178	Cl	Br	Et
3-179	Cl	Br	c-Pr
3-180	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
3-181	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
3-182	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
3-183	Cl	Br	CH(Me)-c-Pr

Nr.	X	Y	Z
3-184	Cl	Br	Pr
3-185	Cl	Br	iPr
3-186	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ OMe
3-187	Cl	Br	CH ₂ CH ₂ SMe
3-188	Cl	Br	CH ₂ CN
3-189	Cl	Br	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-190	Cl	Br	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-191	Cl	Br	Ph
3-192	Cl	Br	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-193	Cl	Br	Oxetan-3-yl
3-194	Cl	Br	cBu
3-195	Cl	I	Me
3-196	Cl	I	Et
3-197	Cl	I	c-Pr
3-198	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
3-199	Cl	I	CH ₂ CF ₃
3-200	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
3-201	Br	SO ₂ Me	Me
3-202	Br	SO ₂ Me	Et
3-203	Br	SO ₂ Me	c-Pr
3-204	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
3-205	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
3-206	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
3-207	Br	CF ₃	Me
3-208	Br	CF ₃	Et
3-209	Br	CF ₃	c-Pr
3-210	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-211	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-212	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-213	Br	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
3-214	Br	CF ₃	Pr
3-215	Br	CF ₃	i-Pr
3-216	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
3-217	Br	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
3-218	Br	CF ₃	CH ₂ CN
3-219	Br	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)


Nr.	X	Y	Z
3-220	Br	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-221	Br	CF ₃	Ph
3-222	Br	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-223	Br	CF ₃	Oxetan-3-yl
3-224	Br	CF ₃	c-Bu
3-225	Br	CHF ₂	Me
3-226	Br	CHF ₂	Et
3-227	Br	CHF ₂	c-Pr
3-228	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-229	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-230	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-231	Br	C ₂ F ₅	Me
3-232	Br	C ₂ F ₅	Et
3-233	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
3-234	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
3-235	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
3-236	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
3-237	I	SO ₂ Me	Me
3-238	I	SO ₂ Me	Et
3-239	I	SO ₂ Me	c-Pr
3-240	I	CF ₃	Me
3-241	I	CF ₃	Et
3-242	I	CF ₃	c-Pr
3-243	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-244	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-245	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-246	I	CHF ₂	Me
3-247	I	CHF ₂	Et
3-248	I	CHF ₂	c-Pr
3-249	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-250	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-251	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-252	I	C ₂ F ₅	Me
3-253	I	C ₂ F ₅	Et
3-254	I	C ₂ F ₅	c-Pr
3-255	CH ₂ OMe	CF ₃	Me

Nr.	X	Y	Z
3-256	CH ₂ OMe	CF ₃	Et
3-257	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
3-258	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-259	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-260	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-261	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
3-262	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
3-263	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
3-264	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-265	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-266	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-267	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
3-268	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
3-269	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
3-270	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
3-271	Et	CF ₃	Me
3-272	Et	CF ₃	Et
3-273	Et	CF ₃	c-Pr
3-274	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-275	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-276	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-277	Et	CHF ₂	Me
3-278	Et	CHF ₂	Et
3-279	Et	CHF ₂	c-Pr
3-280	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-281	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-282	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-283	Et	C ₂ F ₅	Me
3-284	Et	C ₂ F ₅	Et
3-285	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
3-286	c-Pr	CF ₃	Me
3-287	c-Pr	CF ₃	Et
3-288	c-Pr	CF ₃	c-Pr
3-289	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-290	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-291	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
3-292	c-Pr	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
3-293	c-Pr	CF ₃	Pr
3-294	c-Pr	CF ₃	i-Pr
3-295	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ OMe
3-296	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CH ₂ SMe
3-297	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CN
3-298	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-299	c-Pr	CF ₃	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-300	c-Pr	CF ₃	Ph
3-301	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-302	c-Pr	CF ₃	Oxetan-3-yl
3-303	c-Pr	CF ₃	c-Bu
3-304	c-Pr	CHF ₂	Me
3-305	c-Pr	CHF ₂	Et
3-306	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
3-307	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
3-308	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
3-309	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
3-310	c-Pr	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
3-311	c-Pr	CHF ₂	Pr
3-312	c-Pr	CHF ₂	i-Pr
3-313	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
3-314	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ SMe
3-315	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CN
3-316	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
3-317	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
3-318	c-Pr	CHF ₂	Ph
3-319	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
3-320	c-Pr	CHF ₂	Oxetan-3-yl
3-321	c-Pr	CHF ₂	c-Bu
3-322	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
3-323	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
3-324	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr
3-325	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
3-326	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
3-327	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
3-328	c-Pr	SO ₂ Me	Me
3-329	c-Pr	SO ₂ Me	Et
3-330	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
3-331	CF ₃	CF ₃	Me
3-332	CF ₃	CF ₃	Et
3-333	CF ₃	CF ₃	c-Pr
3-334	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
3-335	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
3-336	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
3-337	Cl	CF ₃	Acetyl
3-338	Cl	CF ₃	H

Tabelle 4: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q² und R^x für Methyl stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



5

Nr.	X	Y	Z
4-1	Me	F	Me
4-2	Me	F	Et
4-3	Me	F	c-Pr
4-4	Me	Cl	Me
4-5	Me	Cl	Et
4-6	Me	Cl	c-Pr
4-7	Me	Br	Me
4-8	Me	Br	Et
4-9	Me	Br	c-Pr
4-10	Me	I	Me
4-11	Me	I	Et
4-12	Me	I	c-Pr
4-13	Me	SMe	Me
4-14	Me	SMe	Et

Nr.	X	Y	Z
4-15	Me	SMe	c-Pr
4-16	Me	S(O)Me	Me
4-17	Me	S(O)Me	Et
4-18	Me	S(O)Me	c-Pr
4-19	Me	SO ₂ Me	Me
4-20	Me	SO ₂ Me	Et
4-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
4-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
4-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
4-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
4-25	Me	CF ₃	Me
4-26	Me	CF ₃	Et
4-27	Me	CF ₃	c-Pr
4-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-31	Me	CHF ₂	Me
4-32	Me	CHF ₂	Et
4-33	Me	CHF ₂	c-Pr
4-34	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-35	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-36	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-37	Me	C ₂ F ₅	Me
4-38	Me	C ₂ F ₅	Et
4-39	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
4-40	OMe	Cl	Me
4-41	OMe	Cl	Et
4-42	OMe	Cl	c-Pr
4-43	OMe	CF ₃	Me
4-44	OMe	CF ₃	Et
4-45	OMe	CF ₃	c-Pr
4-46	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-47	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-48	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-49	OMe	CHF ₂	Me
4-50	OMe	CHF ₂	Et

Nr.	X	Y	Z
4-51	OMe	CHF ₂	c-Pr
4-52	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-53	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-54	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-55	SMe	SO ₂ Me	Me
4-56	SMe	SO ₂ Me	Et
4-57	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
4-58	SMe	CF ₃	Me
4-59	SMe	CF ₃	Et
4-60	SMe	CF ₃	c-Pr
4-71	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-72	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-73	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-74	SMe	CHF ₂	Me
4-75	SMe	CHF ₂	Et
4-76	SMe	CHF ₂	c-Pr
4-77	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-78	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-79	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-80	SEt	CF ₃	Me
4-81	SEt	CF ₃	Et
4-82	SEt	CF ₃	c-Pr
4-83	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-84	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-85	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-86	SEt	CHF ₂	Me
4-87	SEt	CHF ₂	Et
4-88	SEt	CHF ₂	c-Pr
4-89	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-90	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-91	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-92	F	CF ₃	Me
4-93	F	CF ₃	Et
4-94	F	CF ₃	c-Pr
4-95	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-96	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
4-97	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-98	F	CHF ₂	Me
4-99	F	CHF ₂	Et
4-100	F	CHF ₂	c-Pr
4-101	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-102	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-103	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-104	Cl	SMe	Me
4-105	Cl	SMe	Et
4-106	Cl	SMe	c-Pr
4-107	Cl	S(O)Me	Me
4-108	Cl	S(O)Me	Et
4-109	Cl	S(O)Me	c-Pr
4-110	Cl	SO ₂ Me	Me
4-111	Cl	SO ₂ Me	Et
4-112	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
4-113	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
4-114	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
4-115	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
4-116	Cl	CF ₃	Me
4-117	Cl	CF ₃	Et
4-118	Cl	CF ₃	c-Pr
4-119	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-120	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-121	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-122	Cl	CHF ₂	Me
4-123	Cl	CHF ₂	Et
4-124	Cl	CHF ₂	c-Pr
4-125	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-126	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-127	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-128	Cl	C ₂ F ₅	Me
4-129	Cl	C ₂ F ₅	Et
4-130	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
4-131	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
4-132	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃


Nr.	X	Y	Z
4-133	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
4-134	Cl	Cl	Me
4-135	Cl	Cl	Et
4-136	Cl	Cl	c-Pr
4-137	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
4-138	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
4-139	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
4-140	Cl	Br	Me
4-141	Cl	Br	Et
4-142	Cl	Br	c-Pr
4-143	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
4-144	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
4-145	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
4-146	Cl	I	Me
4-147	Cl	I	Et
4-148	Cl	I	c-Pr
4-149	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
4-150	Cl	I	CH ₂ CF ₃
4-151	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
4-152	Br	SO ₂ Me	Me
4-153	Br	SO ₂ Me	Et
4-154	Br	SO ₂ Me	c-Pr
4-155	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
4-156	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
4-157	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
4-158	Br	CF ₃	Me
4-159	Br	CF ₃	Et
4-160	Br	CF ₃	c-Pr
4-161	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-162	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-163	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-164	Br	CHF ₂	Me
4-165	Br	CHF ₂	Et
4-166	Br	CHF ₂	c-Pr
4-167	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-168	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
4-169	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-170	Br	C ₂ F ₅	Me
4-171	Br	C ₂ F ₅	Et
4-172	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
4-173	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
4-174	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
4-175	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
4-176	I	SO ₂ Me	Me
4-177	I	SO ₂ Me	Et
4-178	I	SO ₂ Me	c-Pr
4-179	I	CF ₃	Me
4-180	I	CF ₃	Et
4-181	I	CF ₃	c-Pr
4-182	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-183	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-184	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-185	I	CHF ₂	Me
4-186	I	CHF ₂	Et
4-187	I	CHF ₂	c-Pr
4-188	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-189	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-190	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-191	I	C ₂ F ₅	Me
4-192	I	C ₂ F ₅	Et
4-193	I	C ₂ F ₅	c-Pr
4-194	CH ₂ OMe	CF ₃	Me
4-195	CH ₂ OMe	CF ₃	Et
4-196	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
4-197	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-198	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-199	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-200	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
4-201	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
4-202	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
4-203	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-204	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
4-205	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-206	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
4-207	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
4-208	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
4-209	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
4-210	Et	CF ₃	Me
4-211	Et	CF ₃	Et
4-212	Et	CF ₃	c-Pr
4-213	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-214	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-215	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-216	Et	CHF ₂	Me
4-217	Et	CHF ₂	Et
4-218	Et	CHF ₂	c-Pr
4-219	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-220	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-221	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-222	Et	C ₂ F ₅	Me
4-223	Et	C ₂ F ₅	Et
4-224	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
4-225	c-Pr	CF ₃	Me
4-226	c-Pr	CF ₃	Et
4-227	c-Pr	CF ₃	c-Pr
4-228	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-229	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-230	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-231	c-Pr	CHF ₂	Me
4-232	c-Pr	CHF ₂	Et
4-233	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
4-234	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
4-235	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
4-236	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
4-237	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
4-238	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
4-239	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr
4-240	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr

Nr.	X	Y	Z
4-241	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
4-242	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
4-243	c-Pr	SO ₂ Me	Me
4-244	c-Pr	SO ₂ Me	Et
4-245	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
4-246	CF ₃	CF ₃	Me
4-247	CF ₃	CF ₃	Et
4-248	CF ₃	CF ₃	c-Pr
4-249	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
4-250	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
4-251	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
4-252	Cl	CF ₃	H

Tabelle 5: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q⁴ und R^Z für Wasserstoff stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



5

Nr.	X	Y	Z
5-1	Me	F	Me
5-2	Me	F	Et
5-3	Me	F	c-Pr
5-4	Me	Cl	Me
5-5	Me	Cl	Et
5-6	Me	Cl	c-Pr
5-7	Me	Br	Me
5-8	Me	Br	Et
5-9	Me	Br	c-Pr
5-10	Me	I	Me
5-11	Me	I	Et
5-12	Me	I	c-Pr
5-13	Me	SMe	Me

Nr.	X	Y	Z
5-14	Me	SMe	Et
5-15	Me	SMe	c-Pr
5-16	Me	S(O)Me	Me
5-17	Me	S(O)Me	Et
5-18	Me	S(O)Me	c-Pr
5-19	Me	SO ₂ Me	Me
5-20	Me	SO ₂ Me	Et
5-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
5-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
5-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
5-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
5-25	Me	CF ₃	Me
5-26	Me	CF ₃	Et
5-27	Me	CF ₃	c-Pr
5-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-31	Me	CHF ₂	Me
5-32	Me	CHF ₂	Et
5-33	Me	CHF ₂	c-Pr
5-34	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-35	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-36	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-37	Me	C ₂ F ₅	Me
5-38	Me	C ₂ F ₅	Et
5-39	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
5-40	OMe	Cl	Me
5-41	OMe	Cl	Et
5-42	OMe	Cl	c-Pr
5-43	OMe	CF ₃	Me
5-44	OMe	CF ₃	Et
5-45	OMe	CF ₃	c-Pr
5-46	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-47	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-48	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-49	OMe	CHF ₂	Me

Nr.	X	Y	Z
5-50	OMe	CHF ₂	Et
5-51	OMe	CHF ₂	c-Pr
5-52	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-53	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-54	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-55	SMe	SO ₂ Me	Me
5-56	SMe	SO ₂ Me	Et
5-57	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
5-58	SMe	CF ₃	Me
5-59	SMe	CF ₃	Et
5-60	SMe	CF ₃	c-Pr
5-71	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-72	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-73	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-74	SMe	CHF ₂	Me
5-75	SMe	CHF ₂	Et
5-76	SMe	CHF ₂	c-Pr
5-77	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-78	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-79	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-80	SEt	CF ₃	Me
5-81	SEt	CF ₃	Et
5-82	SEt	CF ₃	c-Pr
5-83	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-84	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-85	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-86	SEt	CHF ₂	Me
5-87	SEt	CHF ₂	Et
5-88	SEt	CHF ₂	c-Pr
5-89	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-90	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-91	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-92	F	CF ₃	Me
5-93	F	CF ₃	Et
5-94	F	CF ₃	c-Pr
5-95	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr

Nr.	X	Y	Z
5-96	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-97	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-98	F	CHF ₂	Me
5-99	F	CHF ₂	Et
5-100	F	CHF ₂	c-Pr
5-101	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-102	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-103	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-104	Cl	SMe	Me
5-105	Cl	SMe	Et
5-106	Cl	SMe	c-Pr
5-107	Cl	S(O)Me	Me
5-108	Cl	S(O)Me	Et
5-109	Cl	S(O)Me	c-Pr
5-110	Cl	SO ₂ Me	Me
5-111	Cl	SO ₂ Me	Et
5-112	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
5-113	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
5-114	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
5-115	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
5-116	Cl	CF ₃	Me
5-117	Cl	CF ₃	Et
5-118	Cl	CF ₃	c-Pr
5-119	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-120	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-121	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-122	Cl	CHF ₂	Me
5-123	Cl	CHF ₂	Et
5-124	Cl	CHF ₂	c-Pr
5-125	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-126	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-127	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-128	Cl	C ₂ F ₅	Me
5-129	Cl	C ₂ F ₅	Et
5-130	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
5-131	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr


Nr.	X	Y	Z
5-132	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
5-133	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
5-134	Cl	Cl	Me
5-135	Cl	Cl	Et
5-136	Cl	Cl	c-Pr
5-137	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
5-138	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
5-139	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
5-140	Cl	Br	Me
5-141	Cl	Br	Et
5-142	Cl	Br	c-Pr
5-143	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
5-144	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
5-145	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
5-146	Cl	I	Me
5-147	Cl	I	Et
5-148	Cl	I	c-Pr
5-149	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
5-150	Cl	I	CH ₂ CF ₃
5-151	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
5-152	Br	SO ₂ Me	Me
5-153	Br	SO ₂ Me	Et
5-154	Br	SO ₂ Me	c-Pr
5-155	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
5-156	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
5-157	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
5-158	Br	CF ₃	Me
5-159	Br	CF ₃	Et
5-160	Br	CF ₃	c-Pr
5-161	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-162	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-163	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-164	Br	CHF ₂	Me
5-165	Br	CHF ₂	Et
5-166	Br	CHF ₂	c-Pr
5-167	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr

Nr.	X	Y	Z
5-168	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-169	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-170	Br	C ₂ F ₅	Me
5-171	Br	C ₂ F ₅	Et
5-172	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
5-173	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
5-174	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
5-175	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
5-176	I	SO ₂ Me	Me
5-177	I	SO ₂ Me	Et
5-178	I	SO ₂ Me	c-Pr
5-179	I	CF ₃	Me
5-180	I	CF ₃	Et
5-181	I	CF ₃	c-Pr
5-182	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-183	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-184	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-185	I	CHF ₂	Me
5-186	I	CHF ₂	Et
5-187	I	CHF ₂	c-Pr
5-188	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-189	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-190	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-191	I	C ₂ F ₅	Me
5-192	I	C ₂ F ₅	Et
5-193	I	C ₂ F ₅	c-Pr
5-194	CH ₂ OMe	CF ₃	Me
5-195	CH ₂ OMe	CF ₃	Et
5-196	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
5-197	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-198	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-199	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-200	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
5-201	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
5-202	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
5-203	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr

Nr.	X	Y	Z
5-204	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-205	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-206	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
5-207	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
5-208	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
5-209	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
5-210	Et	CF ₃	Me
5-211	Et	CF ₃	Et
5-212	Et	CF ₃	c-Pr
5-213	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-214	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-215	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-216	Et	CHF ₂	Me
5-217	Et	CHF ₂	Et
5-218	Et	CHF ₂	c-Pr
5-219	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-220	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-221	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-222	Et	C ₂ F ₅	Me
5-223	Et	C ₂ F ₅	Et
5-224	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
5-225	c-Pr	CF ₃	Me
5-226	c-Pr	CF ₃	Et
5-227	c-Pr	CF ₃	c-Pr
5-228	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-229	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-230	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-231	c-Pr	CHF ₂	Me
5-232	c-Pr	CHF ₂	Et
5-233	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
5-234	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
5-235	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
5-236	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
5-237	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
5-238	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
5-239	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr

Nr.	X	Y	Z
5-240	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
5-241	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
5-242	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
5-243	c-Pr	SO ₂ Me	Me
5-244	c-Pr	SO ₂ Me	Et
5-245	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
5-246	CF ₃	CF ₃	Me
5-247	CF ₃	CF ₃	Et
5-248	CF ₃	CF ₃	c-Pr
5-249	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
5-250	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
5-251	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
5-252	Cl	CF ₃	Acetyl
5-253	Cl	CF ₃	H
5-254	Cl	CF ₃	CH ₂ CN
5-255	Cl	CF ₃	Ph

Tabelle 6: Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin Q für Q^d und R^z für Methyl stehen, und die anderen Substituenten die unten genannten Bedeutungen haben.



5

Nr.	X	Y	Z
6-1	Me	F	Me
6-2	Me	F	Et
6-3	Me	F	c-Pr
6-4	Me	Cl	Me
6-5	Me	Cl	Et
6-6	Me	Cl	c-Pr
6-7	Me	Br	Me
6-8	Me	Br	Et
6-9	Me	Br	c-Pr

Nr.	X	Y	Z
6-10	Me	I	Me
6-11	Me	I	Et
6-12	Me	I	c-Pr
6-13	Me	SMe	Me
6-14	Me	SMe	Et
6-15	Me	SMe	c-Pr
6-16	Me	S(O)Me	Me
6-17	Me	S(O)Me	Et
6-18	Me	S(O)Me	c-Pr
6-19	Me	SO ₂ Me	Me
6-20	Me	SO ₂ Me	Et
6-21	Me	SO ₂ Me	c-Pr
6-22	Me	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
6-23	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
6-24	Me	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
6-25	Me	CF ₃	Me
6-26	Me	CF ₃	Et
6-27	Me	CF ₃	c-Pr
6-28	Me	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-29	Me	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-30	Me	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-31	Me	CHF ₂	Me
6-32	Me	CHF ₂	Et
6-33	Me	CHF ₂	c-Pr
6-34	Me	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-35	Me	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-36	Me	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-37	Me	C ₂ F ₅	Me
6-38	Me	C ₂ F ₅	Et
6-39	Me	C ₂ F ₅	c-Pr
6-40	OMe	Cl	Me
6-41	OMe	Cl	Et
6-42	OMe	Cl	c-Pr
6-43	OMe	CF ₃	Me
6-44	OMe	CF ₃	Et
6-45	OMe	CF ₃	c-Pr

Nr.	X	Y	Z
6-46	OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-47	OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-48	OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-49	OMe	CHF ₂	Me
6-50	OMe	CHF ₂	Et
6-51	OMe	CHF ₂	c-Pr
6-52	OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-53	OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-54	OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-55	SMe	SO ₂ Me	Me
6-56	SMe	SO ₂ Me	Et
6-57	SMe	SO ₂ Me	c-Pr
6-58	SMe	CF ₃	Me
6-59	SMe	CF ₃	Et
6-60	SMe	CF ₃	c-Pr
6-71	SMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-72	SMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-73	SMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-74	SMe	CHF ₂	Me
6-75	SMe	CHF ₂	Et
6-76	SMe	CHF ₂	c-Pr
6-77	SMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-78	SMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-79	SMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-80	SEt	CF ₃	Me
6-81	SEt	CF ₃	Et
6-82	SEt	CF ₃	c-Pr
6-83	SEt	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-84	SEt	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-85	SEt	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-86	SEt	CHF ₂	Me
6-87	SEt	CHF ₂	Et
6-88	SEt	CHF ₂	c-Pr
6-89	SEt	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-90	SEt	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-91	SEt	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
6-92	F	CF ₃	Me
6-93	F	CF ₃	Et
6-94	F	CF ₃	c-Pr
6-95	F	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-96	F	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-97	F	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-98	F	CHF ₂	Me
6-99	F	CHF ₂	Et
6-100	F	CHF ₂	c-Pr
6-101	F	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-102	F	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-103	F	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-104	Cl	SMe	Me
6-105	Cl	SMe	Et
6-106	Cl	SMe	c-Pr
6-107	Cl	S(O)Me	Me
6-108	Cl	S(O)Me	Et
6-109	Cl	S(O)Me	c-Pr
6-110	Cl	SO ₂ Me	Me
6-111	Cl	SO ₂ Me	Et
6-112	Cl	SO ₂ Me	c-Pr
6-113	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
6-114	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
6-115	Cl	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
6-116	Cl	CF ₃	Me
6-117	Cl	CF ₃	Et
6-118	Cl	CF ₃	c-Pr
6-119	Cl	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-120	Cl	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-121	Cl	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-122	Cl	CHF ₂	Me
6-123	Cl	CHF ₂	Et
6-124	Cl	CHF ₂	c-Pr
6-125	Cl	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-126	Cl	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-127	Cl	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
6-128	Cl	C ₂ F ₅	Me
6-129	Cl	C ₂ F ₅	Et
6-130	Cl	C ₂ F ₅	c-Pr
6-131	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
6-132	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
6-133	Cl	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
6-134	Cl	Cl	Me
6-135	Cl	Cl	Et
6-136	Cl	Cl	c-Pr
6-137	Cl	Cl	CH ₂ -c-Pr
6-138	Cl	Cl	CH ₂ CF ₃
6-139	Cl	Cl	CH ₂ CHF ₂
6-140	Cl	Br	Me
6-141	Cl	Br	Et
6-142	Cl	Br	c-Pr
6-143	Cl	Br	CH ₂ -c-Pr
6-144	Cl	Br	CH ₂ CF ₃
6-145	Cl	Br	CH ₂ CHF ₂
6-146	Cl	I	Me
6-147	Cl	I	Et
6-148	Cl	I	c-Pr
6-149	Cl	I	CH ₂ -c-Pr
6-150	Cl	I	CH ₂ CF ₃
6-151	Cl	I	CH ₂ CHF ₂
6-152	Br	SO ₂ Me	Me
6-153	Br	SO ₂ Me	Et
6-154	Br	SO ₂ Me	c-Pr
6-155	Br	SO ₂ Me	CH ₂ -c-Pr
6-156	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CF ₃
6-157	Br	SO ₂ Me	CH ₂ CHF ₂
6-158	Br	CF ₃	Me
6-159	Br	CF ₃	Et
6-160	Br	CF ₃	c-Pr
6-161	Br	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-162	Br	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-163	Br	CF ₃	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
6-164	Br	CHF ₂	Me
6-165	Br	CHF ₂	Et
6-166	Br	CHF ₂	c-Pr
6-167	Br	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-168	Br	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-169	Br	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-170	Br	C ₂ F ₅	Me
6-171	Br	C ₂ F ₅	Et
6-172	Br	C ₂ F ₅	c-Pr
6-173	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
6-174	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
6-175	Br	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
6-176	I	SO ₂ Me	Me
6-177	I	SO ₂ Me	Et
6-178	I	SO ₂ Me	c-Pr
6-179	I	CF ₃	Me
6-180	I	CF ₃	Et
6-181	I	CF ₃	c-Pr
6-182	I	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-183	I	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-184	I	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-185	I	CHF ₂	Me
6-186	I	CHF ₂	Et
6-187	I	CHF ₂	c-Pr
6-188	I	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-189	I	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-190	I	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-191	I	C ₂ F ₅	Me
6-192	I	C ₂ F ₅	Et
6-193	I	C ₂ F ₅	c-Pr
6-194	CH ₂ OMe	CF ₃	Me
6-195	CH ₂ OMe	CF ₃	Et
6-196	CH ₂ OMe	CF ₃	c-Pr
6-197	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-198	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-199	CH ₂ OMe	CF ₃	CH ₂ CHF ₂

Nr.	X	Y	Z
6-200	CH ₂ OMe	CHF ₂	Me
6-201	CH ₂ OMe	CHF ₂	Et
6-202	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pr
6-203	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-204	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-205	CH ₂ OMe	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-206	CH ₂ OMe	CHF ₂	c-Pentyl
6-207	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Me
6-208	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	Et
6-209	CH ₂ OMe	SO ₂ Me	c-Pr
6-210	Et	CF ₃	Me
6-211	Et	CF ₃	Et
6-212	Et	CF ₃	c-Pr
6-213	Et	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-214	Et	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-215	Et	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-216	Et	CHF ₂	Me
6-217	Et	CHF ₂	Et
6-218	Et	CHF ₂	c-Pr
6-219	Et	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-220	Et	CHF ₂	CH ₂ CF ₃
6-221	Et	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-222	Et	C ₂ F ₅	Me
6-223	Et	C ₂ F ₅	Et
6-224	Et	C ₂ F ₅	c-Pr
6-225	c-Pr	CF ₃	Me
6-226	c-Pr	CF ₃	Et
6-227	c-Pr	CF ₃	c-Pr
6-228	c-Pr	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-229	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-230	c-Pr	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-231	c-Pr	CHF ₂	Me
6-232	c-Pr	CHF ₂	Et
6-233	c-Pr	CHF ₂	c-Pr
6-234	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ -c-Pr
6-235	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CF ₃

Nr.	X	Y	Z
6-236	c-Pr	CHF ₂	CH ₂ CHF ₂
6-237	c-Pr	C ₂ F ₅	Me
6-238	c-Pr	C ₂ F ₅	Et
6-239	c-Pr	C ₂ F ₅	c-Pr
6-240	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ -c-Pr
6-241	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CF ₃
6-242	c-Pr	C ₂ F ₅	CH ₂ CHF ₂
6-243	c-Pr	SO ₂ Me	Me
6-244	c-Pr	SO ₂ Me	Et
6-245	c-Pr	SO ₂ Me	c-Pr
6-246	CF ₃	CF ₃	Me
6-247	CF ₃	CF ₃	Et
6-248	CF ₃	CF ₃	c-Pr
6-249	CF ₃	CF ₃	CH ₂ -c-Pr
6-250	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CF ₃
6-251	CF ₃	CF ₃	CH ₂ CHF ₂
6-252	Cl	CF ₃	Acetyl
6-253	Cl	CF ₃	H
6-254	Cl	CF ₃	CH(Me)-c-Pr
6-255	Me	CF ₃	iPr
6-256	Me	CF ₃	cBu
6-257	Cl	Br	CH(Me)-c-Pr
6-258	Me	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
6-259	Cl	CHF ₂	Pr
6-260	Cl	CHF ₂	i-Pr
6-261	Cl	CHF ₂	c-Bu
6-262	Cl	CHF ₂	CH ₂ CH ₂ OMe
6-263	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(tetrahydrofuran-2-yl)
6-264	Cl	CHF ₂	CH ₂ -(thien-2-yl)
6-265	Cl	CHF ₂	CH ₂ C(O)NMe ₂
6-266	Cl	CHF ₂	Ph
6-267	Br	CHF ₂	CH(Me)-c-Pr
6-268	c-Pr	CF ₃	CH(Me)-c-Pr

Zu zahlreichen in obigen Tabellen genannten erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) werden zur weiteren Charakterisierung nachfolgend NMR-Daten offenbart:

- Beisp.-Nr. 1-4: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.63$ (br s, 1H); 8.50 (q, 1H); 7.67 (d, 1H); 7.50 (d, 1H); 3.98 (s, 3H); 2.80 (d, 3H); 2.33 (s, 3H);
- 5 Beisp.-Nr. 1-19: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.82$ (br s, 1H); 8.57 (q, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.27 (s, 3H); 2.78 (d, 3H); 2.35 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-20: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.82$ (br s, 1H); 8.63 (t, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.27 (m, 2H); 3.27 (s, 3H); 2.38 (s, 3H); 1.13 (t, 3H);
- 10 Beisp.-Nr. 1-21: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.81$ (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.27 (s, 3H); 2.78 (m, 1H); 2.35 (s, 3H); 0.69 (m, 2H); 0.62 (m, 1H); 0.51 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 1-25: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.76$ (br s, 1H); 8.51 (q, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.79 (d, 3H); 2.34 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-26: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.76$ (br s, 1H); 8.49 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.28 (m, 2H); 2.36 (s, 3H); 1.11 (t, 3H);
- 15 Beisp.-Nr. 1-27: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.75$ (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.81 (m, 1H); 2.34 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-28: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.78$ (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.13 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 1.01 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);
- 20 Beisp.-Nr. 1-29: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.80$ (br s, 1H); 9.38 (t, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 4.13 (m, 2H); 4.01 (s, 3H); 2.35 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-30: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.79$ (br s, 1H); 9.09 (t, 1H); 7.86 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.13 (tt, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.71 (2H); 2.36 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-31: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.79$ (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.40 (m, 1H); 2.39 (d, 3H); 1.20 (dd, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.44 (m, 2H); 0.29 (m, 2H);
- 25 Beisp.-Nr. 1-32: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.94$ (br s, 1H); 8.81 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.24 (m, 2H); 1.54 (m, 2H); 0.92 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-33: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.77$ (br s, 1H); 8.51 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.08 (m, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.37 (s, 3H); 1.16 (d, 3H); 1.12 (d, 3H);
- 30 Beisp.-Nr. 1-34: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.78$ (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.52-3.31 (m, 4H); 3.27 (s, 3H); 2.36 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-36: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.81$ (br s, 1H); 9.42 (t, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 4.49 (m, 2H); 4.01 (s, 3H); 2.35 (s, 3H);
- 35 Beisp.-Nr. 1-37: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.77$ (br s, 1H); 8.72 (br s, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.97 (m, 1H); 3.77 (m, 1H); 3.63 (m, 1H); 3.35 (m, 1H); 3.27 (m, 1H); 2.36

(s, 3H); 1.92 (m, 1H); 1.83 (m, 2H); 1.60 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 1-41: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.79 (br s, 1H); 9.41 (d, 1H); 7.87 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 4.98 (m, 1H); 4.80 (t, 2H); 4.54 (t, 1H); 4.48 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.36 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-44: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.56 (q, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.00 (t, 1H); 2.80 (d, 3H); 2.33 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-45: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.65 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.30 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.13 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-46: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.68 (br s, 1H); 8.71 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.62 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 3.99 (s, 3H); 2.85 (m, 1H); 2.33 (s, 3H); 0.71 (m, 1H); 0.54 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-47: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.79 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.15 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 1.04 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-49: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.71 (br s, 1H); 9.12 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 6.19 (tt, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.72 (m, 2H); 2.36 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-56: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.66 (br s, 1H); 8.53 (q, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.86 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-57: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.60 (t, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.87 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 1.11 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-58: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.86 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-72: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.53 (br s, 1H); 8.57 (q, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.54 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.85 (s, 3H); 2.81 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-73: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.52 (br s, 1H); 8.65 (t, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.54 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.86 (s, 3H); 3.20 (m, 2H); 1.13 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-74: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.51 (br s, 1H); 8.72 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.52 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 3.98 (s, 3H); 3.85 (s, 3H); 2.85 (m, 1H); 0.71 (m, 2H); 0.54 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-81: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.48 (q, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.05 (s, 3H); 2.80 (d, 3H); 2.43 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-82: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.56 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.06 (s, 3H); 3.32 (m, 2H); 2.44 (s, 3H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-83: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.83 (br s, 1H); 8.64 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.05 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 2.43 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.53 (br s, 2H);

Beisp.-Nr. 1-84: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.83 (br s, 1H); 8.68 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.87 (d, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.16 (m, 2H); 2.45 (s, 3H); 1.02 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-86: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.85 (br s, 1H); 9.10 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 6.11 (tt, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.71 (m, 2H); 2.43 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-87: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 11.76 (br s, 1H); 8.54 (q, 1H); 7.81 (s, 2H); 6.90

(t, 1H); 4.04 (s, 3H); 2.82 (d, 3H); 2.42 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-88: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.76 (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.82 (s, 2H); 6.91 (t, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.33 (m, 2H); 2.43 (s, 3H); 1.16 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-89: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.77 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.81 (br s, 2H);

5 6.90 (t, 1H); 4.05 (s, 3H); 2.85 (m, 1H); 2.41 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.58 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-90: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.77 (br s, 1H); 8.76 (t, 1H); 7.82 (br s, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.18 (m, 2H); 2.44 (s, 3H); 1.06 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.26 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-92: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 9.14 (t, 1H); 7.85 (br s, 2H); 6.92 (t, 1H); 6.18 (tt, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.73 (m, 2H); 2.42 (s, 3H);

10 Beisp.-Nr. 1-123: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.03 (br s, 1H); 8.72 (q, 1); 8.07 (d, 1H); 8.02 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.31 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-125: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.02 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 8.06 (d, 1H); 8.02 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.31 (s, 3H); 2.78 (m, 1H); 0.70 (m, 2H); 0.60 (m, 1H); 0.56 (m, 1H);

15 Beisp.-Nr. 1-129: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.00 (br s, 1H); 8.69 (q, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-130: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.76 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 1.11 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-131: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.82 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.50 (br s, 2H);

20 Beisp.-Nr. 1-132: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.02 (br s, 1H); 8.89 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.15 (m, 2H); 1.00 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.24 (m, 2H)

Beisp.-Nr. 1-133: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.06 (br s, 1H); 9.56 (t, 1H); 8.04 (d, 1H); 7.98 (d, 1H); 4.16 (m, 2H); 4.02 (s, 3H);

25 Beisp.-Nr. 1-134: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.05 (br s, 1H); 9.29 (t, 1H); 8.02 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.72 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-135: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.02 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.44 (m, 1H); 1.20 (m, 3H); 0.90 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.29 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-136: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 8.78 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.22 (m, 2H); 1.53 (m, 2H); 0.92 (t, 3H);

30 Beisp.-Nr. 1-137: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.07 (m, 1H); 4.01 (s, 3H); 1.14 (br s, 6H);

Beisp.-Nr. 1-138: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.00 (br s, 1H); 8.91 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.92 (d, 1); 4.01 (s, 3H); 3.43 (m, 4H); 3.27 (s, 3H);

35 Beisp.-Nr. 1-139: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.02 (br s, 1H); 8.99 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.45 (m, 2H); 2.63 (t, 2H); 2.11 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-140: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.05 (br s, 1H); 9.61 (t, 1H); 8.04 (d, 1H); 7.99

(d, 1H); 4.42 (d, 2H); 4.01 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-141: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.00 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.95 (m, 1H); 3.77 (m, 1H); 3.63 (m, 1H); 3.30 (m, 2H); 1.95 (m, 1H); 1.83 (m, 2H); 1.63 (m, 1H);

5 Beisp.-Nr. 1-142: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.91 (d, 1H); 4.18 (br d, 2H); 4.01 (s, 3H); 3.00 (s, 3H); 2.86 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-143: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.08 (br s, 1H); 10.86 (br s, 1H); 8.04 (m, 2H); 7.65 (d, 2H); 7.38 (m, 2H); 7.15 (t, 1H); 4.02 (s, 3H);

10 Beisp.-Nr. 1-144: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 9.36 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.07 (m, 1H); 6.98 (m, 1H); 4.66 (br s, 2H); 4.01 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-146: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 9.01 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.35 (m, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.25 (m, 2H); 1.98 (m, 2H); 1.70 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-147: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 8.72 (q, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.81 (d, 3H);

15 Beisp.-Nr. 1-148: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 8.78 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.31 (m, 2H); 1.13 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-149: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.92 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.83 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.55 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 1-155: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.09 (m, 1H); 4.01 (s, 3H); 1.16 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 1-156: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 8.92 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.46 (m, 4H); 3.29 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-157: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.95 (br s, 1H); 8.99 (t, 1H); 7.92 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.05 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.49 (m, 2H); 2.67 (m, 2H); 2.12 (s, 3H);

25 Beisp.-Nr. 1-158: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.98 (br s, 1H); 9.59 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.40 (d, 2H); 4.01 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-159: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 8.94 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.97 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.98 (m, 1H); 3.78 (m, 1H); 3.64 (m, 1H); 3.35 (m, 2H); 1.95 (m, 1H); 1.84 (m, 2H); 1.62 (m, 1H);

30 Beisp.-Nr. 1-160: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.95 (br s, 1H); 9.12 (t, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 4.17 (d, 2H); 4.01 (t, 3H); 3.02 (s, 3H); 2.89 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-161: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 10.84 (br s, 1H); 7.99 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.69 (m, 2H); 7.38 (m, 2H); 7.15 (m, 1H); 7.12 (t, 1H); 4.02 (s, 3H);

35 Beisp.-Nr. 1-162: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.95 (br s, 1H); 9.45 (t, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.08 (m, 1H); 6.99 (m, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.68 (d, 2H); 4.00 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-164: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 9.05 (d, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.78

(d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.37 (m, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.26 (m, 2H); 2.01 (m, 2H); 1.72 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-165: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 8.61 (q, 1H); 8.00 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.78 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-166: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 8.67 (t, 1H); 7.99 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.29 (m, 1H); 1.11 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-173: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 8.79 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 2.82 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.52 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-177: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.65 (q, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

10 Beisp.-Nr. 1-178: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.71 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.28 (m, 2H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-179: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 2.81 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.54 (d, 2H);

15 Beisp.-Nr. 1-180: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.80 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.16 (m, 2H); 1.02 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.26 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-181: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 9.49 (t, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 4.14 (m, 2H); 3.99 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-182: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 9.23 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 6.14 (tt, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.70 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 1-183: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.49 (m, 1H); 1.22 (d, 3H); 0.92 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.32 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-184: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.21 (m, 2H); 1.55 (m, 2H); 0.94 (t, 3H);

25 Beisp.-Nr. 1-185: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.61 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.05 (m, 1H); 3.99 (s, 3H); 1.17 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 1-186: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.86 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.47 (m, 2H); 3.41 (m, 2H); 3.28 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-187: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.93 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.44 (m, 2H); 2.66 (m, 2H); 2.12 (s, 3H);

30 Beisp.-Nr. 1-195: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.86 (br s, 1H); 8.58 (q, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.47 (d, 1H); 3.98 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-196: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.85 (br s, 1H); 8.64 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.47 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 3.27 (m, 2H); 1.15 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 1-197: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.86 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.46 (d, 1H); 3.98 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.57 (br s, 2H);

Beisp.-Nr. 1-207: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.67 (q, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92

(d, 1H); 4.03 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-208: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 1.12 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-209: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.00 (br s, 1H); 8.81 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.91 (d, 1H); 4.03 (s, 3H); 2.79 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.57 (m, 1H); 0.48 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 1-210: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.99 (br s, 1H); 8.84 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.91 (d, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.14 (m, 2H); 1.01 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-211: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 9.52 (t, 1H); 8.01 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 4.20 (m, 1H); 4.08 (m, 1H); 4.04 (s, 3H);

10 Beisp.-Nr. 1-212: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.01 (br s, 1H); 9.26 (t, 1H); 7.99 (d, 1H); 7.95 (d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.70 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-225: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.70 (q, 1H); 7.86 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 2.81 (d, 3H);

Beisp.-Nr. 1-226: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.77 (t, 1H); 7.86 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-227: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.92 (br s, 1H); 8.83 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.02 (s, 3H); 2.83 (m, 1H); 0.71 (m, 2H); 0.57 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-228: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.86 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.16 (m, 2H); 1.04 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.26 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 1-229: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.96 (br s, 1H); 9.54 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.14 (m, 2H); 4.03 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-230: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.95 (br s, 1H); 9.28 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 6.18 (tt, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.72 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-271: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.81 (br s, 1H); 8.52 (q, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.79 (d, 3H); 2.72 (m, 2H); 1.17 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-272: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.80 (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.29 (q, 2H); 2.77 (m, 2H); 1.18 (t, 3H); 1.11 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-273: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.78 (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.81 (m, 2H); 2.70 (m, 1H); 1.17 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

30 Beisp.-Nr. 1-274: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.80 (br s, 1H); 8.74 (t, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.19 (m, 1H); 3.08 (m, 1H); 2.80 (m, 2H); 1.20 (t, 3H); 1.02 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-276: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 9.10 (t, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 6.13 (tt, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.77 (m, 1H); 3.63 (m, 1H); 2.77 (m, 2H); 1.17 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 1-277: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.73 (br s, 1H); 8.57 (q, 3H); 7.80 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.89 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.81 (d, 3H); 2.74 (q, 2H); 1.15 (t, 3H);

- Beisp.-Nr. 1-278: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.72$ (br s, 1H); 8.67 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.21 (m, 2H); 2.76 (q, 2H); 1.15 (2x t, 6H)
- Beisp.-Nr. 1-279: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.72$ (br s, 1H); 8.75 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.89 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.86 (m, 1H); 2.75 (m, 2H); 1.15 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);
- 5 Beisp.-Nr. 1-286: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.70$ (br s, 1H); 8.44 (q, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.03 (s, 3H); 2.79 (d, 3H); 2.11 (m, 1H); 0.84 (m, 2H); 0.64 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-287: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.70$ (br s, 1H); 8.51 (t, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 2.14 (m, 1H); 1.13 (t, 3H); 0.84 (m, 2H); 0.66 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-288: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.70$ (br s, 1H); 8.59 (d, 1H); 7.77 (br s, 2H);
- 10 4.03 (s, 3H); 2.79 (m, 1H); 2.11 (m, 1H); 0.85 (m, 2H); 0.70 (m, 2H); 0.66 (m, 2H); 0.51 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-289: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.70$ (br s, 1H); 8.63 (t, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.13 (m, 2H); 2.15 (m, 1H); 1.03 (m, 1H); 0.85 (m, 2H); 0.68 (m, 2H); 0.45 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-291: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.72$ (br s, 1H); 9.03 (t, 1H); 7.80 (br s, 2H);
- 15 6.13 (tt, 1H); 4.04 (s, 3H); 3.69 (m, 2H); 2.13 (m, 1H); 0.87 (m, 2H); 0.64 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-292: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.69$ (br s, 1H); 8.55 (d, 1H); 7.76 (br s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.38 (m, 1H); 2.18 (m, 1H); 1.21 (d, 3H); 0.89 (m, 3H); 0.69 (m, 2H); 0.44 (m, 2H); 0.34 (m, 1H); 0.24 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 1-304: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.64$ (br s, 1H); 8.52 (q, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.66
- 20 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 2.81 (d, 3H); 2.17 (m, 1H); 0.83 (m, 2H); 0.58 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-305: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.62$ (br s, 1H); 8.60 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.31 (m, 2H); 2.19 (m, 1H); 1.14 (t, 3H); 0.83 (m, 2H); 0.60 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 1-306: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.61$ (br s, 1H); 8.67 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 2.84 (m, 1H); 2.16 (m, 1H); 0.83 (m, 2H); 0.70 (m, 2H); 0.57 (m,
- 25 4H);
- Beisp.-Nr. 1-337: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.03$ (br s, 1H); 7.98 (br s, 2H); 4.02 (s, 3H); 3.91 (br s, 1H); 2.07 (br s, 3H);
- Beisp.-Nr. 1-338: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.01$ (br s, 1H); 8.22 (s, 1H); 8.00 (s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 4.03 (s, 3H);
- 30 Beisp.-Nr. 1-339: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.69$ (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.45 (m, 1H); 2.38 (s, 3H); 1.22 (d, 3H); 0.93 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.35 (m, 1H); 0.28 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 1-340: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.93$ (br s, 1H); 8.79 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.03 (s, 3H); 3.45 (m, 1H); 1.23 (d, 3H); 0.92 (m, 1H); 0.44 (m, 2H); 0.38 (m, 1H);
- 35 0.29 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 1-341: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.79$ (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.76

(d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.40 (m, 1H); 2.84 (q, 2H); 2.78 (m, 1H); 1.22 (t, 3H); 1.17 (t, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.29 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-342: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.62 (q, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

5 Beisp.-Nr. 1-343: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.68 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.28 (q, 2H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-344: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 8.74 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.56 (m, 2H);

10 Beisp.-Nr. 1-345: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.67 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.24 (m, 2H); 2.36 (s, 3H); 1.54 (m, 2H); 0.91 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-346: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.57 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.11 (m, 1H); 4.00 (s, 3H); 2.36 (s, 3H); 1.16 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 1-347: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.74 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.62 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.47 (m, 4H); 3.28 (s, 3H); 2.36 (s, 3H);

15 Beisp.-Nr. 1-348: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.81 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.00 (s, 3H); 3.49 (m, 2H); 2.68 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 2.11 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-349: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.65 (q, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.70 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.79 (d, 3H);

20 Beisp.-Nr. 1-350: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.71 (t, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.28 (m, 2H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-351: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 0.72 (m, 2H); 0.55 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 1-352: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.56 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.86 (d, 1H); 4.06 (s, 3H); 3.47 (m, 1H); 2.45 (s, 3H); 1.21 (d, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.41 (m, 2H); 0.33 (m, 2H);

25 Beisp.-Nr. 1-353: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.78 (br s, 1H); 8.65 (d, 1H); 7.82 (br s, 2H); 6.88 (t, 1H); 4.05 (s, 3H); 3.51 (m, 1H); 2.44 (s, 3H); 1.23 (d, 3H); 0.93 (m, 1H); 0.41 (m, 3H); 0.30 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 1-354: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.35 (q, 1H); 7.74 (d, 1H); 7.19 (d, 1H); 3.97 (s, 3H); 3.85 (s, 3H); 2.74 (d, 3H);

30 Beisp.-Nr. 1-355: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.64 (br s, 1H); 8.41 (t, 1H); 7.74 (d, 1H); 7.18 (d, 1H); 3.97 (s, 3H); 3.85 (s, 3H); 3.24 (m, 2H); 1.10 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-356: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.64 (br s, 1H); 8.48 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.18 (d, 1H); 3.97 (s, 3H); 3.85 (s, 3H); 2.79 (m, 1H); 0.68 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

35 Beisp.-Nr. 1-357: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.05 (br s, 1H); 11.93 (br s, 1H); 8.06 (d, 1H); 7.99 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.74 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-358: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.04 (br s, 1); 11.81 (br s, 1H); 8.05 (d, 1H);

7.99 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.97 (m, 2H); 1.23 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-359: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.04 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 8.05 (d, 1H); 7.98 (d, 1H); 4.02 (s, 3H); 3.88 (m, 2H); 1.64 (m, 2H); 0.94 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-360: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.04 (br s, 1H); 11.65 (br s, 1H); 8.04 (d, 1H);

5 7.98 (d, 1H); 4.18 (m, 1H); 4.02 (s, 3H); 1.22 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 1-361: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.98 (br s, 1H); 11.92 (br s, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.04 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.76 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 1-362: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.98 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.02 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.99 (q, 2H); 1.23 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 1-363: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.97 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.02 (t, 1H); 4.01 (s, 3H); 3.90 (t, 2H); 1.64 (m, 2H); 0.94 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 1-364: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.97 (br s, 1H); 11.67 (br s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.21 (m, 1H); 4.01 (s, 3H); 1.23 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 2-19: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 8.57 (q, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 4.36 (q, 2H); 3.27 (s, 3H); 2.78 (d, 3H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

15 Beisp.-Nr. 2-20: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 8.63 (t, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.87 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.27 (m, 2H); 3.27 (s, 3H); 2.37 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.13 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-21: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.87 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.27 (s, 3H); 2.77 (m, 1H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 0.69 (m, 2H); 0.62 (m, 1H);

20 0.51 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 2-25: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.51 (q, 1H) 7.82 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 2.33 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-26: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.60 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.30 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.11 (t, 3H);

25 Beisp.-Nr. 2-27: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.64 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.81 (m, 1H); 2.34 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-28: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.68 (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.13 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.01 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-29: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 9.38 (t, 1H); 7.87 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 4.13 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

30 Beisp.-Nr. 2-30: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.68 (br s, 1H); 9.08 (t, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.14 (tt, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.70 (m, 2H); 2.36 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-31: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.66 (br s, 1H); 0.62 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.40 (m, 1H); 2.39 (d, 3H); 1.48 (t, 3H); 1.20 (dd, 3H); 0.90 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.30 (m, 2H);

35 Beisp.-Nr. 2-32: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.67 (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.76

(d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.21 (m, 2H); 2.36 (s, 3H); 1.51 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 0.91 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-33: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.50 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 4.09 (m, 1H); 2.36 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.16 (d, 3H); 1.12 (d, 3H);

5 Beisp.-Nr. 2-34: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.66 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.52-3.30 (m, 4H); 3.27 (s, 3H); 2.36 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-35: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.78 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.50 (m, 1H); 3.40 (m, 1H); 2.64 (m, 2H); 2.39 (s, 3H); 2.11 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-36: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 9.42 (t, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 4.49 (m, 2H); 4.36 (q, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 2-37: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.67 (br s, 1H); 8.72 (br s, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.96 (m, 1H); 3.77 (m, 1H); 3.62 (m, 1H); 3.37 (m, 1H); 3.27 (m, 1H); 2.36 (s, 3H); 1.94 (m, 1H); 1.82 (m, 2H); 1.60 (m, 1H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-42: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.66 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.37 (m, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.34 (s, 3H); 2.24 (m, 2H); 1.97 (m, 2H); 1.69 (m, 2H); 1.47 (t, 3H);

15 Beisp.-Nr. 2-44: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.56 (q, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 2.81 (d, 3H); 2.33 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-45: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.65 (t, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.31 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.13 (t, 3H);

20 Beisp.-Nr. 2-46: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.71 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 2.85 (m, 1H); 2.33 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-47: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.79 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.16 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.05 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);

25 Beisp.-Nr. 2-49: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.60 (br s, 1H); 9.12 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 6.19 (tt, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.72 (m, 2H); 2.36 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-56: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.56 (br s, 1H); 8.53 (q, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.86 (s, 3H); 2.79 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-57: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.54 (br s, 1H); 8.61 (t, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.88 (s, 3H); 3.28 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.11 (t, 3H);

30 Beisp.-Nr. 2-58: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.54 (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.87 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.87 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-72: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.42 (br s, 1H); 8.58 (q, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.54 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.85 (s, 3H); 2.81 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 2-73: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.42 (br s, 1H); 8.65 (t, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.54 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.86 (s, 3H); 3.30 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.13 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-74: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.40 (br s, 1H); 8.72 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.53

(d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.33 (q, 2H); 3.85 (s, 3H); 2.85 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.55 (m, 2H);
Beisp.-Nr. 2-81: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 8.48 (q, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.86
(d, 1H); 4.43 (q, 2H); 2.80 (d, 3H); 2.43 (s, 3H); 1.48 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-82: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.70 (br s, 1H); 8.56 (t, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.86
5 (d, 1H); 4.43 (q, 2H); 3.30 (m, 2H); 2.44 (s, 3H); 1.48 (t, 3H); 1.13 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 2-83: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.72 (br s, 1H); 8.64 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.86
(d, 1H); 4.43 (q, 2H); 2.80 (m, 1H); 2.43 (s, 3H); 1.48 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.53 (br s, 2H);

Beisp.-Nr. 2-84: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 8.68 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.86
(d, 1H); 4.44 (q, 2H); 3.16 (m, 2H); 2.45 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.02 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.25 (m, 2H);

10 Beisp.-Nr. 2-86: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.73 (br s, 1H); 9.10 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.91
(d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 4.43 (q, 2H); 3.71 (m, 2H); 2.43 (s, 3H); 1.49 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-87: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.55 (q, 1H); 7.81 (s, 2H); 6.91
(t, 1H); 4.43 (q, 2H); 2.83 (d, 3H); 2.42 (s, 3H); 1.49 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-88: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.81 (s, 2H); 6.90
15 (t, 1H); 4.43 (q, 2H); 3.32 (m, 2H); 2.43 (s, 3H); 1.48 (t, 3H); 1.15 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-89: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.80 (br s, 2H);
6.90 (t, 1H); 4.43 (q, 2H); 2.85 (m, 1H); 2.41 (s, 3H); 1.48 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.57 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-90: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.66 (br s, 1H); 8.76 (t, 1H); 7.83 (m, 2H); 6.91
(t, 1H); 4.43 (q, 2H); 3.19 (m, 2H); 2.44 (s, 3H); 1.49 (t, 3H); 1.06 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.26 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 2-92: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.68 (br s, 1H); 9.14 (t, 1H); 7.84 (br s, 2H); 6.92
(t, 1H); 6.18 (tt, 1H); 4.43 (q, 2H); 3.73 (m, 2H); 2.42 (s, 3H); 1.48 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-123: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.92 (br s, 1H); 8.73 (q, 1H); 8.07 (d, 1H); 8.02
(d, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-125: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 8.05 (d, 1H); 8.02
25 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.31 (s, 3H); 2.77 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.69 (m, 2H); 0.58 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-129: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.70 (q, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93
(d, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-130: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.76 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.93
(d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.28 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.12 (t, 3H);

30 Beisp.-Nr. 2-131: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.83 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92
(d, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.80 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.50 (br s, 2H);

Beisp.-Nr. 2-132: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.89 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.93
(d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.15 (m, 3H); 1.47 (t, 3H); 0.46 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-133: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.96 (br s, 1H); 9.56 (t, 1H); 8.03 (d, 1H); 7.98
35 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 4.15 (m, 2H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-134: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 9.29 (t, 1H); 8.01 (d, 1H); 7.96

(d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.71 (m, 2H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-135: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.43 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 1.20 (m, 3H); 0.90 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.30 (m, 2H);

5 Beisp.-Nr. 2-138: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.91 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.45 (m, 4H); 3.27 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-139: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.99 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.45 (m, 2H); 2.63 (t, 2H); 2.11 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 2-141: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.92 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.96 (m, 1H); 3.78 (m, 1H); 3.65 (m, 1H); 3.32 (br s, 2H); 1.93 (m, 1H); 1.83 (m, 2H); 1.62 (m, 1H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-142: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 4.18 (br d, 2H); 3.00 (s, 3H); 2.86 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

15 Beisp.-Nr. 2-143: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.98 (br s, 1H); 10.88 (br s, 1H); 8.06 (d, 1H); 8.02 (d, 1H); 7.65 (d, 2H); 7.38 (t, 2H); 7.16 (t, 1H); 4.38 (q, 2H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-144: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 9.37 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.07 (m, 1H); 6.99 (m, 1H); 4.66 (br s, 2H); 4.37 (q, 2H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-146: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.61 (br s, 1H); 7.74 (d, 1H); 7.71 (d, 1H); 4.62 (m, 1H); 4.57 (q, 2H); 2.46 (m, 2H); 2.19 (m, 2H); 1.82 (m, 2H); 1.62 (t, 3H);

20 Beisp.-Nr. 2-147: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.83 (br s, 1H); 8.72 (q, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.81 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-148: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.79 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.96 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.31 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.13 (t, 3H);

25 Beisp.-Nr. 2-149: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.84 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.55 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-154: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 8.81 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.24 (m, 2H); 1.54 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 0.92 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-155: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.83 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 4.09 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 1.16 (d, 6H);

30 Beisp.-Nr. 2-156: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 8.93 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.47 (m, 4H); 3.29 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-157: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.85 (br s, 1H); 8.99 (t, 1H); 7.92 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.05 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.49 (m, 2H); 2.67 (m, 2H); 2.12 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 2-158: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 9.59 (t, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.37 (m, 4H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-159: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 8.94 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78

(d, 1H); 6.98 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.99 (m, 1H); 3.78 (m, 1H); 3.65 (m, 1H); 3.35 (m, 2H); 1.94 (m, 1H); 1.84 (m, 2H); 1.62 (m, 1H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-160: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 9.12 (t, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 4.17 (d, 2H); 3.02 (s, 3H); 2.89 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

5 Beisp.-Nr. 2-161: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 10.84 (br s, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.69 (m, 2H); 7.38 (m, 2H); 7.16 (m, 1H); 7.12 (t, 1H); 4.38 (q, 2H); 1.48 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-162: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.85 (br s, 1H); 9.45 (t, 1H); 7.92 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.07 (m, 1H); 6.99 (m, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.68 (d, 2H); 4.36 (q, 2H); 1.47 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 2-164: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 9.05 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.37 (m, 3H); 2.25 (m, 2H); 2.01 (m, 2H); 1.71 (m, 2H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-173: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.76 (br s, 1H); 8.79 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.82 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.73 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-177: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 8.65 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 1.46 (t, 3H);

15 Beisp.-Nr. 2-178: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 8.71 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.35 (q, 1H); 3.28 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-179: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.78 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.81 (m, 1H); 1.46 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.54 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 2-180: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 8.80 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.16 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 1.02 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.26 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-181: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.81 (br s, 1H); 9.50 (t, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 4.13 (m, 2H); 1.46 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-182: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 9.23 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.71 (d, 1H); 6.14 (tt, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.70 (m, 2H); 1.46 (t, 3H);

25 Beisp.-Nr. 2-183: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.79 (br s, 1H); 8.67 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.49 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 1.22 (d, 3H); 0.92 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.32 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-184: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.78 (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.22 (m, 2H); 1.56 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 0.94 (t, 3H);

30 Beisp.-Nr. 2-185: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.77 (br s, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 4.06 (m, 1H); 1.46 (t, 3H); 1.17 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 2-186: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.78 (br s, 1H); 8.86 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.48 (m, 2H); 3.41 (m, 2H); 3.28 (s, 3H); 1.46 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 2-187: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.80 (br s, 1H); 8.93 (t, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.44 (m, 2H); 2.67 (m, 2H); 2.09 (s, 3H); 1.46 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 2-195: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.74 (br s, 1H); 8.58 (q, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.46 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 1.45 (t, 3H);

- Beisp.-Nr. 2-196: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.75 (br s, 1H); 8.64 (t, 1H); 7.98 (d, 1H); 7.46 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 3.27 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 1.15 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-197: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.72 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.45 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 2.79 (m, 1H); 1.45 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.57 (br s, 2H);
- 5 Beisp.-Nr. 2-207: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.67 (q, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.91 (d, 1H); 4.39 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 1.48 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-208: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.73 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 4.39 (q, 2H); 3.29 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.12 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-210: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.84 (t, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.90 (d, 1H); 4.40 (q, 2H); 3.14 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.01 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);
- 10 Beisp.-Nr. 2-211: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 9.52 (t, 1H); 8.00 (d, 1H); 7.96 (d, 1H); 4.40 (q, 2H); 4.19 (m, 1H); 4.08 (m, 1H); 1.48 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-212: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 9.26 (t, 1H); 7.99 (d, 2H); 7.94 (d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 4.40 (q, 2H); 3.70 (m, 2H); 1.48 (t, 3H);
- 15 Beisp.-Nr. 2-213: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 8.73 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 4.40 (q, 2H); 3.42 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 1.24 and 1.18 (2x d, 3H); 0.90 (m, 1H); 0.33 (m, 4H);
- Beisp.-Nr. 2-225: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.70 (q, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 2.81 (d, 3H); 1.47 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-226: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.77 (t, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 3.30 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.14 (t, 3H);
- 20 Beisp.-Nr. 2-227: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.81 (br s, 1H); 8.83 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 2.83 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.57 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 2-228: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.82 (br s, 1H); 8.90 t, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 3.16 (t, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.04 (m, 1H); 0.48 (m, 2H); 0.25 (m, 2H);
- 25 Beisp.-Nr. 2-229: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.84 (br s, 1H); 9.54 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 4.14 (m, 2H); 1.48 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-230: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.83 (br s, 1H); 9.28 (t, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 6.18 (tt, 1H); 4.39 (q, 2H); 3.72 (m, 2H); 1.48 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-271: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.53 (q, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 4.36 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 2.69 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.17 (t, 3H);
- 30 Beisp.-Nr. 2-272: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.69 (br s, 1H); 8.62 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.77 (d, 1H); 4.36 (q, 2H); 3.29 (m, 2H); 2.77 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.18 (t, 3H); 1.11 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-273: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.67 (br s, 1H); 8.67 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.80 (m, 2H); 2.70 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 1.17 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);
- 35 Beisp.-Nr. 2-276: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 9.10 (t, 1H); 7.86 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 6.13 (tt, 1H); 4.36 (q, 2H); 3.78 (m, 1H); 3.63 (m, 1H); 2.77 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.17 (t, 3H);

- Beisp.-Nr. 2-277: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.62 (br s, 1H); 8.58 (q, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.81 (d, 3H); 2.74 (q, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.15 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-278: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.61 (br s, 1H); 8.67 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.31 (m, 2H); 2.76 (q, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.15 (2x t, 6H);
- 5 Beisp.-Nr. 2-279: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.60 (br s, 1H); 8.74 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.89 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 2.86 (m, 1H); 2.73 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.15 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 2-286: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.45 (q, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.38 (q, 2H); 2.79 (d, 3H); 2.11 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 0.84 (m, 2H); 0.64 (m, 2H);
- 10 Beisp.-Nr. 2-287: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.51 (t, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.38 (q, 2H); 3.29 (m, 2H); 2.14 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 1.13 (t, 3H); 0.84 (m, 2H); 0.67 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 2-288: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.59 (d, 1H); 7.76 (br s, 2H); 4.37 (q, 2H); 2.79 (m, 1H); 2.12 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 0.85 (m, 2H); 0.70 (m, 2H); 0.66 (m, 2H); 0.51 (br s, 2H);
- 15 Beisp.-Nr. 2-289: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.64 (t, 1H); 7.77 (br s, 2H); 4.38 (q, 2H); 3.13 (m, 2H); 2.15 (m, 1H); 1.49 (t, 3H); 1.03 (m, 1H); 0.86 (m, 2H); 0.68 (m, 2H); 0.45 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 2-291: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.60 (br s, 1H); 9.03 (t, 1H); 7.80 (br s, 2H); 6.13 (tt, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.69 (m, 2H); 2.13 (m, 1H); 1.49 (t, 3H); 0.87 (m, 2H); 0.65 (m, 2H);
- 20 Beisp.-Nr. 2-292: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.55 (d, 1H); 7.76 (br s, 2H); 4.38 (q, 2H); 3.37 (m, 1H); 2.17 (m, 1H); 1.49 (t, 3H); 1.20 (br s, 3H); 0.89 (m, 3H); 0.70 (br s, 2H); 0.45 (m, 2H); 0.24 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 2-304: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.52 (br s, 1H); 8.53 (q, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.81 (d, 3H); 2.16 (m, 1H); 1.49 (t, 3H); 0.83 (m, 2H); 0.58 (m, 2H);
- 25 Beisp.-Nr. 2-305: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.52 (br s, 1H); 8.61 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.66 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 4.38 (q, 2H); 2.32 (q, 2H); 2.19 (m, 1H); 1.49 (t, 3H); 1.14 (3H); 0.83 (m, 2H); 0.61 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 2-306: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.51 (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.85 (m, 1H); 2.16 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 0.83 (m, 2H); 0.71 (m, 2H);
- 30 0.58 (m, 4H);
- Beisp.-Nr. 2-337: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 7.98 (br s, 2H); 4.37 (q, 2H); 3.81 (br s, 1H); 2.07 (br s, 3H); 1.47 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 2-338: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 8.22 (s, 1H); 8.00 (s, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.93 (d, 1); 4.39 (q, 2H); 1.49 (t, 3H);
- 35 Beisp.-Nr. 2-339: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.45 (m, 1H); 2.38 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.22 (d, 3H); 0.93 (m, 1H);

0.45 (m, 2H); 0.35 (m, 1H); 0.27 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 2-340: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.81 (br s, 1H); 8.79 (d, 1H); 7.84 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.39 (q, 2H); 3.45 (m, 1H); 1.48 (s, 3H); 1.23 (d, 3H); 0.93 (m, 1H); 0.44 (m, 2H); 0.38 (m, 1H); 0.29 (m, 1H);

5 Beisp.-Nr. 2-341: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.68 (br s, 1H); 8.67 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.36 (q, 2H); 3.40 (m, 1H); 2.82 (q, 2H); 2.78 (m, 1H); 1.48 (t, 3H); 1.22 (t, 3H); 1.19 (t, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.29 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-342: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.76 (br s, 1H); 8.68 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.62 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.28 (m, 2H); 1.47 (s, 3H); 1.14 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 2-343: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.75 (br s, 1H); 8.74 (d, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.61 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.79 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.56 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-344: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.67 (t, 1H); 7.79(d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.24 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.54 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 0.92 (t, 3H);

15 Beisp.-Nr. 2-345: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.58 (br s, 1H); 8.56 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.34 (q, 2H); 4.11 (m, 1H); 2.36 (s, 3H); 1.47 (t, 3H); 1.16 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 2-346: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.74 (t, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.64 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.47 (m, 4H); 3.28 (s, 3H); 2.35 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-347: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.59 (br s, 1H); 8.81 (t, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.35 (q, 2H); 3.49 (m, 2H); 2.68 (m, 2H); 2.38 (s, 3H); 2.11 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

20 Beisp.-Nr. 2-348: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.77 (br s, 1H); 8.71 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.28 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.14 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-349: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.76 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.71 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 4.37 (q, 2H); 2.80 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.54 (m, 2H);

25 Beisp.-Nr. 2-350: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.71 (br s, 1H); 8.57 (d, 1H); 7.94 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 4.44 (q, 2H); 3.47 (m, 1H); 2.46 (s, 3H); 1.49 (t, 3H); 1.21 (d, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.42 (m, 2H); 0.33 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-351: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 6.89 (t, 1H); 4.44 (q, 2H); 3.51 (m, 1H); 2.45 (s, 3H); 1.49 (t, 3H); 1.23 (d, 3H); 0.93 (m, 1H); 0.30 (m, 2H);

30 Beisp.-Nr. 2-352: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.54 (br s, 1H); 8.35 (q, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.19 (d, 1H); 7.33 (m, 2H); 3.85 (s, 3H); 2.74 (d, 3H); 1.45 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-353: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.53 (br s, 1H); 8.41 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.18 (d, 1H); 4.33 (q, 2H); 3.85 (s, 3H); 3.24 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 1.10 (t, 3H);

35 Beisp.-Nr. 2-354: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.53 (br s, 1H); 8.48 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.18 (d, 1H); 4.33 (q, 2H); 3.85 (s, 3H); 2.80 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 0.69 (m, 2H); 0.48 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 2-357: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 11.93 (br s, 1H); 8.05 (d, 1H);

7.99 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.74 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-358: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.94 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 8.04 (d, 1H); 7.98 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.97 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 1.23 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-359: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 8.04 (d, 1H);

5 7.98 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.88 (m, 2H); 1.64 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 0.94 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-360: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.93 (br s, 1H); 11.65 (br s, 1H); 8.04 (d, 1H); 7.98 (d, 1H); 4.38 (q, 2H); 4.18 (m, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.23 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 2-361: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.92 (br s, 1H); 11.87 (br s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.04 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.76 (s, 3H); 1.47 (t, 3H);

10 Beisp.-Nr. 2-362: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 7.97 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.02 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 3.99 (q, 2H); 1.47 (t, 3H); 1.23 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-363: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 11.81 (br s, 1H); 7.96 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.02 (t, 1H); 4.38 (q, 2H); 3.91 (t, 2H); 1.65 (m, 2H); 1.48 (t, 3H); 0.95 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 2-364: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.87 (br s, 1H); 11.67 (br s, 1H); 7.96 (d, 1H);

15 7.81 (d, 1H); 7.01 (t, 1H); 4.37 (q, 2H); 4.21 (m, 1H); 1.47 (t, 3H); 1.23 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 3-26: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.63 (br s, 1H); 8.59 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.30 (t, 2H); 3.28 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 1.88 (m, 2H); 1.11 (t, 3H); 0.88 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 3-27: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.62 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 4.30 (t, 2H); 2.81 (m, 1H); 2.34 (s, 3H); 1.88 (m, 2H); 0.88 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

20 Beisp.-Nr. 3-125: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.90 (br s, 1H); 8.85 (d, 1H); 8.06 (d, 1H); 8.00 (d, 1H); 4.32 (t, 2H); 3.31 (s, 3H); 2.77 (m, 1H); 1.88 (m, 2H); 0.88 (t, 3H); 0.70 (m, 2H); 0.58 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 3-129: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.88 (br s, 1H); 8.70 (q, 1h); 7.96 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 4.32 (t, 2H); 2.80 (d, 3H); 1.88 (m, 2H); 0.88 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 3-208: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.85 (br s, 1H); 8.73 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 4.34 (t, 2H); 3.29 (m, 2H); 1.89 (m 2H); 1.12 (t, 3H); 0.89 (t, 3H);

25 Beisp.-Nr. 3-273: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.65 (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.81 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 4.30 (t, 2H); 2.81 (m 2H); 2.70 (m, 1H); 1.89 (m, 2H); 1.17 (t, 3H); 0.89 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.49 (m, 2H);

Beisp.-Nr. 3-337: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.91 (br s, 1H); 7.97 (br s, 2H); 4.31 (t, 2H);

30 3.89 (br s, 1H); 2.07 (br s, 3H); 1.89 (m, 2H); 0.88 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 3-338: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.89 (br s, 1H); 8.22 (s, 1H); 8.01 (s, 1H); 7.94 (s, 2H); 4.34 (t, 2H); 1.90 (m, 2H); 0-90 (t, 3H);

Beisp.-Nr. 4-212: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 11.22 (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.91 (s, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 3.77 (s, 3H); 2.80 (m, 2H); 2.71 (m, 1H); 1.17 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.48 (m, 2H);

35 Beisp.-Nr. 5-58: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.45 (br s, 1H); 9.05 (s, 1H); 8.46 (q, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 2.79 (d, 3H); 2.39 (s, 3H);

- Beisp.-Nr. 5-59: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.42$ (br s, 1H); 9.07 (s, 1H); 8.53 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 3.28 (m, 2H); 2.40 (s, 3H); 1.12 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 5-74: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.38$ (br s, 1H); 9.05 (s, 1H); 8.52 (q, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 6.88 (t, 1H); 2.81 (d, 1H); 2.37 (s, 3H);
- 5 Beisp.-Nr. 5-75: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.35$ (br s, 1H); 9.05 (s, 1H); 8.60 (t, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 6.88 (t, 1H); 3.32 (m, 2H); 2.39 (s, 3H); 1.14 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 5-117: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.62$ (br s, 1H); 9.07 (s, 1H); 8.74 (t, 1H); 7.89 (s, 2H); 3.31 (m, 2H); 1.11 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 5-122: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.55$ (br s, 1H); 9.07 (s, 1H); 8.70 (q, 1H); 7.82
10 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 2.80 (d, 3H);
- Beisp.-Nr. 5-123: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.56$ (br s, 1H); 9.06 (s, 1H); 8.77 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 3.29 (m, 2H); 1.13 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 5-253: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.61$ (br s, 1H); 9.07 (s, 1H); 8.19 (s, 1H); 7.96 (s, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.86 (d, 1H);
- 15 Beisp.-Nr. 5-254: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.67$ (br s, 1H); 9.59 (t, 1H); 9.08 (s, 1H); 7.96 (s, 2H); 4.41 (d, 2H);
- Beisp.-Nr. 5-255: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.71$ (br s, 1H); 10.85 (br s, 1H); 9.08 (s, 1H); 7.98 (m, 2H); 7.65 (m, 2H); 7.38 (m, 2H); 7.15 (m, 1H);
- Beisp.-Nr. 6-26: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.18$ (br s, 1H); 8.58 (t, 1H); 7.71 (s, 2H); 3.29
20 (m, 2H); 2.50 (s, 3H); 2.31 (s, 3H); 1.10 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-32: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.11$ (br s, 1H); 8.64 (t, 1H); 7.67 (d, 1H); 7.59 (d, 1); 6.89 (t, 1H); 3.30 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 2.31 (s, 3H); 1.12 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-33: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.10$ (br s, 1H); 8.70 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 7.58 (d, 1H); 6.89 (t, 1H); 2.85 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.28 (s, 3H); 0.70 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);
- 25 Beisp.-Nr. 6-34: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.11$ (br s, 1H); 8.78 (t, 1H); 7.68 (d, 1H); 7.60 (d, 1H); 6.90 (t, 1H); 3.15 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 2.33 (s, 3H); 1.04 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-43: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.19$ (br s, 1H); 8.49 (q, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.61 (d, 1H); 3.80 (s, 3H); 2.77 (d, 3H); 2.49 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-44: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.17$ (br s, 1H); 8.57 (t, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.62
30 (d, 1H); 3.81 (s, 3H); 3.27 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.10 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-45: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.17$ (br s, 1H); 8.64 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.61 (d, 1H); 3.80 (s, 3H); 2.79 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 0.70 (m, 2H); 0.47 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-49: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.01$ (br s, 1H); 8.53 (q, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.49 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 3.79 (s, 3H); 2.79 (d, 3H); 2.49 (s, 3H);
- 35 Beisp.-Nr. 6-50: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.02$ (br s, 1H); 8.61 (t, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.49 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 3.81 (s, 3H); 3.29 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.12 (t, 3H);

- Beisp.-Nr. 6-51: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.02$ (br s, 1H); 8.68 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.48 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 3.79 (s, 3H); 2.84 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 0.70 (m, 2H); 0.53 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-58: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.24$ (br s, 1H); 8.46 (q, 1H); 7.90 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 2.79 (d, 3H); 2.49 (s, 3H); 2.39 (s, 3H);
- 5 Beisp.-Nr. 6-60: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.25$ br s, 1H); 8.61 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 2.79 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.39 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.52 (br s, 1H);
- Beisp.-Nr. 6-74: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.18$ (br s, 1H); 8.52 (q, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.70 (d, 1H); 6.88 (t, 1H); 2.81 (d, 3H); 2.49 (s, 3H); 2.38 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-75: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.16$ (br s, 1H); 8.59 (t, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 6.88 (t, 1H); 3.31 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 2.39 (s, 3H); 1.14 (t, 3H);
- 10 Beisp.-Nr. 6-76: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.17$ (br s, 1H); 8.67 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.69 (d, 1H); 6.88 (t, 1H); 2.84 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.37 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.57 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-116: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.44$ (br s, 1H); 8.67 (q, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.86 (d, 1H); 2.78 (d, 3H); 2.50 (s, 3H);
- 15 Beisp.-Nr. 6-117: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.44$ (br s, 1H); 8.74 (t, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.86 (d, 1H); 3.27 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.11 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-118: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.44$ (br s, 1H); 8.81 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 2.79 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 0.72 (m, 2H); 0.50 (br s, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-120: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.51$ (br s, 1H); 9.54 (t, 1H); 7.93 (s, 2H); 4.14 (m, 2H); 2.52 (s, 3H);
- 20 Beisp.-Nr. 6-124: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.36$ (br s, 1H); 8.83 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 6.93 (t, 1H); 2.83 (m, 1H); 2.48 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.54 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-141: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.31$ (br s, 1H); 8.69 (t, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.57 (d, 1H); 3.27 (m, 2H); 2.48 (s, 3H); 1.13 (t, 3H);
- 25 Beisp.-Nr. 6-143: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.31$ (br s, 1H); 8.79 (t, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.57 (d, 1H); 3.15 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.01 (m, 1H); 0.44 (m, 2H); 0.25 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-144: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.32$ (br s, 1H); 9.48 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 4.12 (m, 2H); 2.49 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-145: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.31$ (br s, 1H); 9.21 (t, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.61 (d, 1H); 6.13 (tt, 1H); 3.69 (m, 2H); 2.49 (s, 3H);
- 30 Beisp.-Nr. 6-159: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.41$ (br s, 1H); 8.72 (t, 1H); 7.92 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 3.28 (m, 2H); 2.50 (s, 3H); 1.11 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-161: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.42$ (br s, 1H); 8.82 (t, 1H); 7.91 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 3.13 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.00 (m, 1H); 0.45 (m, 2H); 0.23 (m, 2H);
- 35 Beisp.-Nr. 6-165: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): $\delta = 12.35$ (br s, 1H); 8.75 (t, 1H); 7.77 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 3.29 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.13 (t, 3H);

- Beisp.-Nr. 6-166: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.36$ (br s, 1H); 8.81 (d, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 2.80 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.56 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-167: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.35$ (br s, 1H); 8.88 (t, 1H); 7.78 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 3.15 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.03 (m, 1H); 0.46 (m, 2H); 0.24 (m, 2H);
- 5 Beisp.-Nr. 6-168: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.38$ (br s, 1H); 9.52 (t, 1H); 7.80 (s, 2H); 6.90 (t, 1H); 4.13 (m, 2H); 2.49 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-169: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.37$ (br s, 1H)M 9.26 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.78 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 6.17 (tt, 1H); 3.71 (m, 2H); 2.49 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-210: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.22$ (br s, 1H); 8.52 (q, 1H); 7.72 (s, 2H); 2.78
10 (d, 3H); 2.66 (m, 2H); 2.46 (s, 3H); 1.13 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-211: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.21$ (br s, 1H); 8.61 (t, 1H); 7.72 (br s, 2H); 3.28 (m, 2H); 2.78 (m, 1H); 2.69 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 1.15 (t, 3H); 1.10 (t, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-212: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.19$ (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.71 (s, 2H); 2.80 (m, 2H); 2.68 (m, 1H); 2.52 (s, 3H); 1.13 (t, 3H); 0.71 (m, 2H); 0.48 (m, 2H);
- 15 Beisp.-Nr. 6-228: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.08$ (br s, 1H); 8.61 (t, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 3.12 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 2.11 (m, 1H); 1.02 (m, 1H); 0.80 (m, 2H); 0.62 (m, 2H); 0.46 (m, 2H); 0.22 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-230: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.11$ (br s, 1H); 9.01 (t, 1H); 7.76 (d, 1H); 7.67 (d, 1H); 6.12 (tt, 1H); 3.68 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 2.10 (m, 1H); 0.83 (m, 2H); 0.59 (m, 2H);
- 20 Beisp.-Nr. 6-231: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.01$ (br s, 1H); 8.51 (q, 1H); 7.63 (d, 1H); 7.60 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 2.81 (d, 3H); 2.49 (s, 3H); 2.13 (m, 1H); 0.79 (m, 2H); 0.51 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-233: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.01$ (br s, 1H); 8.66 (d, 1H); 7.60 (m, 2H); 6.92 (t, 1H); 2.84 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.12 (m, 1H); 0.79 (m, 2H); 0.70 (m, 2H); 0.54 (m, 4H);
- Beisp.-Nr. 6-252: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 11.82$ (br s, 1H); 7.91 (br s, 2H); 4.30 (br s, 1H);
25 2.38 (s, 3H); 1.99 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-253: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.45$ (br s, 1H); 8.20 (s, 1H); 7.98 (s, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.86 (d, 1H); 2.52 (s, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-254: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.44$ (br s, 1H); 8.73 (d, 1H); 7.85 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 3.43 (m, 1H); 1.19 (m, 3H); 0.89 (m, 1H); 0.42 (m, 2H); 0.29 (m, 2H);
- 30 Beisp.-Nr. 6-255: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.19$ (br s, 1H); 8.50 (d, 1H); 7.70 (s, 2H); 4.07 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.31 (s, 3H); 1.15 (d, 3H); 1.11 (d, 3H);
- Beisp.-Nr. 6-256: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.20$ (br s, 1H); 8.84 (d, 1H); 7.71 (s, 2H); 4.36 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.30 (s, 3H); 2.24 (m, 2H); 1.97 (m, 2H); 1.48 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-257: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.31$ (br s, 1H); 8.65 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 7.57
35 (d, 1H); 3.48 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 1.21 (d, 3H); 0.91 (m, 1H); 0.42 (m, 2H); 0.34 (m, 2H);
- Beisp.-Nr. 6-258: $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): $\delta = 12.11$ (br s, 1H); 8.69 (d, 1H); 7.68 (d, 1H); 7.59

(d, 1H); 6.89 (t, 1H); 3.44 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.34 (s, 3H); 1.22 (d, 3H); 0.92 (m, 1H); 0.43 (m, 2H); 0.34 (m, 1H); 0.26 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 6-259: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.38 (br s, 1H); 8.79 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 3.23 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.54 (m, 2H); 0.92 (t, 3H);

5 Beisp.-Nr. 6-260: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.38 (br s, 1H); 8.69 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 6.92 (t, 1H); 4.08 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 1.16 (d, 6H);

Beisp.-Nr. 6-261: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.38 (br s, 1H); 9.03 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 6.91 (t, 1H); 4.36 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.26 (m, 2H); 2.01 (m, 2H); 1.69 (m, 2H);

10 Beisp.-Nr. 6-262: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.38 (br s, 1H); 8.90 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.74 (d, 1H); 6.94 (t, 1H); 3.45 (m, 4H); 3.28 (s, 3H); 2.49 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 6-263: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.35 (br s, 1H); 8.91 (t, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 6.95 (t, 1H); 3.98 (m, 1H); 3.78 (m, 1H); 3.65 (m, 1H); 3.34 (m, 2H); 2.49 (s, 3H); 1.94 (m, 1H); 1.84 (m, 2H); 1.62 (m, 1H);

15 Beisp.-Nr. 6-264: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.38 (br s, 1H); 9.43 (t, 1H); 7.82 (d, 1H); 7.75 (d, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.07 (m, 1H); 6.99 (m, 1H); 6.90 (t, 1H); 4.67 (d, 3H); 2.49 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 6-265: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.39 (br s, 1H); 9.10 (t, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.57 (t, 1H); 4.16 (d, 2H); 3.01 (s, 3H); 2.88 (s, 3H);

Beisp.-Nr. 6-266: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.41 (br s, 1H); 10.83 (br s, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.69 (m, 2H); 7.37 (m, 2H); 7.15 (m, 1H); 7.10 (t, 1H); 2.49 (s, 3H);

20 Beisp.-Nr. 6-267: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.35 (br s, 1H); 8.77 (d, 1H); 7.75 (m, 2H); 6.89 (t, 1H); 3.45 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 1.22 (d, 3H); 0.92 (m, 1H); 0.41 (m, 3H); 0.28 (m, 1H);

Beisp.-Nr. 6-268: ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 12.08 (br s, 1H); 8.53 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.62 (d, 1H); 3.36 (m, 1H); 2.49 (s, 3H); 2.21 (m, 1H); 1.20 (d, 3H); 0.89 (m, 1H); 0.83 (m, 2H); 0.63 (br s, 2H); 0.44 (m, 2H); 0.32 (m, 1H); 0.24 (m, 1H).

25

B. Formulierungsbeispiele

a) Ein Stäubemittel wird erhalten, indem man 10 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze und 90 Gew.-Teile Talkum als Inertstoff mischt und in einer Schlagmühle
30 zerkleinert.

b) Ein in Wasser leicht dispergierbares, benetzbares Pulver wird erhalten, indem man 25
Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze, 64 Gew.-Teile
kaolinhaltigen Quarz als Inertstoff, 10 Gewichtsteile ligninsulfonsaures Kalium und 1 Gew.-Teil
35 oleoylmethyltaurinsaures Natrium als Netz- und Dispergiermittel mischt und in einer Stiftmühle
mahlt.

- 5 c) Ein in Wasser leicht dispergierbares Dispersionskonzentrat wird erhalten, indem man 20 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze mit 6 Gew.-Teilen Alkylphenolpolyglykolether (®Triton X 207), 3 Gew.-Teilen Isotridecanolpolyglykolether (8 EO) und 71 Gew.-Teilen paraffinischem Mineralöl (Siedebereich z.B. ca. 255 bis über 277 C) mischt und in einer Reibkugelmühle auf eine Feinheit von unter 5 Mikron vermahlt.
- 10 d) Ein emulgierbares Konzentrat wird erhalten aus 15 Gew.-Teilen einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze, 75 Gew.-Teilen Cyclohexanon als Lösungsmittel und 10 Gew.-Teilen oxethyliertes Nonylphenol als Emulgator.
- 15 e) Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird erhalten indem man 75 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze, 10 Gew.-Teile ligninsulfonsaures Calcium, 5 Gew.-Teile Natriumlaurylsulfat, 3 Gew.-Teile Polyvinylalkohol und 7 Gew.-Teile Kaolin mischt, auf einer Stiftmühle mahlt und das Pulver in einem Wirbelbett durch Aufsprühen von Wasser als Granulierflüssigkeit granuliert.
- 20 f) Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird auch erhalten, indem man 25 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und/oder deren Salze, 5 Gew.-Teile 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium 2 Gew.-Teile oleoymethyltaurinsaures Natrium, 1 Gew.-Teil Polyvinylalkohol, 25 17 Gew.-Teile Calciumcarbonat und 50 Gew.-Teile Wasser auf einer Kolloidmühle homogenisiert und vorzerkleinert, anschließend auf einer Perlmühle mahlt und die so erhaltene Suspension in einem Sprühturm mittels einer Einstoffdüse zerstäubt und trocknet.

30

C. Biologische Beispiele

Die für die Schadpflanzen verwendeten Abkürzungen bedeuten:

ABUTH	Abutilon theophrasti	ALOMY	Alopecurus myosuroides
AVEFA	Avena fatua	AMARE	Amaranthus retroflexus
35 CYPES	Cyperus esculentus	DIGSA	Digitaria sanguinalis
ECHCG	Echinochloa crus-galli	HORMU	Hordeum murinum
LOLMU	Lolium multiflorum	LOLRI	Lolium rigidum

MATIN	Matricaria inodora	PHBPU	Pharbitis purpurea
POLCO	Polygonum convolvulus	SETVI	Setaria viridis
STEME	Stellaria media	VERPE	Veronica persica
VIOTR	Viola tricolor		

5

1. Herbizide Wirkung gegen Schadpflanzen im Voraufbau

Samen von mono- bzw. dikotylen Unkraut- bzw. Kulturpflanzen werden in Holzfasertöpfen in sandiger Lehmerde ausgelegt und mit Erde abgedeckt. Die in Form von benetzbaren Pulvern (WP) oder als Emulsionskonzentrate (EC) formulierten erfindungsgemäßen Verbindungen werden dann als wäßrige Suspension bzw. Emulsion mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 600 bis 800 l/ha unter Zusatz von 0,2% Netzmittel auf die Oberfläche der Abdeckerde appliziert. Nach der Behandlung werden die Töpfe im Gewächshaus aufgestellt und unter guten Wachstumsbedingungen für die Testpflanzen gehalten. Die visuelle Bonitur der Schäden an den Versuchspflanzen erfolgt nach einer Versuchszeit von 3 Wochen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen (herbizide Wirkung in Prozent (%): 100% Wirkung = Pflanzen sind abgestorben, 0 % Wirkung = wie Kontrollpflanzen). Dabei zeigten zahlreiche erfindungsgemäße Verbindungen eine sehr gute Wirkung gegen eine Vielzahl bedeutender Schadpflanzen. Die nachfolgenden Tabellen zeigen beispielhaft die herbizide Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen im Nachaufbau, wobei die herbizide Wirkung in Prozent angegeben ist.

20

Tabelle 1a : Voraufbauwirkung bei 20g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	80
2-338	20	90
3-338	20	90
2-337	20	100
3-337	20	100
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	100
6-26	20	100
1-208	20	100
2-208	20	100
3-208	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
6-159	20	100
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	100
6-118	20	100
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	100
5-59	20	100
5-58	20	90
5-117	20	100
5-253	20	90
5-75	20	100
5-74	20	80
5-123	20	100
5-122	20	90
1-82	20	100
1-87	20	100
2-87	20	100
1-88	20	100
2-88	20	100
1-209	20	100
2-25	20	100
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	90
2-173	20	90
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	90
6-212	20	80
1-44	20	100
2-44	20	100
1-45	20	80
2-45	20	80
1-46	20	90
2-46	20	100
1-30	20	100
1-31	20	100
2-31	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-28	20	90
2-28	20	100
2-29	20	100
1-304	20	100
2-304	20	100
1-305	20	100
2-305	20	100
1-306	20	100
2-306	20	100
2-177	20	90
1-178	20	90
1-179	20	80
1-132	20	100
2-132	20	100
1-135	20	100
2-135	20	100
6-254	20	100
2-134	20	100
6-120	20	80
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	80
2-195	20	100
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-226	20	80
2-196	20	100
2-57	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	100
2-32	20	100
1-34	20	80
2-34	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
6-255	20	100
2-33	20	100
2-42	20	100
1-146	20	100
1-72	20	100
2-72	20	100
1-73	20	100
2-73	20	100
1-74	20	100
2-74	20	100
1-138	20	100
2-138	20	80
1-137	20	100
1-136	20	90
1-180	20	90
2-180	20	100
6-143	20	100
1-183	20	100
2-183	20	100
1-182	20	100
2-182	20	100
6-145	20	100
1-181	20	90
2-181	20	100
2-36	20	90
1-228	20	100
2-228	20	100
6-167	20	90
1-230	20	90
2-230	20	100
2-286	20	100
1-287	20	100
2-287	20	100
2-288	20	100
1-210	20	100
2-210	20	100
1-212	20	80
2-213	20	100
1-288	20	100
1-289	20	100
2-289	20	100
1-291	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-291	20	100
2-292	20	100
1-271	20	100
2-47	20	100
1-339	20	90
2-339	20	100
6-258	20	100
1-49	20	80
2-49	20	100
1-229	20	90
2-229	20	80
1-340	20	100
6-267	20	90
2-340	20	100
1-47	20	100
1-33	20	90
1-32	20	100
2-154	20	100
6-259	20	90
1-155	20	100
2-155	20	100
6-260	20	90
1-164	20	80
2-164	20	90
6-261	20	80
1-165	20	90
1-166	20	90
2-156	20	100
1-159	20	80
2-161	20	90
2-211	20	100
2-272	20	100
1-161	20	80
2-276	20	100
1-276	20	100
1-211	20	100
1-274	20	100
1-272	20	90
6-211	20	90
1-341	20	100
1-292	20	100
2-341	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-83	20	100
2-83	20	100
1-89	20	90
2-89	20	100
6-161	20	100
6-268	20	100
2-342	20	100
1-344	20	90
1-345	20	100
2-344	20	100
1-346	20	90
2-345	20	90
2-346	20	80
1-195	20	90
2-184	20	100
1-185	20	100
2-185	20	100
1-186	20	100
2-186	20	100
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100
2-351	20	80
2-354	20	90

Tabelle 1b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	90
1-337	80	100
2-337	80	100
3-337	80	100
6-252	80	80
1-123	80	100
2-123	80	100
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
2-125	80	100
3-125	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
6-58	80	100
1-147	80	90
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	100
5-253	80	100
5-75	80	100
5-74	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-4	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	100
6-212	80	90
4-212	80	90
1-44	80	100
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
6-32	80	80
1-46	80	100
2-46	80	100
6-33	80	90
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	100
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	100
1-134	80	90
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	100
6-120	80	100
1-277	80	100
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	80
1-226	80	90
2-226	80	80
6-165	80	100
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	90
6-45	80	90
2-57	80	100
6-43	80	100
1-58	80	80
2-58	80	100
2-56	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	100
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	100
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	100
2-146	80	90
1-143	80	100
5-255	80	100
5-254	80	100
1-146	80	100
2-143	80	100
1-72	80	100
2-72	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
6-50	80	90
1-74	80	100
2-74	80	100
6-51	80	100
1-138	80	100
2-138	80	100
1-137	80	100
1-136	80	100
1-180	80	100
2-180	80	100
6-143	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
6-257	80	100
1-182	80	100
2-182	80	100
6-145	80	100
1-181	80	100
2-181	80	100
6-144	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-36	80	100
2-36	80	100
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	100
1-230	80	100
2-230	80	100
6-169	80	90
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
6-228	80	90
1-291	80	100
2-291	80	100
6-230	80	90
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
6-34	80	100
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	100
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
6-267	80	100
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-154	80	100
6-259	80	100
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	100
1-164	80	80
2-164	80	100
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	100
1-159	80	100
2-159	80	100
1-160	80	80
2-160	80	90
2-161	80	100
6-266	80	80
2-211	80	100
2-272	80	100
1-161	80	90
2-276	80	100
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	100
6-168	80	100
1-272	80	100
6-211	80	100
1-341	80	100
1-292	80	100
2-341	80	100
2-158	80	100
1-83	80	100
2-83	80	100
6-60	80	90
1-89	80	100
2-89	80	100
6-161	80	100
6-268	80	100
1-343	80	100
2-342	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-344	80	100
2-343	80	100
1-345	80	100
2-344	80	100
1-346	80	100
2-345	80	100
1-347	80	100
2-346	80	90
2-347	80	100
1-195	80	100
1-184	80	100
2-184	80	100
1-185	80	100
2-185	80	100
1-186	80	100
2-186	80	100
1-350	80	100
2-348	80	100
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
1-354	80	100
2-352	80	100
1-355	80	100
2-353	80	100
1-356	80	100
2-354	80	100

Tabelle 1c : Vorauflaufwirkung bei 320g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 2a : Vorauflaufwirkung bei 20g/ha gegen ALOMY in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-129	20	90
1-129	20	90
1-208	20	80
2-208	20	80
1-130	20	100
2-130	20	90
1-131	20	80
2-131	20	90
1-149	20	80
2-149	20	80
1-173	20	80
2-173	20	100
1-177	20	80
2-177	20	90
1-178	20	80
2-178	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
1-179	20	80
2-179	20	80
1-132	20	80
1-134	20	80
1-133	20	90
6-120	20	80
2-278	20	80
2-279	20	80
1-197	20	100
2-227	20	80
1-227	20	80
2-196	20	90
2-58	20	90
2-207	20	80
2-32	20	90
1-34	20	80
2-34	20	80
6-255	20	90
2-33	20	90
2-42	20	80
6-256	20	80
1-137	20	90
2-180	20	80
1-182	20	80
2-287	20	80
1-212	20	100
1-32	20	80
2-155	20	80
1-166	20	90
2-276	20	90
1-276	20	90
1-211	20	90
1-274	20	80
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
2-341	20	80
1-83	20	80
2-83	20	90
1-342	20	90
2-342	20	90
1-344	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-343	20	80
1-345	20	80
2-344	20	80
1-195	20	90
1-184	20	90
2-184	20	90
1-185	20	90
2-348	20	90
1-351	20	100

Tabelle 2b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen ALOMY in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
3-129	80	80
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
2-338	80	90
3-338	80	80
2-337	80	90
3-337	80	100
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	80
6-26	80	80
1-208	80	100
2-208	80	90
3-208	80	90
6-159	80	80
1-130	80	100
2-130	80	100
1-81	80	80
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-149	80	90
6-124	80	90
5-117	80	90
5-123	80	80
5-122	80	80
1-82	80	80
1-87	80	90
2-87	80	80
1-88	80	90
2-88	80	90
1-209	80	80
1-4	80	80
1-25	80	90
2-25	80	90
3-27	80	90
1-27	80	90
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	90
2-273	80	90
6-212	80	80
1-44	80	90
2-44	80	80
1-45	80	90
2-45	80	90
1-46	80	90
2-46	80	100
1-30	80	80
2-30	80	100
1-31	80	90
2-31	80	80
1-28	80	90
2-28	80	90
1-29	80	100
2-29	80	80
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	90
1-179	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	90
1-135	80	90
2-135	80	90
6-254	80	90
1-134	80	100
2-134	80	90
1-133	80	90
2-133	80	90
6-120	80	90
1-277	80	90
1-278	80	90
2-278	80	90
1-279	80	80
2-279	80	90
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	90
1-225	80	100
1-226	80	90
2-226	80	90
6-165	80	80
2-196	80	100
1-56	80	90
2-57	80	90
1-58	80	90
2-58	80	100
2-56	80	90
1-57	80	80
1-207	80	100
2-207	80	90
2-271	80	80
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	90
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
6-256	80	90
2-146	80	80
1-146	80	90
1-141	80	90
1-37	80	100
2-37	80	90
2-72	80	80
1-73	80	80
2-73	80	100
1-74	80	90
2-74	80	100
1-138	80	90
2-138	80	90
2-141	80	90
1-137	80	90
1-136	80	90
1-180	80	100
2-180	80	100
1-183	80	90
2-183	80	90
1-182	80	100
2-182	80	80
6-145	80	90
1-181	80	100
2-181	80	80
1-228	80	90
2-228	80	80
1-230	80	90
2-286	80	80
2-287	80	90
2-288	80	90
1-210	80	80
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
1-288	80	90
1-289	80	90
2-289	80	90
1-291	80	80
2-291	80	80
2-292	80	90
1-271	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-47	80	100
6-34	80	80
1-339	80	90
2-339	80	90
6-258	80	90
1-49	80	80
2-49	80	90
1-229	80	90
2-229	80	90
1-340	80	90
6-267	80	80
1-47	80	90
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	80
1-155	80	90
2-155	80	100
6-260	80	90
1-164	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	90
2-156	80	100
2-159	80	80
1-162	80	90
2-211	80	90
2-272	80	90
2-276	80	90
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	90
6-168	80	80
1-272	80	100
6-211	80	90
1-341	80	90
1-292	80	90
2-341	80	90
1-83	80	100
2-83	80	90
1-89	80	90
2-89	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
6-161	80	90
1-342	80	100
1-343	80	100
2-342	80	100
1-344	80	100
2-343	80	90
1-345	80	90
2-344	80	100
1-346	80	90
2-345	80	80
1-347	80	80
2-346	80	80
1-195	80	90
1-184	80	100
2-184	80	100
1-185	80	100
2-185	80	90
1-186	80	90
2-186	80	100
1-349	80	100
1-350	80	100
2-348	80	100
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	90
1-352	80	80
1-86	80	100
2-86	80	90
1-92	80	90
2-92	80	90
1-90	80	80
1-353	80	90
2-351	80	80
1-354	80	80
2-352	80	90
1-355	80	90
2-353	80	90
1-356	80	100
2-354	80	90

Tabelle 2c : Vorauflaufwirkung bei 320g/ha gegen ALOMY in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	90
2-337	320	100
6-117	320	90
1-81	320	100
2-81	320	90
2-82	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 3a : Vorauflaufwirkung bei 20g/ha gegen AMARE in %

5

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	100
2-338	20	90
3-338	20	80
1-337	20	90
2-337	20	90
3-337	20	100
6-252	20	80
1-123	20	80
2-123	20	80
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	100
6-26	20	100
1-208	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-208	20	100
3-208	20	100
6-159	20	100
1-125	20	90
2-125	20	80
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	100
6-118	20	80
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	100
5-59	20	100
5-58	20	100
5-117	20	90
5-253	20	100
5-75	20	100
5-74	20	100
5-123	20	100
5-122	20	80
1-82	20	90
1-87	20	90
2-87	20	100
1-88	20	100
2-88	20	100
1-209	20	100
1-4	20	90
1-25	20	100
2-25	20	100
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	100
6-212	20	90
4-212	20	90
1-44	20	100
2-44	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-45	20	100
2-45	20	100
6-32	20	80
1-46	20	100
2-46	20	100
6-33	20	90
1-30	20	100
2-30	20	100
1-31	20	100
2-31	20	100
1-28	20	100
2-28	20	100
1-29	20	100
2-29	20	100
1-304	20	100
2-304	20	100
1-305	20	100
2-305	20	100
1-306	20	100
2-306	20	90
1-177	20	100
2-177	20	100
1-178	20	100
2-178	20	100
1-179	20	100
2-179	20	100
1-132	20	100
2-132	20	100
1-135	20	100
2-135	20	100
6-254	20	100
1-134	20	100
2-134	20	100
1-133	20	90
2-133	20	90
6-120	20	100
1-277	20	100
2-277	20	100
1-278	20	100
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-195	20	100
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-197	20	100
1-225	20	100
1-226	20	100
2-226	20	100
6-165	20	100
6-166	20	90
2-196	20	100
1-56	20	100
6-45	20	80
6-44	20	80
2-57	20	100
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	100
2-32	20	100
1-34	20	100
2-34	20	90
6-255	20	100
2-33	20	100
2-42	20	100
6-256	20	90
2-146	20	100
5-255	20	90
1-146	20	100
1-141	20	100
1-37	20	100
2-37	20	90
1-72	20	100
2-72	20	100
6-49	20	80
1-73	20	100
2-73	20	100
6-50	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-74	20	100
2-74	20	100
6-51	20	80
1-144	20	90
2-144	20	80
1-138	20	100
2-138	20	100
2-141	20	100
1-137	20	100
1-136	20	100
1-180	20	100
2-180	20	100
6-143	20	100
1-183	20	100
2-183	20	90
1-182	20	100
2-182	20	100
6-145	20	90
1-181	20	100
2-181	20	100
6-144	20	90
1-36	20	100
2-36	20	100
1-228	20	100
2-228	20	100
6-167	20	100
1-230	20	100
2-230	20	100
6-169	20	90
2-286	20	100
1-287	20	100
2-287	20	100
2-288	20	100
1-210	20	100
2-210	20	100
1-212	20	100
2-213	20	100
1-288	20	100
1-289	20	90
2-289	20	100
1-291	20	100
2-291	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
6-230	20	100
2-292	20	100
1-271	20	100
2-47	20	100
6-34	20	100
1-339	20	100
2-339	20	100
6-258	20	100
1-49	20	100
2-49	20	100
1-41	20	90
1-229	20	100
2-229	20	100
1-340	20	100
6-267	20	90
2-340	20	100
1-47	20	100
1-33	20	100
1-32	20	100
2-154	20	100
6-259	20	100
1-155	20	100
2-155	20	100
6-260	20	100
2-164	20	100
6-261	20	100
1-165	20	100
1-166	20	100
1-156	20	100
2-156	20	100
6-262	20	90
1-159	20	100
2-159	20	100
1-162	20	90
2-162	20	90
6-264	20	80
1-160	20	100
2-160	20	100
2-161	20	90
6-266	20	90
2-211	20	100
2-272	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-161	20	100
2-276	20	100
1-276	20	90
1-211	20	100
1-274	20	100
6-168	20	90
1-272	20	100
6-211	20	100
1-341	20	100
1-292	20	100
2-341	20	100
1-158	20	100
2-83	20	100
1-89	20	100
2-89	20	90
6-161	20	100
1-342	20	100
1-343	20	100
2-342	20	90
1-344	20	100
2-343	20	100
1-345	20	100
2-344	20	100
1-346	20	100
2-345	20	100
2-346	20	100
1-195	20	90
1-184	20	100
2-184	20	100
1-185	20	100
2-185	20	100
1-186	20	80
2-186	20	100
1-349	20	100
1-350	20	100
2-348	20	100
1-351	20	100
2-349	20	100
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100

Beispiel-nummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100
2-351	20	100
2-352	20	100
1-355	20	100
2-353	20	100
1-356	20	100
2-354	20	100

Tabelle 3b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen AMARE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	80
1-337	80	100
2-337	80	100
3-337	80	100
6-252	80	90
1-123	80	100
2-123	80	100
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
1-125	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-125	80	100
3-125	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
6-58	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	90
5-253	80	100
5-75	80	100
5-74	80	100
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-4	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-273	80	100
3-273	80	100
6-212	80	90
4-212	80	90
1-44	80	100
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
6-32	80	100
1-46	80	100
2-46	80	100
6-33	80	100
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	100
6-231	80	100
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100
2-306	80	100
6-233	80	80
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	100
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	100
1-134	80	100
2-134	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-133	80	100
2-133	80	100
6-120	80	100
1-277	80	100
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	100
1-226	80	100
2-226	80	100
6-165	80	100
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	100
6-45	80	100
6-44	80	100
2-57	80	100
6-43	80	100
1-58	80	100
2-58	80	100
2-56	80	100
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	100
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	100
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	100
2-146	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-142	80	100
1-143	80	100
5-255	80	100
1-142	80	100
5-254	80	100
1-140	80	100
1-146	80	100
1-141	80	100
1-37	80	100
2-37	80	100
2-143	80	100
1-72	80	100
2-72	80	100
6-49	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
6-50	80	100
1-74	80	100
2-74	80	100
6-51	80	100
2-35	80	90
1-144	80	100
2-144	80	100
1-138	80	100
2-138	80	100
2-141	80	100
1-137	80	100
1-136	80	100
1-180	80	100
2-180	80	100
6-143	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
6-257	80	100
1-182	80	100
2-182	80	100
6-145	80	100
1-181	80	100
2-181	80	100
6-144	80	100
1-36	80	100
2-36	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	100
1-230	80	100
2-230	80	100
6-169	80	100
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
6-228	80	100
1-291	80	100
2-291	80	100
6-230	80	100
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
6-34	80	100
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	100
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
6-267	80	100
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	100
1-164	80	100
2-164	80	100
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	100
1-157	80	100
2-157	80	90
1-159	80	100
2-159	80	100
1-162	80	100
2-162	80	100
6-264	80	100
1-160	80	100
2-160	80	100
6-265	80	80
2-161	80	100
6-266	80	100
2-211	80	100
2-272	80	100
1-161	80	100
2-276	80	100
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	100
6-168	80	100
1-272	80	100
6-211	80	100
1-341	80	100
1-292	80	100
2-341	80	100
1-158	80	100
2-158	80	100
1-83	80	100
2-83	80	100
6-60	80	100
1-89	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-89	80	100
6-76	80	100
6-161	80	100
6-268	80	100
1-342	80	100
1-343	80	100
2-342	80	100
1-344	80	100
2-343	80	100
1-345	80	100
2-344	80	100
1-346	80	100
2-345	80	100
1-347	80	100
2-346	80	100
1-195	80	100
1-184	80	100
2-184	80	100
1-185	80	100
2-185	80	100
1-186	80	100
2-186	80	100
1-349	80	100
1-350	80	100
2-348	80	100
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
1-354	80	100
2-352	80	100
1-355	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-353	80	100
1-356	80	100
2-354	80	100

Tabelle 3c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen AMARE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	90
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

5 Tabelle 4a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
2-129	20	100
1-129	20	100
2-337	20	90
2-26	20	80
3-26	20	80
1-208	20	80
1-130	20	100
2-130	20	90
1-131	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-149	20	80
2-149	20	80
2-27	20	80
2-173	20	90
1-29	20	80
1-177	20	80
2-178	20	90
1-135	20	80
1-134	20	80
2-134	20	80
2-197	20	80
1-225	20	80
1-226	20	80
2-196	20	80
1-207	20	80
2-32	20	90
2-33	20	80
2-42	20	80
2-288	20	80
1-212	20	80
2-291	20	80
1-164	20	100
2-276	20	80
1-211	20	80
1-274	20	80
1-341	20	80
1-343	20	80
1-345	20	80
1-346	20	80
2-345	20	80
1-195	20	80
2-349	20	90
2-92	20	80
2-90	20	80

Tabelle 4b : Voraufbauwirkung bei 80g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	90
3-338	80	90
2-337	80	100
3-337	80	100
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	80
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	90
2-125	80	100
3-125	80	80
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	90
2-81	80	80
2-82	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	90
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	90
5-59	80	80
5-58	80	80
5-117	80	90
5-74	80	80
1-82	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-87	80	90
2-87	80	90
1-88	80	90
2-88	80	90
1-209	80	100
1-4	80	90
1-25	80	90
2-25	80	100
3-27	80	90
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	90
1-44	80	90
2-44	80	90
1-45	80	90
2-45	80	100
1-46	80	100
2-46	80	100
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	90
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	90
1-29	80	90
2-29	80	100
1-306	80	80
1-177	80	100
2-177	80	90
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	80
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	90
1-135	80	100
2-135	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
6-254	80	90
1-134	80	90
2-134	80	90
1-133	80	100
2-133	80	90
6-120	80	90
1-277	80	90
1-278	80	90
2-278	80	90
1-279	80	90
2-279	80	100
2-195	80	80
2-225	80	80
1-197	80	100
2-227	80	90
1-227	80	90
2-197	80	100
1-225	80	80
1-226	80	90
2-226	80	100
2-196	80	100
1-56	80	80
2-57	80	90
1-58	80	80
2-58	80	90
1-57	80	90
1-207	80	90
2-207	80	90
2-32	80	90
2-34	80	90
6-255	80	80
2-33	80	90
2-42	80	90
6-256	80	80
2-73	80	80
2-74	80	80
1-137	80	90
1-136	80	80
1-180	80	80
2-180	80	80
1-183	80	90
2-183	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-182	80	90
2-182	80	90
1-181	80	80
2-181	80	90
1-228	80	90
2-228	80	80
1-230	80	90
2-230	80	80
2-287	80	80
2-288	80	90
1-210	80	90
2-210	80	90
1-212	80	90
2-212	80	90
1-288	80	90
1-289	80	80
2-291	80	80
2-292	80	90
1-271	80	80
2-47	80	80
1-339	80	100
2-339	80	80
2-49	80	80
1-229	80	80
2-229	80	90
1-340	80	80
1-33	80	100
1-155	80	90
2-155	80	90
1-164	80	100
1-166	80	100
2-211	80	80
2-272	80	80
2-276	80	90
1-276	80	90
1-211	80	90
1-274	80	90
6-168	80	80
1-272	80	90
6-211	80	80
1-341	80	90
2-341	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-83	80	80
2-83	80	90
1-89	80	90
2-89	80	90
1-342	80	100
1-343	80	80
2-342	80	90
1-344	80	90
2-343	80	100
1-345	80	90
2-344	80	80
1-346	80	80
2-345	80	80
2-346	80	80
1-195	80	90
2-184	80	90
1-185	80	100
2-185	80	100
2-186	80	80
1-349	80	100
1-350	80	90
2-348	80	100
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	80
1-86	80	100
2-86	80	90
2-92	80	80
2-90	80	90
2-351	80	80
2-352	80	80
2-354	80	90

Tabelle 4c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	90
2-337	320	100
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 5a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen CYPES in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	CYPES
2-129	20	100
1-129	20	90
6-116	20	100
6-253	20	80

Tabelle 5b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen CYPES in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	CYPES
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	90
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	90
3-338	80	90
6-253	80	90

Tabelle 5c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen CYPES in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	CYPES
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	90
6-253	320	100

5 Tabelle 6a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-129	20	80
2-337	20	80
1-26	20	80
1-130	20	90
2-130	20	80
6-124	20	80
5-59	20	80
5-117	20	80
5-123	20	90
5-122	20	80
2-87	20	80
1-88	20	90
2-27	20	90
1-273	20	90
1-31	20	90
2-28	20	80
1-305	20	80
2-305	20	80
1-177	20	80
1-178	20	80
1-132	20	90
1-135	20	80
6-254	20	90
2-134	20	80
1-278	20	90
1-227	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-225	20	90
1-226	20	80
2-226	20	100
2-57	20	90
1-58	20	100
1-57	20	90
2-42	20	90
6-256	20	80
1-137	20	80
1-183	20	90
1-228	20	90
2-287	20	90
2-288	20	90
1-210	20	80
2-210	20	80
1-288	20	80
1-289	20	80
1-271	20	90
1-32	20	80
1-164	20	100
1-166	20	90
1-211	20	90
6-161	20	80
1-345	20	90
2-344	20	90
2-84	20	90
2-350	20	80
1-86	20	90
2-86	20	80
2-90	20	90
1-353	20	90

Tabelle 6b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
3-129	80	80
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-337	80	100
3-337	80	90
1-26	80	100
2-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	80
6-159	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	90
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	90
6-124	80	100
5-59	80	100
5-58	80	90
5-117	80	100
5-75	80	100
5-74	80	90
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	90
1-4	80	90
1-25	80	100
2-25	80	100
1-27	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	80
6-212	80	90
4-212	80	80
1-44	80	90
1-45	80	90
2-45	80	100
6-32	80	90
1-46	80	80
2-46	80	90
6-33	80	100
1-30	80	80
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	90
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	90
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	90
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	90
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	100
1-134	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	100
6-120	80	100
1-277	80	90
2-277	80	90
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	80
2-225	80	90
1-197	80	90
2-227	80	100
1-227	80	90
2-197	80	100
1-225	80	100
1-226	80	100
2-226	80	100
6-165	80	100
6-166	80	80
1-56	80	90
6-45	80	80
6-44	80	100
2-57	80	100
6-43	80	100
1-58	80	100
2-58	80	100
2-56	80	90
1-57	80	90
1-207	80	90
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	90
2-32	80	100
1-34	80	90
2-34	80	90
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	100
1-146	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-141	80	90
1-37	80	80
2-37	80	80
1-72	80	80
2-72	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
1-74	80	100
2-74	80	100
1-144	80	100
2-144	80	80
1-138	80	100
2-138	80	90
2-141	80	80
1-137	80	100
1-136	80	90
1-180	80	100
2-180	80	100
1-183	80	100
2-183	80	90
6-257	80	80
1-182	80	100
2-182	80	100
6-145	80	90
1-181	80	100
2-181	80	100
6-144	80	100
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	100
1-230	80	90
2-230	80	90
6-169	80	90
2-286	80	90
1-287	80	90
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	90
2-213	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
6-228	80	90
1-291	80	90
2-291	80	90
6-230	80	80
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
6-34	80	100
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	100
1-49	80	80
2-49	80	90
1-229	80	80
2-229	80	80
1-340	80	100
6-267	80	80
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	100
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	100
1-164	80	100
2-164	80	80
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	90
1-159	80	90
2-159	80	90
1-162	80	100
2-162	80	80
2-211	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-272	80	100
2-276	80	80
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	100
6-168	80	90
1-272	80	100
6-211	80	100
1-341	80	90
1-292	80	90
2-341	80	100
1-83	80	90
2-83	80	90
6-60	80	80
1-89	80	100
2-89	80	90
6-161	80	100
1-342	80	100
1-343	80	90
2-342	80	80
1-344	80	90
2-343	80	90
1-345	80	100
2-344	80	100
1-346	80	90
2-345	80	90
2-346	80	90
1-195	80	100
1-184	80	100
2-184	80	100
1-185	80	100
2-185	80	90
1-186	80	80
2-186	80	100
1-349	80	90
1-350	80	100
2-348	80	100
1-351	80	100
2-349	80	90
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
2-352	80	80

Tabelle 6c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 7a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen HORMU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
2-337	20	90
2-130	20	90

Tabelle 7b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen HORMU in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
3-129	80	90
2-129	80	90
1-129	80	90
6-116	80	90
2-338	80	80
3-338	80	80
2-337	80	90
3-337	80	100
1-26	80	80
2-26	80	90
3-26	80	80
6-26	80	80
1-208	80	80
2-208	80	90
6-159	80	80
1-130	80	90
2-130	80	100
1-81	80	80
2-81	80	90
2-82	80	80
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90
1-131	80	80
2-131	80	80
1-149	80	90
2-149	80	90
6-124	80	80
5-117	80	80
2-87	80	80
2-88	80	80
1-209	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
1-4	80	80
2-25	80	90
1-27	80	80
2-27	80	90
1-173	80	90
2-173	80	100
1-273	80	80
2-273	80	80
2-46	80	90

Tabelle 7c : Voraufbauwirkung bei 320g/ha gegen HORMU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	90
2-337	320	100
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	90
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

5 Tabelle 8a : Voraufbauwirkung bei 20g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
1-173	20	80
1-164	20	100

Tabelle 8b : Voraufbauwirkung bei 80g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
1-129	80	90
2-337	80	80
1-26	80	80
2-208	80	80
1-130	80	100
2-130	80	100
1-131	80	80
1-149	80	90
2-149	80	90
5-117	80	80
1-82	80	80
1-87	80	80
2-87	80	80
2-88	80	80
1-25	80	80
2-25	80	80
1-27	80	80
2-27	80	80
1-173	80	90
2-173	80	90
1-273	80	80
2-273	80	80
1-45	80	80
2-45	80	80
1-46	80	90
2-46	80	90
1-177	80	90
2-177	80	90
1-178	80	80
2-178	80	80
1-179	80	90
2-179	80	80
1-132	80	80
2-132	80	90
2-135	80	80
1-134	80	80
2-134	80	80
2-133	80	80
2-279	80	80
2-195	80	90
1-197	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LORJ
1-227	80	90
2-197	80	90
1-225	80	80
2-196	80	100
2-32	80	90
1-34	80	80
6-255	80	80
2-33	80	80
2-42	80	80
1-138	80	90
1-137	80	90
1-136	80	90
1-182	80	80
2-182	80	80
1-181	80	80
2-288	80	90
1-212	80	80
2-212	80	90
1-288	80	80
1-289	80	80
1-271	80	100
2-47	80	80
1-339	80	100
2-339	80	80
1-47	80	80
1-33	80	80
1-32	80	90
2-154	80	90
1-155	80	90
2-155	80	80
1-164	80	100
1-165	80	80
1-166	80	80
1-159	80	80
2-276	80	80
1-272	80	80
1-83	80	80
1-343	80	80
2-342	80	80
1-344	80	90
2-343	80	90
1-345	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
1-195	80	80
2-184	80	80
1-185	80	90
1-349	80	90
1-92	80	90

Tabelle 8c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	90
2-338	320	100
2-337	320	90
1-81	320	80
2-81	320	90
2-82	320	90
1-147	320	100
2-147	320	90
1-148	320	90
2-148	320	90

5 Tabelle 9a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen MATIN in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	20	90
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	90
2-337	20	80
1-123	20	80
2-123	20	80
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	90
6-26	20	80
1-208	20	90
2-208	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
3-208	20	100
6-159	20	100
1-125	20	80
2-125	20	80
3-125	20	100
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	90
6-118	20	90
1-149	20	100
2-149	20	90
6-124	20	90
5-59	20	80
5-58	20	90
5-117	20	90
5-75	20	80
5-74	20	80
1-82	20	100
1-87	20	80
2-87	20	90
1-88	20	100
2-88	20	100
1-209	20	80
1-25	20	90
2-25	20	100
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	80
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	100
3-273	20	90
6-212	20	80
4-212	20	80
1-44	20	90
2-44	20	90
1-45	20	100
2-45	20	90
1-46	20	90
2-46	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
6-33	20	80
1-30	20	100
2-30	20	100
1-31	20	100
2-31	20	100
1-28	20	100
2-28	20	100
1-29	20	100
2-29	20	100
1-304	20	90
2-304	20	90
1-305	20	100
2-305	20	100
1-306	20	100
2-306	20	90
1-177	20	90
2-177	20	90
1-178	20	90
2-178	20	90
1-179	20	90
2-179	20	100
1-132	20	100
2-132	20	100
1-135	20	90
2-135	20	90
6-254	20	80
1-134	20	90
2-134	20	90
1-133	20	90
2-133	20	90
6-120	20	90
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	100
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	90
2-195	20	100
2-225	20	80
1-197	20	90
2-227	20	100
1-227	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
2-197	20	80
1-225	20	90
1-226	20	100
2-226	20	90
6-165	20	80
2-196	20	100
1-56	20	90
2-57	20	90
1-58	20	90
2-58	20	100
2-56	20	90
1-57	20	90
1-207	20	90
2-207	20	90
2-271	20	100
6-210	20	80
2-32	20	100
2-34	20	90
2-33	20	100
2-42	20	100
2-146	20	100
2-142	20	80
1-143	20	80
5-255	20	80
1-146	20	100
2-143	20	90
1-72	20	80
2-72	20	100
1-73	20	90
2-73	20	100
1-74	20	100
2-74	20	100
1-144	20	90
1-138	20	90
2-138	20	90
2-141	20	80
1-137	20	100
1-136	20	90
1-180	20	90
2-180	20	100
1-183	20	90
2-183	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
6-257	20	80
1-182	20	90
2-182	20	90
1-181	20	90
2-181	20	90
1-228	20	80
2-228	20	90
1-230	20	90
2-230	20	90
2-286	20	100
1-287	20	100
2-287	20	100
2-288	20	90
1-210	20	100
2-210	20	100
1-212	20	90
2-213	20	100
1-288	20	100
1-289	20	90
2-289	20	90
1-291	20	90
2-291	20	90
2-292	20	90
1-271	20	100
2-47	20	100
2-339	20	100
1-49	20	90
2-49	20	100
1-229	20	100
2-229	20	100
1-340	20	100
6-267	20	90
2-340	20	100
1-47	20	80
1-33	20	100
1-32	20	100
2-154	20	100
6-259	20	90
1-155	20	100
2-155	20	100
6-260	20	100
2-164	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
6-261	20	90
1-165	20	100
1-166	20	100
1-156	20	90
2-156	20	100
2-161	20	80
2-211	20	90
2-272	20	100
1-161	20	90
2-276	20	100
1-276	20	90
1-211	20	90
1-274	20	100
6-168	20	80
1-272	20	90
1-341	20	100
1-292	20	100
2-341	20	100
1-83	20	90
2-83	20	100
1-89	20	90
2-89	20	90
6-161	20	100
1-342	20	80
2-342	20	90
1-344	20	90
2-343	20	80
1-345	20	100
2-344	20	100
1-346	20	90
2-345	20	100
2-346	20	90
1-195	20	90
1-184	20	80
2-184	20	90
1-185	20	100
2-185	20	100
2-186	20	80
2-348	20	90
2-349	20	90
1-84	20	100
2-84	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100
2-351	20	100
1-354	20	80
2-352	20	90
1-355	20	80
2-353	20	90
2-354	20	100

Tabelle 9b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen MATIN in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	90
1-338	80	80
2-338	80	90
3-338	80	90
2-337	80	100
3-337	80	100
1-123	80	100
2-123	80	100
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	90
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
1-125	80	100
2-125	80	100
3-125	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
6-58	80	80
1-147	80	90
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100
5-59	80	90
5-58	80	100
5-117	80	100
5-75	80	100
5-74	80	90
5-122	80	90
1-82	80	100
1-87	80	90
2-87	80	90
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-4	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	100
3-273	80	100
6-212	80	90
4-212	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
4-212	80	90
1-44	80	90
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
6-32	80	90
1-46	80	100
2-46	80	100
6-33	80	90
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	100
6-231	80	80
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	80
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	100
1-134	80	100
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	100
6-120	80	90
1-277	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	100
1-226	80	100
2-226	80	100
6-165	80	100
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	90
6-45	80	90
6-44	80	80
2-57	80	100
6-43	80	80
1-58	80	100
2-58	80	100
2-56	80	100
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	90
2-32	80	100
1-34	80	90
2-34	80	100
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	90
2-146	80	100
2-142	80	100
1-143	80	100
5-255	80	100
1-142	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
1-146	80	100
1-141	80	100
1-37	80	90
2-143	80	100
1-72	80	100
2-72	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
6-50	80	80
1-74	80	100
2-74	80	100
2-35	80	80
1-144	80	90
2-144	80	90
1-138	80	100
2-138	80	100
2-141	80	90
1-137	80	100
1-136	80	100
1-180	80	100
2-180	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
6-257	80	90
1-182	80	100
2-182	80	100
1-181	80	100
2-181	80	100
6-144	80	80
2-36	80	90
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	90
1-230	80	100
2-230	80	100
6-169	80	80
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
6-228	80	80
1-291	80	100
2-291	80	100
6-230	80	80
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
6-34	80	90
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	90
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
6-267	80	100
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	100
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	100
1-164	80	100
2-164	80	100
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	100
1-159	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATN
2-159	80	90
1-162	80	90
2-162	80	90
1-160	80	80
2-160	80	90
2-161	80	90
6-266	80	80
2-211	80	100
2-272	80	100
1-161	80	100
2-276	80	100
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	100
6-168	80	90
1-272	80	100
6-211	80	90
1-341	80	100
1-292	80	100
2-341	80	100
2-158	80	90
1-83	80	100
2-83	80	100
6-60	80	90
1-89	80	100
2-89	80	100
6-76	80	90
6-161	80	100
1-342	80	100
1-343	80	100
2-342	80	100
1-344	80	100
2-343	80	100
1-345	80	100
2-344	80	100
1-346	80	100
2-345	80	100
1-347	80	90
2-346	80	90
1-195	80	100
1-184	80	100
2-184	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-185	80	100
2-185	80	100
1-186	80	90
2-186	80	100
1-349	80	90
1-350	80	90
2-348	80	90
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
1-354	80	80
2-352	80	90
1-355	80	100
2-353	80	100
1-356	80	100
2-354	80	100

Tabelle 9c : Vorauflaufwirkung bei 320g/ha gegen MATIN in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-117	320	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATTN
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 10a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
3-129	20	80
2-26	20	90
2-27	20	80
2-134	20	80
1-277	20	80
2-279	20	80
2-197	20	80
2-196	20	80
1-56	20	80
1-57	20	80
2-33	20	80
2-42	20	80
1-138	20	80
1-137	20	80
2-287	20	80
2-210	20	80
1-212	20	80
2-213	20	80
2-291	20	80
2-292	20	80
1-271	20	80
1-339	20	100
2-154	20	80
2-86	20	80

Tabelle 10b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
3-129	80	90
2-129	80	90
1-129	80	90
3-337	80	90
2-26	80	100
2-131	80	80
2-149	80	80
5-59	80	80
5-117	80	100
1-82	80	80
1-87	80	80
2-87	80	80
1-88	80	90
2-88	80	90
1-209	80	80
1-25	80	90
2-25	80	80
3-27	80	90
1-27	80	100
2-27	80	90
1-173	80	90
2-173	80	90
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	90
1-44	80	80
1-45	80	90
2-45	80	80
1-46	80	80
2-46	80	90
1-30	80	100
2-30	80	80
1-31	80	80
2-31	80	80
2-29	80	80
1-304	80	80
2-304	80	90
1-305	80	90
2-305	80	90
1-306	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
2-306	80	100
1-177	80	80
2-177	80	80
1-178	80	80
2-179	80	80
1-132	80	80
2-132	80	90
1-135	80	80
2-135	80	80
1-134	80	80
2-134	80	90
2-133	80	80
6-120	80	80
1-277	80	90
2-277	80	80
1-278	80	90
2-278	80	90
1-279	80	90
2-279	80	90
2-225	80	90
2-227	80	90
1-227	80	80
2-197	80	90
1-225	80	100
2-226	80	100
2-196	80	90
1-56	80	80
2-57	80	80
1-58	80	90
2-58	80	90
2-56	80	80
1-57	80	80
1-207	80	80
2-207	80	80
2-271	80	100
2-32	80	90
2-34	80	80
6-255	80	90
2-33	80	80
2-42	80	90
6-256	80	80
2-146	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-146	80	80
1-141	80	80
2-37	80	80
2-73	80	80
1-74	80	100
2-74	80	90
1-138	80	90
2-138	80	80
2-141	80	80
1-137	80	90
1-136	80	80
2-180	80	100
1-183	80	90
2-183	80	90
1-182	80	90
2-182	80	90
1-181	80	80
2-181	80	80
1-228	80	90
2-228	80	100
1-230	80	90
2-230	80	80
2-286	80	90
1-287	80	100
2-287	80	80
2-288	80	90
1-210	80	80
2-210	80	90
1-212	80	80
2-212	80	80
2-213	80	90
1-288	80	100
1-289	80	80
2-289	80	80
6-228	80	80
1-291	80	80
2-291	80	90
2-292	80	90
1-271	80	90
2-47	80	90
1-339	80	100
2-339	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
6-258	80	90
2-49	80	80
1-229	80	90
1-340	80	90
2-340	80	80
1-33	80	100
1-32	80	80
2-154	80	100
6-259	80	80
1-155	80	100
2-155	80	100
1-164	80	100
2-164	80	100
1-165	80	100
1-166	80	80
1-156	80	80
2-159	80	90
2-272	80	80
1-161	80	80
2-276	80	90
1-276	80	90
1-211	80	80
1-274	80	90
1-272	80	80
1-341	80	80
1-292	80	80
2-341	80	80
1-89	80	80
2-344	80	90
2-345	80	80
1-184	80	80
2-184	80	90
1-185	80	80
2-185	80	100
1-186	80	80
2-348	80	80
2-84	80	90
1-86	80	80
2-86	80	90
1-92	80	90
2-92	80	90
2-351	80	80

Tabelle 10c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	80
1-338	320	80
2-338	320	80
3-338	320	100
2-337	320	90

Tabelle 11a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen POLCO in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
2-129	20	100
1-337	20	80
3-26	20	80
1-208	20	80
1-125	20	80
5-74	20	80
2-25	20	100
2-27	20	80
2-173	20	90
2-44	20	80
1-45	20	90
2-30	20	80
2-31	20	80
1-278	20	90
2-278	20	80
1-279	20	80
2-279	20	80
1-58	20	80
2-146	20	80
2-72	20	80
2-144	20	80
1-137	20	80
2-183	20	90
1-166	20	100
1-276	20	80
1-274	20	80
1-272	20	80

Tabelle 11b : Vorauflaufwirkung bei 80g/ha gegen POLCO in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
3-129	80	80
2-129	80	100
1-129	80	100
3-338	80	80
1-337	80	80
2-123	80	80
1-26	80	90
2-26	80	80
3-26	80	90
6-26	80	100
1-208	80	90
2-208	80	90
3-208	80	80
6-159	80	80
1-125	80	80
1-131	80	80
2-131	80	90
6-118	80	80
1-149	80	80
2-149	80	100
5-117	80	80
5-74	80	80
5-123	80	80
1-82	80	90
1-87	80	90
1-88	80	80
2-88	80	90
1-25	80	80
2-25	80	100
2-27	80	100
1-173	80	80
2-173	80	100
1-273	80	90
2-44	80	90
1-45	80	90
2-45	80	90
6-32	80	80
1-46	80	80
2-46	80	90
2-30	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
2-31	80	80
2-28	80	90
1-304	80	80
2-304	80	80
1-305	80	80
1-306	80	90
2-306	80	80
1-132	80	80
2-132	80	80
1-277	80	90
2-277	80	90
1-278	80	100
2-278	80	80
1-279	80	90
2-279	80	90
2-195	80	80
2-225	80	90
1-227	80	90
2-197	80	100
1-225	80	90
1-226	80	90
2-226	80	80
6-165	80	80
6-166	80	80
2-196	80	90
1-56	80	90
2-57	80	90
1-58	80	90
2-58	80	80
2-56	80	90
1-207	80	90
2-207	80	90
2-271	80	80
2-32	80	90
2-34	80	90
2-42	80	80
2-146	80	80
1-146	80	80
2-72	80	80
2-73	80	80
1-74	80	80
2-74	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
2-35	80	80
2-144	80	90
1-138	80	90
2-138	80	90
2-141	80	80
1-137	80	100
1-180	80	100
2-180	80	90
1-183	80	80
2-183	80	90
2-182	80	90
6-169	80	100
2-287	80	80
2-288	80	90
1-212	80	80
2-212	80	80
1-288	80	80
1-289	80	80
2-289	80	80
1-291	80	80
2-291	80	80
2-292	80	100
1-271	80	80
2-47	80	80
1-339	80	80
2-339	80	80
6-258	80	80
1-49	80	90
2-49	80	90
1-229	80	80
1-340	80	90
1-47	80	100
1-33	80	90
1-32	80	100
2-154	80	90
6-259	80	90
1-155	80	90
2-155	80	90
2-164	80	90
1-165	80	90
1-166	80	100
2-156	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
2-272	80	80
1-161	80	80
2-276	80	90
1-276	80	90
1-211	80	90
1-274	80	90
1-272	80	90
6-211	80	90
1-341	80	80
1-292	80	90
2-83	80	90
1-89	80	80
2-342	80	80
2-343	80	90
1-345	80	90
2-344	80	90
1-346	80	80
2-345	80	90
1-184	80	80
2-348	80	90
2-350	80	100
1-86	80	80
1-354	80	80
1-355	80	80

Tabelle 11c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen POLCO in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	90
1-338	320	80
2-338	320	90
3-338	320	80
2-337	320	80
2-81	320	100
2-82	320	90
1-147	320	90
2-147	320	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
1-148	320	80
2-148	320	100

Tabelle 12a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen SETVI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
2-129	20	100
2-337	20	90
1-26	20	80
2-26	20	80
1-208	20	100
2-208	20	80
1-130	20	90
2-130	20	90
1-131	20	80
2-131	20	80
1-149	20	90
6-124	20	80
1-82	20	80
1-209	20	90
1-25	20	80
2-25	20	100
1-27	20	100
1-173	20	90
1-273	20	100
2-273	20	80
1-30	20	90
2-30	20	100
1-304	20	90
1-305	20	80
2-177	20	100
1-179	20	80
1-132	20	80
1-134	20	90
2-134	20	80
2-133	20	100
1-279	20	80
2-279	20	80
2-195	20	80
1-197	20	100
2-227	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
2-197	20	90
1-225	20	90
1-226	20	100
2-226	20	80
6-165	20	90
2-196	20	90
1-56	20	90
2-57	20	80
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	90
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	100
2-32	20	100
2-34	20	100
6-255	20	100
2-33	20	80
2-42	20	80
6-256	20	80
1-141	20	90
1-37	20	90
1-74	20	100
2-141	20	90
1-182	20	100
2-182	20	90
6-167	20	80
1-230	20	90
2-286	20	80
1-287	20	90
2-287	20	90
2-288	20	90
1-212	20	80
1-288	20	100
1-340	20	90
1-155	20	80
1-166	20	80
1-272	20	80
1-341	20	80
1-89	20	90
1-346	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-195	20	90
1-349	20	90
1-351	20	100
1-86	20	80
2-92	20	100

Tabelle 12b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen SETVI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
3-129	80	90
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	90
1-337	80	90
2-337	80	100
6-252	80	90
1-26	80	100
2-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
6-58	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	90
5-253	80	80
5-75	80	100
5-74	80	90
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-4	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	100
6-212	80	90
1-44	80	100
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
1-46	80	100
2-46	80	100
6-33	80	100
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-305	80	100
2-305	80	80
1-306	80	100
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	80
1-134	80	100
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	100
6-120	80	100
1-277	80	100
2-277	80	80
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	100
1-226	80	100
2-226	80	100
6-165	80	100
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	100
6-45	80	100
6-44	80	90
2-57	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
6-43	80	90
1-58	80	100
2-58	80	100
2-56	80	100
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	100
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	100
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	100
2-146	80	100
1-146	80	80
1-141	80	100
1-37	80	100
2-37	80	100
1-72	80	100
2-72	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
1-74	80	100
2-74	80	100
1-144	80	80
1-138	80	100
2-138	80	80
2-141	80	100
1-137	80	100
1-136	80	80
1-180	80	90
2-180	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
1-182	80	100
2-182	80	100
6-145	80	100
1-181	80	100
2-181	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
6-144	80	90
1-228	80	100
2-228	80	90
6-167	80	80
1-230	80	100
2-230	80	90
6-169	80	100
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	80
2-289	80	90
6-228	80	80
1-291	80	100
2-291	80	100
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
2-339	80	100
6-258	80	80
1-49	80	80
2-49	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
6-267	80	80
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	100
1-155	80	100
2-155	80	90
6-260	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
2-164	80	80
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	100
1-162	80	80
6-264	80	80
2-211	80	100
2-272	80	100
2-276	80	100
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	100
6-168	80	90
1-272	80	100
6-211	80	100
1-341	80	100
1-292	80	100
2-341	80	90
1-83	80	100
2-83	80	100
1-89	80	100
2-89	80	100
6-76	80	80
6-161	80	100
1-343	80	100
2-342	80	100
1-344	80	100
2-343	80	100
1-345	80	100
2-344	80	80
1-346	80	100
2-345	80	100
1-195	80	100
1-185	80	100
2-185	80	100
1-186	80	80
1-349	80	100
1-350	80	100
2-348	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-351	80	100
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
1-354	80	90
2-352	80	100
1-355	80	90

Tabelle 12c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen SETVI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 13a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	20	90
2-129	20	80
1-129	20	100
6-116	20	90
2-337	20	90
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	80
6-26	20	80
1-208	20	100
2-208	20	100
3-208	20	90
6-159	20	80
2-125	20	80
3-125	20	90
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	100
6-118	20	90
1-149	20	90
2-149	20	100
6-124	20	80
5-59	20	90
5-58	20	100
5-117	20	90
5-75	20	100
5-74	20	90
5-123	20	90
5-122	20	90
1-82	20	100
1-87	20	90
2-87	20	100
1-88	20	100
2-88	20	100
1-25	20	80
2-25	20	90
3-27	20	100
1-27	20	90
2-27	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
1-173	20	80
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	90
6-212	20	80
1-44	20	90
2-44	20	90
1-45	20	90
2-45	20	90
1-46	20	90
2-46	20	90

Tabelle 13b : Voraufaufwirkung bei 80g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	80	100
2-129	80	80
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	90
3-338	80	90
2-337	80	90
3-337	80	100
1-123	80	90
2-123	80	80
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
1-125	80	100
2-125	80	100
3-125	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
1-81	80	100
2-81	80	90
2-82	80	100
6-58	80	90
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	90
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	90
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	90
5-253	80	90
5-75	80	100
5-74	80	100
5-123	80	90
5-122	80	90
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	90
1-4	80	90
1-25	80	90
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	90
3-273	80	100
6-212	80	90
4-212	80	90
1-44	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
2-44	80	100
1-45	80	90
2-45	80	100
6-32	80	90
1-46	80	100
2-46	80	100

Tabelle 13c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	90
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	90
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

5 Tabelle 14a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen VERPE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-337	20	80
1-125	20	80
1-209	20	90
1-4	20	80
1-25	20	80
1-27	20	80
2-27	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
1-178	20	80
2-56	20	80
2-32	20	90
2-34	20	90
2-33	20	80
6-256	20	80
2-37	20	80
1-73	20	80
2-73	20	90
1-183	20	90
2-286	20	80
2-287	20	90
2-292	20	90
1-271	20	90
1-339	20	100
2-339	20	80
6-258	20	90
1-340	20	100
1-32	20	80
2-155	20	80
1-165	20	80
1-166	20	80
2-156	20	80
1-161	20	80
1-274	20	90
1-341	20	80
1-292	20	100
1-158	20	80
2-158	20	80
2-342	20	80
1-344	20	80
1-349	20	90
1-84	20	80
2-84	20	80
1-352	20	90
1-356	20	100
2-354	20	80

Tabelle 14b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen VERPE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
1-129	80	100
1-338	80	90
2-338	80	100
3-338	80	90
1-337	80	90
2-337	80	90
3-337	80	100
1-26	80	80
1-125	80	80
3-125	80	80
1-130	80	80
2-130	80	80
2-81	80	90
1-148	80	80
2-148	80	80
1-149	80	100
2-149	80	80
5-58	80	80
5-75	80	90
5-122	80	100
1-82	80	90
1-87	80	90
2-87	80	90
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-4	80	90
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	90
1-27	80	90
2-27	80	100
2-173	80	80
1-273	80	90
2-273	80	100
3-273	80	100
2-44	80	90
1-45	80	90
2-45	80	90
1-46	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-46	80	90
1-31	80	100
2-28	80	80
1-304	80	100
2-304	80	100
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	90
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	80
1-178	80	80
2-178	80	90
2-179	80	90
1-132	80	100
1-135	80	90
2-135	80	100
6-254	80	100
1-277	80	90
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	90
2-279	80	90
2-225	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	90
1-225	80	80
1-226	80	90
2-226	80	100
2-196	80	80
1-56	80	90
2-57	80	90
1-58	80	100
2-56	80	100
1-57	80	80
1-207	80	100
2-207	80	90
2-271	80	100
2-32	80	100
1-34	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-34	80	90
6-255	80	90
2-33	80	90
2-42	80	90
6-256	80	80
2-146	80	80
2-37	80	80
2-143	80	80
2-72	80	90
1-73	80	100
2-73	80	90
1-74	80	100
2-74	80	90
1-144	80	80
2-144	80	100
1-138	80	90
2-138	80	100
1-137	80	90
1-136	80	90
1-180	80	80
1-183	80	100
2-183	80	90
2-181	80	100
1-36	80	90
1-228	80	90
2-228	80	90
1-230	80	100
2-230	80	100
2-286	80	100
1-287	80	90
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	80
2-213	80	90
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
2-291	80	90
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
1-339	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-339	80	100
6-258	80	100
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	90
1-229	80	100
2-229	80	80
1-340	80	100
6-267	80	90
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	90
1-164	80	90
2-164	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
2-156	80	100
1-159	80	80
2-159	80	80
6-264	80	90
2-160	80	80
2-161	80	80
2-272	80	90
1-161	80	90
2-276	80	80
1-211	80	100
1-274	80	90
1-272	80	90
6-211	80	80
1-341	80	90
1-292	80	100
2-341	80	90
1-158	80	80
2-158	80	90
1-83	80	80
1-89	80	90
2-89	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
6-268	80	90
1-343	80	80
2-342	80	80
1-344	80	90
1-345	80	80
2-344	80	80
1-346	80	80
2-345	80	100
2-346	80	80
1-184	80	90
2-184	80	100
2-186	80	90
1-349	80	90
1-350	80	80
2-348	80	80
1-351	80	90
2-349	80	80
1-84	80	100
2-84	80	80
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	90
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	90
2-90	80	90
1-353	80	100
2-351	80	100
1-355	80	100
1-356	80	100
2-354	80	80

Tabelle 14c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen VERPE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	80
1-338	320	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	90
6-117	320	90
1-81	320	100
2-81	320	90
2-82	320	90
1-147	320	90
2-147	320	90
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 15a : Voraufwirkung bei 20g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
1-337	20	80
2-337	20	90
3-337	20	100
1-26	20	90
2-26	20	100
3-26	20	100
1-208	20	100
2-208	20	100
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	100
6-118	20	90
1-149	20	100
2-149	20	100
5-59	20	100
5-58	20	90
5-117	20	100
5-75	20	100
5-123	20	90
5-122	20	80
1-82	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-87	20	80
2-87	20	90
1-88	20	100
2-88	20	100
1-25	20	80
3-27	20	90
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	80
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	100
2-44	20	100
1-45	20	80
2-45	20	90
1-46	20	90
2-46	20	100
1-30	20	100
2-30	20	100
1-31	20	100
2-31	20	100
1-28	20	100
2-28	20	100
1-29	20	100
2-29	20	100
1-304	20	100
2-304	20	90
1-305	20	100
2-305	20	90
1-306	20	100
2-306	20	100
2-177	20	100
2-178	20	100
1-179	20	100
2-179	20	100
1-132	20	100
2-132	20	100
2-135	20	100
1-134	20	90
2-134	20	100
1-133	20	100
1-277	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-277	20	100
1-278	20	100
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	100
2-195	20	100
2-225	20	80
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-197	20	100
1-226	20	80
2-226	20	100
6-165	20	80
2-196	20	90
1-56	20	100
2-57	20	100
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	80
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	90
2-271	20	100
2-32	20	100
1-34	20	100
2-34	20	100
6-255	20	80
2-33	20	100
2-42	20	100
6-256	20	90
2-146	20	100
1-141	20	80
2-72	20	100
6-49	20	80
1-73	20	100
2-73	20	90
1-74	20	100
2-74	20	100
1-144	20	80
1-138	20	100
2-138	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-137	20	90
1-136	20	90
1-180	20	80
2-180	20	100
1-183	20	100
1-182	20	90
2-182	20	100
1-181	20	100
1-228	20	90
2-228	20	100
6-167	20	90
1-230	20	100
2-230	20	90
2-286	20	90
1-287	20	100
2-287	20	100
2-288	20	100
1-210	20	100
2-210	20	100
1-212	20	100
2-213	20	100
1-288	20	100
1-289	20	100
2-289	20	100
1-291	20	100
2-291	20	100
2-292	20	100
1-271	20	100
2-47	20	80
1-339	20	100
2-339	20	100
2-49	20	90
1-340	20	100
2-340	20	100
1-33	20	100
2-155	20	90
1-165	20	90
1-166	20	100
2-272	20	90
2-276	20	100
1-276	20	80
1-274	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-272	20	90
1-341	20	100
1-292	20	90
2-341	20	90
1-83	20	90
2-89	20	90
2-342	20	90
2-343	20	90
2-344	20	80
1-346	20	80
2-345	20	80
2-346	20	80
1-195	20	100
1-185	20	80
2-185	20	80
1-351	20	100
2-349	20	90
2-84	20	80
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-92	20	90
1-90	20	90
2-90	20	80
1-353	20	100
2-351	20	100
2-352	20	80
2-353	20	90
2-354	20	80

Tabelle 15b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	80
2-338	80	100
3-338	80	90
1-337	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-337	80	100
3-337	80	100
1-123	80	80
2-123	80	80
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	100
6-159	80	100
1-125	80	100
2-125	80	100
3-125	80	100
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	80
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	90
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	100
5-253	80	90
5-75	80	100
5-74	80	100
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-88	80	100
2-88	80	100
1-209	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	90
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	100
3-273	80	100
4-212	80	90
1-44	80	90
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
1-46	80	100
2-46	80	100
6-33	80	100
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	100
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100
2-306	80	100
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	90
1-134	80	100
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	90
6-120	80	90
1-277	80	100
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	100
1-226	80	100
2-226	80	100
6-165	80	90
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	100
6-45	80	90
2-57	80	100
1-58	80	100
2-58	80	100
2-56	80	90
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	90
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	100
6-255	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	90
2-146	80	100
2-142	80	100
5-255	80	100
1-142	80	90
5-254	80	90
1-140	80	90
1-146	80	100
1-141	80	100
1-37	80	100
2-37	80	100
2-143	80	80
1-72	80	100
2-72	80	100
6-49	80	80
1-73	80	100
2-73	80	100
1-74	80	100
2-74	80	100
1-144	80	100
2-144	80	90
1-138	80	100
2-138	80	100
2-141	80	90
1-137	80	100
1-136	80	100
1-180	80	100
2-180	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
1-182	80	100
2-182	80	100
1-181	80	100
2-181	80	80
2-36	80	100
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	100
1-230	80	100
2-230	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
1-291	80	100
2-291	80	100
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	80
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
6-267	80	80
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	80
1-155	80	100
2-155	80	100
2-164	80	100
1-165	80	100
1-166	80	100
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	90
2-159	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-162	80	80
1-160	80	80
2-160	80	100
2-161	80	100
2-211	80	80
2-272	80	100
2-276	80	100
1-276	80	100
1-211	80	100
1-274	80	90
1-272	80	100
6-211	80	80
1-341	80	100
1-292	80	100
2-341	80	100
1-158	80	90
2-158	80	100
1-83	80	100
2-83	80	100
1-89	80	100
2-89	80	100
6-161	80	80
1-343	80	100
2-342	80	100
1-344	80	100
2-343	80	100
1-345	80	100
2-344	80	100
1-346	80	100
2-345	80	100
1-347	80	80
2-346	80	80
1-195	80	100
1-184	80	90
2-184	80	100
1-185	80	100
2-185	80	100
2-186	80	90
1-349	80	100
1-350	80	100
2-348	80	100
1-351	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-349	80	100
1-84	80	100
2-84	80	100
1-352	80	100
2-350	80	100
1-86	80	100
2-86	80	100
1-92	80	100
2-92	80	100
1-90	80	100
2-90	80	100
1-353	80	100
2-351	80	100
2-352	80	80
1-355	80	100
2-353	80	100
1-356	80	100
2-354	80	100

Tabelle 15c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	320	100
2-129	320	100
1-129	320	100
6-116	320	100
1-338	320	100
2-338	320	100
3-338	320	100
6-253	320	100
2-337	320	100
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	90
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

Tabelle 16a : Vorauflaufwirkung bei 20g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-337	20	90
3-337	20	90
2-123	20	80
1-26	20	100
2-26	20	100
6-26	20	100
1-208	20	100
2-208	20	90
6-159	20	90
1-130	20	100
2-130	20	100
1-131	20	100
2-131	20	90
6-118	20	90
1-149	20	100
2-149	20	90
5-59	20	100
5-58	20	90
5-117	20	100
5-253	20	80
5-75	20	100
5-74	20	90
5-123	20	100
5-122	20	100
1-82	20	100
1-87	20	100
2-87	20	100
1-88	20	100
2-88	20	100
1-209	20	100
1-25	20	90
2-25	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	100
3-273	20	90
6-212	20	100
4-212	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
4-212	20	80
1-44	20	90
2-44	20	100
1-45	20	100
2-45	20	90
6-32	20	90
1-46	20	90
2-46	20	100
6-33	20	80
1-30	20	100
2-30	20	100
1-31	20	100
2-31	20	100
1-28	20	100
2-28	20	100
1-29	20	100
2-29	20	90
1-304	20	100
2-304	20	90
6-231	20	80
1-305	20	100
2-305	20	100
1-306	20	100
2-306	20	100
1-177	20	100
2-177	20	100
1-178	20	100
2-178	20	100
6-141	20	90
1-179	20	100
2-179	20	100
1-132	20	100
2-132	20	80
1-135	20	90
2-135	20	100
6-254	20	90
1-134	20	90
2-134	20	80
1-133	20	90
1-277	20	100
2-277	20	90
1-278	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	90
2-195	20	90
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	90
1-227	20	100
2-197	20	100
6-165	20	90
6-166	20	80
2-196	20	90
6-45	20	90
2-57	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	90
2-271	20	100
6-210	20	100
2-32	20	100
1-34	20	100
2-34	20	100
6-255	20	100
2-33	20	100
2-42	20	100
6-256	20	90
1-146	20	100
1-141	20	90
1-37	20	80
1-72	20	90
2-72	20	100
1-73	20	90
2-73	20	90
1-74	20	100
2-74	20	100
1-144	20	90
1-138	20	100
2-138	20	100
1-137	20	100
1-136	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-180	20	100
2-180	20	100
1-183	20	100
2-183	20	90
1-182	20	100
2-182	20	100
6-145	20	90
1-181	20	100
6-144	20	90
1-228	20	100
2-228	20	100
1-230	20	90
2-230	20	100
2-286	20	100
1-287	20	100
2-287	20	100
2-288	20	100
1-210	20	100
2-210	20	100
1-212	20	100
2-213	20	80
1-288	20	100
1-289	20	100
2-289	20	100
6-228	20	90
1-291	20	100
2-291	20	100
2-292	20	100
1-271	20	100
2-47	20	100
6-34	20	100
1-339	20	100
2-339	20	100
6-258	20	100
1-49	20	90
2-49	20	100
1-229	20	100
1-340	20	100
2-340	20	100
1-47	20	100
1-33	20	100
1-32	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-154	20	100
6-259	20	100
1-155	20	100
2-155	20	100
6-260	20	100
6-261	20	80
1-165	20	100
1-156	20	100
2-156	20	100
6-262	20	100

Tabelle 16b : Voraufwirkung bei 80g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-337	80	100
2-337	80	100
3-337	80	100
6-252	80	90
1-123	80	90
2-123	80	90
1-26	80	100
2-26	80	100
3-26	80	100
6-26	80	100
1-208	80	100
2-208	80	100
3-208	80	80
6-159	80	100
1-125	80	90
3-125	80	80
1-130	80	100
2-130	80	100
6-117	80	100
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	100
6-58	80	100
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-131	80	100
2-131	80	100
6-118	80	100
1-149	80	100
2-149	80	100
6-124	80	100
5-59	80	100
5-58	80	100
5-117	80	100
5-253	80	90
5-75	80	100
5-74	80	100
5-123	80	100
5-122	80	100
1-82	80	100
1-87	80	100
2-87	80	100
1-88	80	100
2-88	80	100
6-75	80	80
1-209	80	100
1-4	80	100
1-25	80	100
2-25	80	100
3-27	80	100
1-27	80	100
2-27	80	100
1-173	80	100
2-173	80	100
1-273	80	100
2-273	80	100
3-273	80	100
6-212	80	100
4-212	80	90
4-212	80	90
1-44	80	100
2-44	80	100
1-45	80	100
2-45	80	100
6-32	80	100
1-46	80	100
2-46	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
6-33	80	100
1-30	80	100
2-30	80	100
1-31	80	100
2-31	80	100
1-28	80	100
2-28	80	100
1-29	80	100
2-29	80	100
1-304	80	100
2-304	80	100
6-231	80	90
1-305	80	100
2-305	80	100
1-306	80	100
2-306	80	100
6-233	80	90
1-177	80	100
2-177	80	100
1-178	80	100
2-178	80	100
6-141	80	100
1-179	80	100
2-179	80	100
1-132	80	100
2-132	80	100
1-135	80	100
2-135	80	100
6-254	80	100
1-134	80	100
2-134	80	100
1-133	80	100
2-133	80	90
6-120	80	90
1-277	80	100
2-277	80	100
1-278	80	100
2-278	80	100
1-279	80	100
2-279	80	100
2-195	80	100
2-225	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-197	80	100
2-227	80	100
1-227	80	100
2-197	80	100
1-225	80	90
1-226	80	90
6-165	80	100
6-166	80	100
2-196	80	100
1-56	80	80
6-45	80	100
2-57	80	100
6-43	80	100
1-58	80	80
2-58	80	100
2-56	80	100
1-57	80	100
1-207	80	100
2-207	80	100
2-271	80	100
6-210	80	100
2-32	80	100
1-34	80	100
2-34	80	100
6-255	80	100
2-33	80	100
2-42	80	100
6-256	80	100
2-146	80	100
1-143	80	80
1-146	80	100
1-141	80	100
1-37	80	100
2-37	80	100
1-72	80	100
2-72	80	100
1-73	80	100
2-73	80	100
6-50	80	100
1-74	80	100
2-74	80	100
6-51	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-144	80	90
2-144	80	100
1-138	80	100
2-138	80	100
2-141	80	90
1-137	80	100
1-136	80	100
1-180	80	100
2-180	80	100
6-143	80	100
1-183	80	100
2-183	80	100
6-257	80	100
1-182	80	100
2-182	80	100
6-145	80	100
1-181	80	100
2-181	80	100
6-144	80	100
2-36	80	90
1-228	80	100
2-228	80	100
6-167	80	90
1-230	80	100
2-230	80	100
6-169	80	90
2-286	80	100
1-287	80	100
2-287	80	100
2-288	80	100
1-210	80	100
2-210	80	100
1-212	80	100
2-212	80	100
2-213	80	100
1-288	80	100
1-289	80	100
2-289	80	100
6-228	80	100
1-291	80	100
2-291	80	100
6-230	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-292	80	100
1-271	80	100
2-47	80	100
6-34	80	100
1-339	80	100
2-339	80	100
6-258	80	100
1-49	80	100
2-49	80	100
1-41	80	100
1-229	80	100
2-229	80	100
1-340	80	100
2-340	80	100
1-47	80	100
1-33	80	100
1-32	80	100
2-154	80	100
6-259	80	100
1-155	80	100
2-155	80	100
6-260	80	100
1-164	80	80
2-164	80	100
6-261	80	100
1-165	80	100
1-166	80	90
1-156	80	100
2-156	80	100
6-262	80	100

Tabelle 16c : Voraufwirkung bei 320g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-337	320	100
6-252	320	90
6-117	320	100
1-81	320	100
2-81	320	100
2-82	320	100
6-58	320	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-147	320	100
2-147	320	100
1-148	320	100
2-148	320	100

2. Herbizide Wirkung gegen Schadpflanzen im Nachauflauf

Samen von mono- bzw. dikotylen Unkraut- bzw. Kulturpflanzen werden in Holzfasertöpfen in sandigem
 5 Lehmboden ausgelegt, mit Erde abgedeckt und im Gewächshaus unter guten Wachstumsbedingungen
 angezogen. 2 bis 3 Wochen nach der Aussaat werden die Versuchspflanzen im Einblattstadium
 behandelt. Die in Form von benetzbaren Pulvern (WP) oder als Emulsionskonzentrate (EC) formulierten
 erfindungsgemäßen Verbindungen werden dann als wäßrige Suspension bzw. Emulsion mit einer
 Wasseraufwandmenge von umgerechnet 600 bis 800 l/ha unter Zusatz von 0,2% Netzmittel auf die
 10 grünen Pflanzenteile gesprüht. Nach ca. 3 Wochen Standzeit der Versuchspflanzen im Gewächshaus
 unter optimalen Wachstumsbedingungen wird die Wirkung der Präparate visuell im Vergleich zu
 unbehandelten Kontrollen bonitiert (herbizide Wirkung in Prozent (%): 100% Wirkung = Pflanzen sind
 abgestorben, 0 % Wirkung = wie Kontrollpflanzen). Dabei zeigten zahlreiche erfindungsgemäße
 15 Verbindungen eine sehr gute Wirkung gegen eine Vielzahl bedeutender Schadpflanzen. Die
 nachfolgenden Tabellen zeigen beispielhaft die herbizide Wirkung der erfindungsgemäßen
 Verbindungen im Nachauflauf, wobei die herbizide Wirkung in Prozent angegeben ist.

Tabelle 17a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	5	100
2-129	5	100
1-129	5	100
6-116	5	90
1-338	5	90
2-338	5	100
3-338	5	90
6-253	5	100
3-337	5	80
1-26	5	90
2-26	5	100
3-26	5	80
6-26	5	90
1-208	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-208	5	90
3-208	5	90
6-159	5	90
1-130	5	90
2-130	5	90
1-131	5	90
6-118	5	80
1-149	5	80
2-149	5	80
6-124	5	80
5-59	5	90
5-58	5	90
5-117	5	80
5-253	5	90
5-75	5	90
5-74	5	90
5-123	5	90
5-122	5	80
1-82	5	90
1-87	5	90
2-87	5	90
1-88	5	90
2-88	5	90
1-209	5	90
1-4	5	90
1-25	5	100
2-25	5	100
1-27	5	100
2-27	5	100
2-173	5	90
1-273	5	90
2-273	5	90
3-273	5	80
6-212	5	80
1-44	5	90
2-44	5	80
1-45	5	80
2-45	5	80
6-32	5	80
1-46	5	90
2-46	5	80
1-30	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-30	5	80
1-31	5	80
1-28	5	80
2-28	5	80
1-304	5	90
2-304	5	90
1-305	5	90
2-305	5	80
1-306	5	80
1-177	5	90
2-177	5	80
1-178	5	80
2-178	5	90
1-277	5	90
2-277	5	80
1-278	5	80
2-278	5	80
1-279	5	80
2-195	5	100
2-225	5	100
2-227	5	100
1-227	5	100
1-225	5	80
1-226	5	90
1-56	5	80
6-45	5	80
2-57	5	90
1-58	5	90
2-58	5	100
2-56	5	100
1-57	5	90
1-207	5	80
2-271	5	100
2-32	5	90
1-34	5	90
2-34	5	90
6-255	5	90
2-33	5	90
2-42	5	80
6-256	5	80
1-72	5	80
2-72	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-73	5	80
2-73	5	80
1-74	5	80
2-74	5	80
2-286	5	90
1-287	5	90
2-287	5	80
2-288	5	80
1-210	5	80
2-210	5	80
1-288	5	80
1-289	5	80
1-291	5	80
2-291	5	80
1-271	5	80
2-47	5	90
2-47	5	80
6-34	5	80
2-339	5	80
6-258	5	80
1-49	5	90
2-49	5	90
1-41	5	80
1-32	5	90
2-154	5	80
1-155	5	80
2-155	5	80
1-164	5	80
1-165	5	90
1-166	5	90
1-156	5	90
6-262	5	80
2-211	5	80
2-272	5	90
2-276	5	80
1-276	5	80
1-272	5	80
6-211	5	80
1-83	5	90
2-83	5	90
1-89	5	90
2-89	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-342	5	90
1-343	5	90
2-342	5	80
1-345	5	80
2-344	5	90
1-346	5	80
2-345	5	90
1-347	5	80
2-346	5	90
1-184	5	80
2-184	5	90
1-185	5	80
2-185	5	90
1-186	5	90
2-186	5	80
1-349	5	80
2-348	5	90
1-86	5	100
2-86	5	80
1-92	5	90
2-92	5	80
1-90	5	80
1-354	5	90
1-355	5	80
2-353	5	90
2-354	5	90

Tabelle 17b : Nachaufwirkung bei 20g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	90
2-338	20	100
3-338	20	90
6-253	20	100
1-337	20	80
2-337	20	100
3-337	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
6-252	20	80
1-123	20	80
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	90
6-26	20	90
1-208	20	90
2-208	20	90
3-208	20	90
6-159	20	100
3-125	20	80
1-130	20	90
2-130	20	90
6-117	20	80
1-81	20	80
2-81	20	90
2-82	20	90
6-58	20	80
1-147	20	90
2-147	20	90
1-148	20	90
2-148	20	90
1-131	20	90
2-131	20	90
6-118	20	90
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	80
5-59	20	90
5-58	20	90
5-117	20	90
5-253	20	90
5-75	20	90
5-74	20	90
5-123	20	90
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	90
2-87	20	90
1-88	20	90
2-88	20	90
1-209	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-4	20	90
1-25	20	100
2-25	20	100
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	90
2-173	20	100
1-273	20	90
2-273	20	90
3-273	20	90
6-212	20	90
4-212	20	80
1-44	20	100
2-44	20	90
1-45	20	90
2-45	20	80
6-32	20	80
1-46	20	90
2-46	20	80
6-33	20	80
1-30	20	80
2-30	20	80
1-31	20	80
2-31	20	80
1-28	20	80
2-28	20	80
1-29	20	80
2-29	20	80
1-304	20	90
2-304	20	90
1-305	20	90
2-305	20	90
1-306	20	80
2-306	20	80
1-177	20	90
2-177	20	90
1-178	20	80
2-178	20	90
6-141	20	80
1-179	20	80
2-179	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
1-132	20	80
2-132	20	80
1-135	20	80
2-135	20	80
6-254	20	80
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-279	20	80
2-195	20	100
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-197	20	80
1-225	20	80
1-226	20	90
2-226	20	90
6-165	20	90
6-166	20	80
2-196	20	100
1-56	20	100
6-45	20	90
6-44	20	80
2-57	20	100
1-58	20	90
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	90
1-207	20	90
2-207	20	90
2-271	20	100
6-210	20	90
2-32	20	90
1-34	20	100
2-34	20	90
6-255	20	90
2-33	20	90
2-42	20	90
6-256	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-146	20	80
1-146	20	80
2-143	20	80
1-72	20	90
2-72	20	80
6-49	20	80
1-73	20	80
2-73	20	80
6-50	20	80
1-74	20	80
2-74	20	80
2-230	20	80
2-286	20	90
1-287	20	100
2-287	20	80
2-288	20	80
1-210	20	90
2-210	20	80
1-212	20	80
2-213	20	80
1-288	20	80
1-289	20	80
2-289	20	80
1-291	20	90
2-291	20	80
2-292	20	80
1-271	20	90
2-47	20	90
2-47	20	90
6-34	20	80
2-339	20	80
6-258	20	90
1-49	20	90
2-49	20	90
1-41	20	80
2-229	20	80
1-340	20	80
6-267	20	80
1-47	20	80
1-33	20	90
1-32	20	90
2-154	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
6-259	20	80
1-155	20	90
2-155	20	80
6-260	20	90
1-164	20	80
6-261	20	80
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	90
2-156	20	90
6-262	20	90
1-159	20	80
2-160	20	90
2-161	20	80
2-211	20	80
2-272	20	90
2-276	20	80
1-276	20	80
1-211	20	80
1-274	20	80
1-272	20	90
6-211	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
2-341	20	80
1-158	20	80
1-83	20	90
2-83	20	90
6-60	20	90
1-89	20	90
2-89	20	90
6-161	20	90
1-342	20	90
1-343	20	90
2-342	20	90
1-344	20	90
2-343	20	80
1-345	20	90
2-344	20	90
1-346	20	100
2-345	20	90
1-347	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-346	20	90
1-195	20	80
1-184	20	80
2-184	20	90
1-185	20	90
2-185	20	100
1-186	20	90
2-186	20	90
1-349	20	90
2-348	20	90
1-351	20	80
2-349	20	80
2-84	20	90
1-352	20	100
2-350	20	80
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	90
1-90	20	90
2-90	20	90
1-353	20	80
2-351	20	80
1-354	20	100
2-352	20	80
1-355	20	100
2-353	20	100
1-356	20	100
2-354	20	90

Tabelle 17c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen ABUTH in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ABUTH
2-337	80	100
6-252	80	100
6-117	80	80
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	90
6-58	80	80
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90

Tabelle 18a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen ALOMY in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-129	5	100
1-129	5	90
2-27	5	80
1-273	5	80
2-177	5	80
1-178	5	90
2-178	5	80
1-179	5	90
1-132	5	80
2-195	5	80
1-226	5	80
2-32	5	90
2-33	5	90
2-42	5	90
1-136	5	80
1-182	5	90
2-182	5	80
1-181	5	80
1-210	5	80
1-212	5	80
2-291	5	80
1-271	5	80
2-47	5	80
1-47	5	80
1-32	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
1-165	5	90
1-166	5	80
1-342	5	90
1-343	5	90
2-342	5	90
2-343	5	80
1-345	5	80
2-344	5	80
1-346	5	80
2-345	5	80
1-195	5	90
1-184	5	80
2-184	5	80
1-186	5	80
2-348	5	80
1-351	5	90
2-352	5	80

Tabelle 18b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen ALOMY in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
3-129	20	80
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	80
2-338	20	80
1-26	20	90
2-26	20	80
3-26	20	80
1-208	20	80
2-208	20	80
6-159	20	80
1-130	20	80
2-130	20	80
6-117	20	80
1-81	20	80
2-81	20	80
1-147	20	80
2-147	20	80
1-148	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-148	20	80
1-131	20	90
2-131	20	80
6-118	20	80
1-149	20	80
2-149	20	80
6-124	20	90
5-59	20	80
5-58	20	80
5-117	20	80
5-75	20	80
5-123	20	80
5-122	20	80
1-82	20	90
1-87	20	80
2-87	20	80
1-88	20	80
2-88	20	80
1-209	20	80
1-4	20	80
1-25	20	100
2-25	20	90
1-27	20	100
2-27	20	90
1-173	20	80
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	80
6-212	20	80
1-46	20	90
2-46	20	80
1-30	20	80
2-31	20	80
1-177	20	90
2-177	20	100
1-178	20	100
2-178	20	90
6-141	20	90
1-179	20	90
2-179	20	90
1-132	20	90
1-135	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-134	20	80
1-133	20	90
2-133	20	80
2-278	20	80
2-195	20	100
2-197	20	90
1-225	20	90
1-226	20	100
2-226	20	90
6-165	20	80
2-196	20	90
2-57	20	90
2-58	20	80
2-56	20	80
1-57	20	80
1-207	20	90
2-207	20	90
2-271	20	100
2-32	20	100
1-34	20	90
2-34	20	100
6-255	20	90
2-33	20	100
2-42	20	100
2-142	20	80
1-142	20	90
2-74	20	80
1-138	20	90
1-137	20	90
1-136	20	90
2-180	20	90
1-183	20	90
2-183	20	80
1-182	20	100
2-182	20	100
6-145	20	80
1-181	20	100
2-181	20	90
2-36	20	90
1-228	20	90
2-228	20	80
1-230	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
2-230	20	90
2-287	20	90
2-288	20	90
1-210	20	100
2-210	20	90
1-212	20	90
1-288	20	90
2-289	20	90
1-291	20	90
2-291	20	80
2-292	20	80
1-271	20	90
2-47	20	90
2-47	20	90
1-339	20	80
2-339	20	80
6-258	20	80
2-49	20	80
1-229	20	80
1-340	20	80
1-47	20	90
1-33	20	90
1-32	20	90
2-154	20	80
1-155	20	90
2-155	20	90
1-165	20	100
1-166	20	90
1-156	20	80
2-156	20	90
1-160	20	80
2-160	20	80
2-211	20	80
2-272	20	90
2-276	20	80
1-276	20	80
1-274	20	80
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
1-83	20	100
2-83	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
1-89	20	90
2-89	20	90
6-161	20	90
1-342	20	100
1-343	20	100
2-342	20	90
1-344	20	100
2-343	20	100
1-345	20	90
2-344	20	90
1-346	20	90
2-345	20	80
1-347	20	80
2-346	20	80
1-195	20	100
1-184	20	80
2-184	20	100
1-185	20	90
2-185	20	90
1-186	20	90
2-186	20	80
1-349	20	80
2-348	20	90
1-351	20	90
2-349	20	80
1-84	20	100
2-84	20	90
1-352	20	80
2-350	20	80
1-86	20	100
2-86	20	80
1-92	20	90
2-92	20	80
1-90	20	80
1-353	20	80
2-351	20	80
1-354	20	80
2-352	20	90
1-355	20	80
1-356	20	80
2-354	20	80

Tabelle 18c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen ALOMY in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ALOMY
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	80
2-337	80	90
6-117	80	90
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90

Tabelle 19a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen AMARE in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	5	90
2-129	5	100
1-129	5	100
6-116	5	100
1-338	5	90
2-338	5	80
3-338	5	90
2-337	5	80
3-337	5	90
2-123	5	80
1-26	5	90
2-26	5	100
3-26	5	90
6-26	5	100
1-208	5	100
2-208	5	90
3-208	5	80
6-159	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-130	5	90
2-130	5	90
1-131	5	100
2-131	5	100
6-118	5	100
1-149	5	90
2-149	5	100
6-124	5	100
5-59	5	90
5-58	5	90
5-117	5	100
5-253	5	80
5-75	5	90
5-74	5	90
5-123	5	90
5-122	5	90
1-82	5	90
1-87	5	90
2-87	5	90
1-88	5	90
2-88	5	90
1-209	5	90
1-4	5	80
1-25	5	100
1-27	5	100
2-27	5	100
1-173	5	100
2-173	5	100
1-273	5	90
6-212	5	80
1-44	5	100
2-44	5	100
1-45	5	90
2-45	5	100
6-32	5	80
1-46	5	100
2-46	5	100
6-33	5	90
1-304	5	90
2-304	5	90
6-231	5	80
1-305	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-305	5	100
1-306	5	100
2-306	5	90
1-177	5	90
2-177	5	100
1-178	5	90
2-178	5	100
6-141	5	90
1-179	5	100
2-179	5	100
1-132	5	100
2-132	5	80
1-135	5	90
2-135	5	90
6-254	5	80
1-134	5	90
2-134	5	80
1-133	5	90
2-133	5	80
6-120	5	80
1-277	5	100
2-277	5	90
1-278	5	90
2-278	5	90
1-279	5	90
2-195	5	100
2-225	5	100
1-197	5	100
2-227	5	100
1-227	5	100
2-197	5	80
1-225	5	90
1-226	5	90
2-226	5	90
1-56	5	100
2-57	5	100
1-58	5	100
2-58	5	100
2-56	5	100
1-57	5	100
1-207	5	100
2-207	5	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-271	5	100
6-210	5	100
2-32	5	100
1-34	5	100
2-34	5	100
6-255	5	100
2-33	5	100
2-42	5	100
6-256	5	80
2-146	5	80
1-141	5	90
1-144	5	80
1-138	5	80
2-138	5	90
2-141	5	80
1-137	5	90
1-136	5	90
1-181	5	100
1-228	5	90
6-167	5	80
2-286	5	90
2-287	5	90
2-288	5	90
1-212	5	90
1-288	5	90
1-289	5	90
2-289	5	90
1-291	5	80
6-230	5	90
2-292	5	80
1-271	5	90
2-47	5	90
2-47	5	100
6-34	5	90
1-339	5	80
2-339	5	80
6-258	5	90
1-49	5	90
2-49	5	90
1-41	5	80
1-229	5	90
2-229	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-340	5	90
6-267	5	90
2-340	5	90
1-47	5	90
1-33	5	80
1-32	5	90
2-154	5	90
6-259	5	80
1-155	5	90
2-155	5	90
1-164	5	90
2-164	5	80
6-261	5	80
1-165	5	90
1-166	5	80
1-156	5	80
2-156	5	90
1-159	5	90
2-159	5	90
1-162	5	90
2-162	5	80
1-160	5	90
2-160	5	90
2-161	5	90
6-266	5	80
2-211	5	90
2-272	5	90
1-161	5	80
2-276	5	80
1-276	5	100
1-211	5	90
1-274	5	100
6-168	5	80
1-272	5	90
6-211	5	80
1-341	5	80
1-292	5	80
2-341	5	90
1-158	5	80
1-83	5	100
2-83	5	100
6-60	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-89	5	100
2-89	5	100
6-76	5	100
6-161	5	100
6-268	5	90
1-342	5	100
1-343	5	100
2-342	5	100
1-344	5	100
2-343	5	90
1-345	5	100
2-344	5	100
1-346	5	100
2-345	5	90
1-347	5	100
2-346	5	100
1-195	5	100
1-184	5	100
2-184	5	100
1-185	5	100
2-185	5	100
1-186	5	90
2-186	5	100
1-349	5	100
1-350	5	90
2-348	5	90
1-351	5	100
2-349	5	90
1-84	5	100
2-84	5	100
1-352	5	100
2-350	5	100
1-86	5	100
2-86	5	100
1-92	5	100
2-92	5	100
1-90	5	100
2-90	5	100
1-353	5	100
2-351	5	100
1-354	5	90
2-352	5	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-355	5	100
2-353	5	100
1-356	5	100
2-354	5	100

Tabelle 19b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen AMARE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	90
2-338	20	100
3-338	20	90
2-337	20	100
3-337	20	100
1-123	20	80
2-123	20	80
1-26	20	100
2-26	20	100
3-26	20	90
6-26	20	100
1-208	20	100
2-208	20	100
3-208	20	90
6-159	20	100
1-125	20	80
2-125	20	80
3-125	20	90
1-130	20	90
2-130	20	100
1-81	20	90
2-81	20	90
2-82	20	90
1-147	20	90
2-147	20	90
1-148	20	90
2-148	20	90
1-131	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-131	20	100
6-118	20	100
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	100
5-59	20	90
5-58	20	90
5-117	20	100
5-253	20	80
5-75	20	90
5-74	20	100
5-123	20	90
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	100
2-87	20	90
1-88	20	90
2-88	20	90
1-209	20	100
1-4	20	90
1-25	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	90
6-212	20	90
4-212	20	80
1-44	20	100
2-44	20	100
1-45	20	90
2-45	20	100
6-32	20	100
1-46	20	100
2-46	20	100
6-33	20	90
2-31	20	80
1-304	20	90
2-304	20	100
6-231	20	90
1-305	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-305	20	100
1-306	20	100
2-306	20	90
1-177	20	100
2-177	20	100
1-178	20	100
2-178	20	100
6-141	20	100
1-179	20	100
2-179	20	100
1-132	20	100
2-132	20	90
1-135	20	90
2-135	20	90
6-254	20	100
1-134	20	90
2-134	20	100
1-133	20	100
2-133	20	90
6-120	20	90
1-277	20	100
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	100
2-195	20	100
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-197	20	90
1-225	20	100
1-226	20	100
2-226	20	100
6-165	20	80
6-166	20	90
1-56	20	100
6-45	20	80
6-44	20	90
2-57	20	100
1-58	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	100
6-210	20	100
2-32	20	100
1-34	20	100
2-34	20	100
6-255	20	100
2-33	20	100
2-42	20	100
6-256	20	90
2-146	20	80
2-142	20	100
5-255	20	90
1-142	20	90
5-254	20	80
1-140	20	80
1-146	20	100
1-141	20	100
1-144	20	90
1-138	20	90
2-138	20	90
2-141	20	80
1-137	20	90
1-136	20	90
1-181	20	100
1-36	20	100
2-36	20	90
1-228	20	90
2-228	20	90
6-167	20	100
1-230	20	100
2-230	20	100
6-169	20	90
2-286	20	100
2-287	20	100
2-288	20	100
2-210	20	100
1-212	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-288	20	100
1-289	20	90
2-289	20	100
6-228	20	90
1-291	20	90
2-291	20	90
6-230	20	90
2-292	20	90
1-271	20	90
2-47	20	90
2-47	20	100
6-34	20	100
1-339	20	90
2-339	20	90
6-258	20	90
1-49	20	90
2-49	20	100
1-41	20	90
1-229	20	90
2-229	20	90
1-340	20	90
6-267	20	90
2-340	20	100
1-47	20	90
1-33	20	100
1-32	20	90
2-154	20	90
6-259	20	100
1-155	20	90
2-155	20	90
6-260	20	80
1-164	20	90
2-164	20	90
6-261	20	90
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	90
2-156	20	90
6-262	20	90
2-157	20	90
1-159	20	100
2-159	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
1-162	20	90
2-162	20	100
6-264	20	80
1-160	20	100
2-160	20	100
2-161	20	100
6-266	20	100
2-211	20	90
2-272	20	100
1-161	20	90
2-276	20	90
1-276	20	100
1-211	20	90
1-274	20	100
6-168	20	100
1-272	20	100
6-211	20	90
1-341	20	100
1-292	20	100
2-341	20	100
1-158	20	90
1-83	20	100
2-83	20	100
6-60	20	100
1-89	20	100
2-89	20	100
6-76	20	100
6-161	20	100
6-268	20	100
1-342	20	100
1-343	20	100
2-342	20	100
1-344	20	100
2-343	20	100
1-345	20	100
2-344	20	100
1-346	20	100
2-345	20	100
1-347	20	100
2-346	20	100
1-195	20	100
1-184	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-184	20	100
1-185	20	100
2-185	20	100
1-186	20	100
2-186	20	100
1-349	20	100
1-350	20	100
2-348	20	100
1-351	20	100
2-349	20	100
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100
2-351	20	100
1-354	20	100
2-352	20	100
1-355	20	100
2-353	20	100
1-356	20	100
2-354	20	100

Tabelle 19c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen AMARE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AMARE
2-337	80	100
6-117	80	80
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	90
6-58	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90

Tabelle 20a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
2-129	5	100
6-116	5	100
2-208	5	80
2-131	5	80
5-117	5	80
2-27	5	90
1-173	5	90
1-28	5	80
2-28	5	80
1-29	5	80
1-132	5	80
2-32	5	90
2-34	5	80

5 Tabelle 20b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	80
2-338	20	80
3-337	20	80
2-26	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-208	20	90
2-208	20	90
3-208	20	80
1-130	20	80
2-130	20	90
2-81	20	90
2-82	20	90
6-58	20	80
1-147	20	90
2-147	20	90
1-148	20	100
2-148	20	90
1-131	20	80
2-131	20	80
1-149	20	100
5-117	20	90
5-75	20	80
5-74	20	80
5-123	20	80
5-122	20	80
1-82	20	90
1-87	20	80
2-87	20	80
1-88	20	80
2-88	20	80
1-4	20	80
2-25	20	100
3-27	20	90
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	100
1-273	20	90
3-273	20	80
1-44	20	80
2-44	20	80
1-46	20	80
1-30	20	80
1-31	20	90
2-31	20	80
1-28	20	80
2-28	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-29	20	90
2-29	20	80
1-178	20	80
2-178	20	80
1-179	20	90
1-132	20	90
2-135	20	80
1-277	20	80
2-195	20	80
1-227	20	80
1-225	20	80
1-226	20	80
2-226	20	80
2-57	20	80
1-58	20	90
2-58	20	80
2-271	20	80
2-32	20	100
2-34	20	80
2-33	20	100
1-137	20	80
2-182	20	80
1-181	20	90
2-230	20	80
2-288	20	80
1-212	20	80
1-291	20	80
2-291	20	90
2-292	20	80
1-271	20	80
2-47	20	80
1-49	20	80
1-165	20	90
2-272	20	80
2-341	20	90
2-83	20	90
2-89	20	80
1-344	20	80
2-345	20	80
1-349	20	80
1-351	20	80
2-349	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
1-84	20	80
2-84	20	100
1-352	20	80
2-350	20	90
1-86	20	100
2-86	20	80
1-92	20	90
2-92	20	80
2-90	20	80
1-353	20	80
2-351	20	80

Tabelle 20c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen AVEFA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	AVEFA
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	80
2-337	80	90
6-117	80	90
1-81	80	90
2-81	80	100
2-82	80	90
6-58	80	90
1-147	80	90
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	90

5 Tabelle 21a : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen CYPES in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	CYPES
1-338	20	80

Tabelle 21b : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen CYPES in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	CYPES
2-129	80	90
1-129	80	80
1-338	80	90
6-253	80	80

5 Tabelle 22a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-129	5	100
2-26	5	80
6-26	5	80
6-159	5	80
1-130	5	80
5-59	5	80
5-58	5	80
5-117	5	80
5-75	5	80
5-74	5	80
5-123	5	90
5-122	5	90
1-82	5	80
1-87	5	80
2-87	5	80
1-88	5	80
2-88	5	80
2-27	5	80
2-173	5	80
1-273	5	80
2-273	5	80
3-273	5	80
6-212	5	90
1-45	5	80
1-46	5	80
2-30	5	80
1-31	5	80
2-31	5	80
1-28	5	80
2-28	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-305	5	90
1-306	5	90
2-306	5	90
1-135	5	80
2-135	5	80
1-278	5	90
1-279	5	80
1-225	5	90
1-226	5	100
6-165	5	90
6-166	5	80
1-56	5	80
2-57	5	100
1-58	5	90
2-58	5	90
1-57	5	80
2-32	5	80
1-34	5	90
2-34	5	90
6-255	5	90
2-33	5	90
2-42	5	90
6-256	5	90
1-37	5	80
2-72	5	80
1-73	5	80
2-73	5	80
1-74	5	80
2-74	5	80
1-138	5	80
2-138	5	80
1-137	5	90
1-136	5	80
6-257	5	80
2-182	5	90
1-181	5	80
2-228	5	80
1-230	5	80
6-169	5	80
2-287	5	80
2-288	5	80
1-212	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-213	5	80
1-288	5	80
2-289	5	80
1-291	5	80
2-291	5	80
2-292	5	80
1-271	5	80
2-47	5	80
2-47	5	80
6-34	5	80
1-339	5	90
6-258	5	80
1-49	5	80
1-229	5	90
1-47	5	90
1-33	5	80
6-259	5	80
1-155	5	90
6-260	5	90
1-164	5	80
1-156	5	80
2-156	5	90
2-272	5	80
1-211	5	80
1-274	5	80
6-168	5	80
1-272	5	80
1-341	5	80
1-292	5	80
2-341	5	80
6-161	5	90
1-343	5	80
2-344	5	80
1-346	5	80
2-346	5	80
1-185	5	90
2-84	5	100
1-352	5	100
1-86	5	80
2-86	5	100
1-92	5	100
2-92	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-353	5	100
2-351	5	100

Tabelle 22b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	90
2-338	20	80
1-26	20	80
2-26	20	80
6-26	20	90
2-208	20	80
6-159	20	90
1-130	20	80
2-130	20	80
6-117	20	80
1-81	20	80
2-81	20	90
2-82	20	80
6-58	20	90
1-147	20	90
2-147	20	90
1-148	20	80
2-148	20	80
1-131	20	90
2-131	20	80
6-118	20	90
1-149	20	80
2-149	20	80
6-124	20	80
5-59	20	90
5-58	20	90
5-117	20	80
5-253	20	80
5-75	20	80
5-74	20	80
5-123	20	90
5-122	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-82	20	90
1-87	20	80
2-87	20	80
1-88	20	90
2-88	20	80
1-209	20	90
1-4	20	100
1-25	20	100
2-25	20	80
1-27	20	80
2-27	20	100
1-173	20	80
2-173	20	90
1-273	20	90
2-273	20	90
3-273	20	80
6-212	20	90
1-44	20	80
2-44	20	80
1-45	20	80
2-45	20	80
1-46	20	80
2-46	20	80
6-33	20	80
1-30	20	80
2-30	20	80
1-31	20	80
2-31	20	90
1-28	20	90
2-28	20	80
1-29	20	80
2-29	20	80
1-304	20	90
2-304	20	80
1-305	20	90
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	90
6-233	20	80
1-177	20	90
1-178	20	90
2-178	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
6-141	20	80
1-179	20	90
2-179	20	80
1-132	20	90
2-132	20	90
1-135	20	100
2-135	20	90
6-254	20	90
1-134	20	90
2-134	20	90
2-133	20	80
6-120	20	90
1-277	20	90
2-277	20	100
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-279	20	90
2-225	20	100
1-197	20	90
2-227	20	80
2-197	20	90
1-225	20	100
1-226	20	100
2-226	20	90
6-165	20	100
6-166	20	90
2-196	20	80
1-56	20	90
6-45	20	90
6-44	20	90
2-57	20	100
1-58	20	90
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	80
6-210	20	80
2-32	20	90
1-34	20	90
2-34	20	100
6-255	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-33	20	100
2-42	20	100
6-256	20	90
1-146	20	80
1-37	20	80
2-37	20	80
1-72	20	80
2-72	20	80
1-73	20	80
2-73	20	80
6-50	20	80
1-74	20	80
2-74	20	80
6-51	20	80
1-138	20	90
2-138	20	90
2-141	20	80
1-137	20	90
1-136	20	90
2-180	20	90
1-183	20	100
2-183	20	90
6-257	20	90
1-182	20	80
2-182	20	90
1-181	20	80
2-181	20	90
6-144	20	80
1-228	20	80
2-228	20	90
6-167	20	80
1-230	20	80
6-169	20	90
2-286	20	100
1-287	20	100
2-287	20	80
2-288	20	80
1-210	20	80
2-210	20	90
1-212	20	80
2-212	20	80
2-213	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-288	20	80
1-289	20	80
2-289	20	90
1-291	20	80
2-291	20	80
2-292	20	80
1-271	20	80
2-47	20	90
2-47	20	80
6-34	20	90
1-339	20	90
2-339	20	90
6-258	20	90
1-49	20	90
2-49	20	90
1-41	20	90
1-229	20	90
2-229	20	90
1-340	20	90
6-267	20	90
2-340	20	90
1-47	20	90
1-33	20	90
1-32	20	90
2-154	20	90
6-259	20	90
1-155	20	90
6-260	20	90
1-164	20	90
2-164	20	80
6-261	20	90
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	90
2-156	20	90
6-262	20	80
1-159	20	90
1-162	20	80
2-211	20	80
2-272	20	90
2-276	20	90
1-276	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
1-211	20	90
1-274	20	90
6-168	20	80
1-272	20	90
6-211	20	90
1-341	20	90
1-292	20	80
2-341	20	90
1-83	20	90
2-83	20	90
6-60	20	90
2-89	20	90
6-76	20	80
6-161	20	90
1-342	20	80
1-343	20	90
1-345	20	90
2-344	20	90
1-346	20	90
2-345	20	80
1-347	20	90
2-346	20	90
1-195	20	80
1-184	20	100
2-184	20	100
1-185	20	100
2-185	20	100
1-186	20	90
1-350	20	80
2-348	20	80
1-351	20	100
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
2-351	20	100
2-352	20	90
1-355	20	90

Tabelle 22c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen ECHCG in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	ECHCG
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	100
3-338	80	80
6-253	80	90
2-337	80	90
6-117	80	80
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	80
6-58	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	80
2-148	80	90

5 Tabelle 23a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen HORMU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
2-129	5	80
1-129	5	90
1-273	5	80

Tabelle 23b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen HORMU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
3-129	20	90
2-129	20	90
1-129	20	100
6-116	20	90
1-338	20	80
2-26	20	80
6-117	20	80
2-82	20	80
1-147	20	80
2-147	20	80
2-148	20	80
1-131	20	80
2-131	20	100
5-59	20	80
5-117	20	80
5-122	20	80
1-82	20	90
1-87	20	80
2-87	20	80
2-88	20	80
1-25	20	100
2-25	20	80
1-27	20	80
2-27	20	90
1-173	20	90
2-173	20	100
1-273	20	90
2-46	20	80

Tabelle 23c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen HORMU in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	100
3-338	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	HORMU
6-253	80	90
6-117	80	90
1-81	80	80
2-81	80	80
2-82	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90

Tabelle 24a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
1-129	5	80

5 Tabelle 24b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
2-129	20	100
1-129	20	100
1-26	20	80
2-81	20	80
1-148	20	80
5-123	20	80
5-122	20	80
1-82	20	80
1-209	20	80
2-27	20	80
1-173	20	90
1-273	20	80
1-178	20	80
1-179	20	80
2-32	20	80
1-181	20	80
1-165	20	80
1-351	20	80

Tabelle 24c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen LOLRI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	LOLRI
3-129	80	80
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	90
1-338	80	80
2-338	80	90
2-81	80	90
2-82	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	80

Tabelle 25a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen MATIN in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	5	100
2-129	5	80
6-116	5	80
1-26	5	90
2-26	5	80
3-26	5	90
3-208	5	90
1-131	5	90
2-131	5	90
2-149	5	90
5-117	5	80
5-122	5	80
2-87	5	80
1-88	5	80
2-25	5	90
3-27	5	90
1-27	5	80
2-27	5	100
1-273	5	100
2-273	5	80
3-273	5	80
1-44	5	80
2-44	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-45	5	80
2-31	5	80
1-304	5	90
2-304	5	90
1-305	5	90
2-305	5	80
1-306	5	90
2-306	5	80
2-177	5	90
2-178	5	90
2-179	5	80
2-132	5	80
1-135	5	80
2-135	5	90
1-277	5	90
2-277	5	90
1-278	5	80
2-278	5	90
1-279	5	90
2-195	5	80
2-196	5	80
2-57	5	80
1-58	5	80
2-58	5	80
2-56	5	80
1-57	5	80
2-207	5	80
2-271	5	100
2-32	5	90
2-33	5	90
2-146	5	80
2-73	5	80
1-74	5	80
1-137	5	80
1-183	5	90
2-183	5	80
2-182	5	90
2-181	5	80
2-286	5	90
1-287	5	80
2-287	5	90
2-288	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-210	5	80
2-213	5	90
1-288	5	90
2-289	5	80
1-291	5	80
2-291	5	80
2-292	5	80
1-271	5	90
2-49	5	80
1-33	5	80
1-32	5	80
1-164	5	80
1-166	5	80
2-272	5	80
1-292	5	80
1-83	5	80
2-83	5	80
2-89	5	90
1-346	5	80
2-345	5	90
2-185	5	80
1-352	5	80
2-350	5	80
2-86	5	80
1-353	5	80

Tabelle 25b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen MATIN in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	90
6-116	20	90
3-337	20	80
1-26	20	90
2-26	20	90
3-26	20	90
1-208	20	80
2-208	20	80
3-208	20	90
6-159	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-130	20	80
2-130	20	80
6-117	20	90
1-81	20	80
2-81	20	100
2-82	20	90
1-147	20	100
2-147	20	100
1-148	20	100
2-148	20	90
1-131	20	90
2-131	20	100
6-118	20	80
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	80
5-58	20	80
5-117	20	90
5-75	20	80
5-123	20	80
5-122	20	80
1-82	20	80
1-87	20	80
2-87	20	90
1-88	20	80
2-88	20	80
1-25	20	100
2-25	20	100
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	90
1-44	20	90
2-44	20	80
1-45	20	80
2-45	20	80
1-46	20	80
2-46	20	80
2-31	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
1-28	20	80
2-28	20	80
2-29	20	80
1-304	20	90
2-304	20	90
1-305	20	90
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	90
1-177	20	90
2-177	20	90
1-178	20	90
2-178	20	90
1-179	20	80
2-179	20	90
1-132	20	80
2-132	20	80
1-135	20	90
2-135	20	90
6-254	20	80
2-134	20	80
2-133	20	90
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-279	20	80
2-195	20	90
2-225	20	80
2-197	20	80
1-226	20	80
2-226	20	80
2-196	20	90
1-56	20	90
2-57	20	90
1-58	20	90
2-58	20	90
2-56	20	90
1-57	20	90
1-207	20	90
2-207	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
2-271	20	100
2-32	20	90
2-33	20	90
2-42	20	80
2-146	20	90
5-255	20	80
1-72	20	80
2-72	20	80
1-73	20	80
2-73	20	80
1-74	20	90
2-74	20	80
1-137	20	80
1-136	20	80
2-180	20	80
1-183	20	90
2-183	20	90
2-182	20	90
2-181	20	90
2-228	20	80
2-286	20	90
1-287	20	90
2-287	20	90
2-288	20	90
1-210	20	90
2-210	20	90
2-213	20	100
1-288	20	100
1-289	20	80
2-289	20	90
1-291	20	90
2-291	20	90
2-292	20	90
1-271	20	90
2-47	20	80
1-339	20	80
2-339	20	80
1-49	20	80
2-49	20	80
1-229	20	80
2-229	20	80
1-340	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
2-340	20	80
1-33	20	80
1-32	20	90
2-154	20	80
1-155	20	80
2-155	20	90
6-260	20	80
1-164	20	80
2-164	20	80
1-165	20	80
1-166	20	80
2-161	20	80
2-211	20	80
2-272	20	80
2-276	20	90
1-276	20	80
1-274	20	80
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
2-341	20	80
1-83	20	90
2-83	20	100
1-89	20	80
2-89	20	90
1-345	20	80
2-344	20	80
1-346	20	90
2-345	20	100
1-195	20	80
2-185	20	90
1-84	20	90
2-84	20	80
1-352	20	90
2-350	20	90
1-86	20	80
2-86	20	90
1-92	20	80
2-92	20	80
1-90	20	80
2-90	20	90
1-353	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
2-351	20	80
2-352	20	80
2-353	20	80

Tabelle 25c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen MATIN in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	MATIN
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
3-338	80	80
6-117	80	90
1-81	80	100
2-81	80	100
2-82	80	90
1-147	80	100
2-147	80	100
1-148	80	100
2-148	80	90

5 Tabelle 26a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-129	5	80
6-116	5	80
2-26	5	80
3-26	5	80
1-208	5	80
2-208	5	80
3-208	5	80
1-130	5	80
5-59	5	80
5-58	5	80
5-117	5	80
5-75	5	80
1-82	5	80
1-87	5	80
2-87	5	80
1-88	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
2-88	5	80
2-25	5	80
3-27	5	90
2-173	5	80
2-44	5	80
1-45	5	80
1-46	5	80
2-31	5	80
2-135	5	80
1-134	5	80
1-277	5	90
2-278	5	80
1-279	5	90
1-227	5	80
2-57	5	80
2-56	5	80
2-32	5	80
1-34	5	90
2-34	5	90
6-255	5	90
2-42	5	90
2-146	5	80
1-138	5	80
1-137	5	80
1-180	5	90
2-182	5	80
1-228	5	80
2-286	5	90
1-287	5	90
2-288	5	80
1-212	5	80
2-213	5	80
1-289	5	80
1-291	5	80
2-291	5	80
2-47	5	80
1-339	5	80
2-339	5	90
1-49	5	80
2-49	5	80
1-47	5	80
2-154	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-155	5	90
1-164	5	90
1-165	5	90
1-166	5	80
1-159	5	80
2-159	5	80
2-211	5	80
2-272	5	90
2-276	5	80
1-274	5	80
1-292	5	80
1-342	5	80
2-342	5	80
1-345	5	80
1-346	5	80
1-347	5	90
1-195	5	80
1-84	5	90
2-350	5	80
1-86	5	80
2-86	5	80
2-353	5	80

Tabelle 26b : Nachaufwirkung bei 20g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
3-129	20	90
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	80
3-338	20	80
1-26	20	80
2-26	20	80
3-26	20	90
6-26	20	80
1-208	20	90
2-208	20	80
3-208	20	90
6-159	20	80
1-130	20	90
1-147	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-131	20	90
2-131	20	80
1-149	20	90
2-149	20	90
5-59	20	90
5-58	20	90
5-117	20	90
5-75	20	80
5-74	20	100
5-123	20	80
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	90
2-87	20	80
1-88	20	90
2-88	20	90
1-209	20	90
1-25	20	80
2-25	20	90
3-27	20	100
1-27	20	90
2-27	20	90
2-173	20	90
1-273	20	80
3-273	20	80
1-44	20	80
2-44	20	80
1-45	20	80
2-45	20	80
1-46	20	80
2-46	20	80
1-30	20	80
2-30	20	90
1-31	20	80
2-31	20	90
1-28	20	90
2-28	20	80
2-29	20	80
2-304	20	90
1-305	20	90
2-305	20	90
2-306	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-177	20	80
1-178	20	80
2-178	20	90
2-179	20	80
1-132	20	90
1-135	20	90
2-135	20	80
6-254	20	80
1-134	20	90
2-134	20	90
1-133	20	80
2-133	20	80
6-120	20	90
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
1-197	20	90
1-227	20	90
1-225	20	80
1-226	20	80
2-226	20	80
1-56	20	80
2-57	20	90
1-58	20	90
2-58	20	90
2-56	20	90
1-57	20	90
1-207	20	80
2-207	20	80
2-32	20	90
1-34	20	90
2-34	20	100
6-255	20	90
2-33	20	90
2-42	20	90
6-256	20	90
2-146	20	90
1-37	20	80
2-143	20	80
1-72	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
2-72	20	80
2-73	20	80
1-74	20	90
2-74	20	80
2-144	20	80
1-138	20	90
2-138	20	80
2-141	20	80
1-137	20	80
1-180	20	90
2-180	20	90
1-183	20	80
2-183	20	80
2-182	20	90
6-145	20	80
1-181	20	90
2-181	20	90
1-228	20	80
2-228	20	80
2-286	20	90
1-287	20	100
2-288	20	90
1-210	20	100
2-210	20	90
1-212	20	90
2-213	20	80
1-288	20	80
1-289	20	90
2-289	20	90
6-228	20	80
1-291	20	90
2-291	20	90
6-230	20	80
1-271	20	90
2-47	20	90
2-47	20	90
6-34	20	80
1-339	20	90
2-339	20	90
1-49	20	90
2-49	20	90
1-229	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBP
2-229	20	90
1-340	20	90
6-267	20	80
2-340	20	80
1-47	20	90
1-33	20	80
2-154	20	90
1-155	20	90
2-155	20	80
6-260	20	90
1-164	20	90
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	90
2-156	20	90
1-159	20	80
2-159	20	90
1-162	20	80
2-161	20	80
6-266	20	80
2-211	20	80
2-272	20	100
2-276	20	90
1-276	20	90
1-274	20	90
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
2-341	20	80
1-83	20	90
2-83	20	80
2-89	20	80
6-161	20	80
1-342	20	90
1-343	20	80
2-342	20	90
1-345	20	80
2-344	20	80
1-346	20	90
2-345	20	100
1-347	20	90
2-346	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
1-195	20	80
1-184	20	80
2-348	20	80
1-84	20	90
2-84	20	80
1-352	20	90
2-350	20	80
1-86	20	90
2-86	20	90
1-92	20	90
2-92	20	90
1-90	20	90
1-353	20	90
2-351	20	90
2-352	20	80
1-355	20	80
2-353	20	80
1-356	20	80
2-354	20	80

Tabelle 26c : Nachaufwirkung bei 80g/ha gegen PHBPU in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	PHBPU
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	90
1-338	80	90
2-338	80	90
3-338	80	90
2-337	80	80
6-117	80	80
1-81	80	80
2-81	80	90
1-147	80	90
2-147	80	80

Tabelle 27a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen POLCO in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
1-72	5	100

Tabelle 27b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen POLCO in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
1-26	20	90
2-26	20	80
6-26	20	80
3-125	20	80
2-130	20	80
1-147	20	90
2-148	20	90
1-149	20	100
2-149	20	80
5-122	20	80
1-88	20	80
1-27	20	90
2-173	20	90
2-30	20	80
1-28	20	80
2-304	20	80
2-305	20	100
1-306	20	80
1-178	20	80
6-141	20	80
1-179	20	80
2-179	20	90
1-207	20	100
1-72	20	100
1-73	20	80
1-74	20	80
2-180	20	100
1-183	20	100
2-287	20	100
1-212	20	100
1-271	20	80

Tabelle 27c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen POLCO in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	POLCO
3-129	80	90
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	80
1-81	80	90
2-81	80	80
2-82	80	80
6-58	80	100
1-147	80	90
2-147	80	80
1-148	80	80
2-148	80	90

Tabelle 28a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen SETVI in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
2-129	5	100
1-129	5	100
6-116	5	100
1-26	5	100
2-26	5	80
1-208	5	80
2-208	5	80
2-131	5	90
1-149	5	100
2-149	5	90
6-124	5	80
5-58	5	80
5-117	5	100
5-253	5	80
5-75	5	80
5-74	5	80
5-123	5	80
5-122	5	80
1-82	5	80
1-87	5	80
2-87	5	80
1-88	5	80
2-88	5	90
1-209	5	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-27	5	100
2-27	5	80
1-173	5	90
2-173	5	100
1-273	5	80
2-273	5	80
6-33	5	80
1-28	5	80
1-304	5	90
2-304	5	80
2-305	5	90
1-306	5	90
2-306	5	80
1-177	5	90
2-177	5	90
1-179	5	90
2-179	5	90
1-134	5	90
1-133	5	90
2-133	5	80
1-277	5	90
2-277	5	90
2-278	5	80
1-279	5	90
2-195	5	90
2-197	5	80
1-225	5	90
1-226	5	100
2-226	5	100
1-56	5	100
2-57	5	100
1-58	5	100
2-58	5	90
2-56	5	80
1-57	5	100
1-207	5	100
2-207	5	90
2-271	5	100
6-210	5	90
2-32	5	80
1-34	5	80
2-34	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
6-255	5	80
2-33	5	80
1-182	5	90
2-182	5	90
6-145	5	80
2-287	5	80
2-288	5	80
1-210	5	80
1-212	5	80
1-288	5	80
1-289	5	80
1-339	5	80
1-49	5	90
1-229	5	80
1-33	5	80
1-166	5	90
2-272	5	90
1-276	5	80
1-272	5	90
2-158	5	90
1-83	5	80
1-89	5	90
2-89	5	90
1-342	5	90
2-342	5	90
1-344	5	80
2-343	5	90
1-346	5	100
2-345	5	80
1-195	5	100
1-185	5	80
1-349	5	90
2-348	5	80
2-349	5	90
1-84	5	100
2-84	5	80
1-352	5	80
2-86	5	100
1-92	5	90
2-92	5	80
2-352	5	80

Tabelle 28b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen SETVI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
1-338	20	80
2-338	20	80
6-253	20	90
1-26	20	100
2-26	20	100
6-26	20	80
1-208	20	80
2-208	20	80
1-130	20	80
2-81	20	90
1-131	20	100
2-131	20	100
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	90
5-59	20	90
5-58	20	100
5-117	20	100
5-253	20	80
5-75	20	80
5-74	20	90
5-123	20	80
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	90
2-87	20	80
1-88	20	90
2-88	20	100
1-209	20	100
1-4	20	80
1-25	20	80
2-25	20	80
3-27	20	90
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	90
2-173	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	80
6-212	20	80
4-212	20	80
1-44	20	90
1-45	20	80
2-45	20	80
6-32	20	80
1-46	20	80
6-33	20	80
2-30	20	80
1-28	20	80
1-29	20	80
2-29	20	80
1-304	20	90
2-304	20	80
1-305	20	90
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	80
1-177	20	90
2-177	20	90
1-178	20	90
2-178	20	90
1-179	20	90
2-179	20	90
1-132	20	90
2-132	20	80
1-135	20	80
6-254	20	80
1-134	20	90
1-133	20	100
2-133	20	90
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-195	20	100
2-197	20	100
1-225	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-226	20	100
2-226	20	100
6-165	20	80
6-166	20	100
2-196	20	100
1-56	20	100
6-45	20	100
6-44	20	80
2-57	20	100
6-43	20	90
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	100
6-210	20	100
2-32	20	100
1-34	20	90
2-34	20	90
6-255	20	90
2-33	20	100
1-72	20	80
2-72	20	80
2-73	20	100
1-74	20	100
2-74	20	90
1-138	20	80
1-137	20	80
1-136	20	80
2-180	20	90
1-182	20	100
2-182	20	100
6-145	20	90
1-181	20	90
2-181	20	90
2-230	20	100
6-169	20	90
2-286	20	80
2-287	20	90
2-288	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
1-210	20	90
2-210	20	80
1-212	20	90
1-288	20	100
1-289	20	90
2-289	20	80
1-291	20	80
2-291	20	90
2-292	20	80
1-271	20	80
2-47	20	90
6-34	20	90
1-339	20	90
2-339	20	100
1-49	20	100
2-49	20	90
1-41	20	80
1-229	20	90
2-229	20	80
1-47	20	80
1-33	20	90
6-259	20	90
1-155	20	80
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	80
2-156	20	80
6-262	20	80
2-211	20	90
2-272	20	100
2-276	20	80
1-276	20	80
1-274	20	90
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	90
2-158	20	90
1-83	20	100
2-83	20	100
1-89	20	90
2-89	20	100
6-76	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
6-161	20	90
1-342	20	90
1-343	20	100
2-342	20	90
1-344	20	90
2-343	20	90
1-345	20	90
2-344	20	80
1-346	20	100
2-345	20	100
1-195	20	100
1-185	20	100
2-185	20	80
1-186	20	80
1-349	20	90
1-350	20	80
2-348	20	100
1-351	20	100
2-349	20	100
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	80
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	90
1-353	20	100
1-354	20	100
2-352	20	80
2-354	20	90

Tabelle 28c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen SETVI in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	100
2-338	80	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	SETVI
3-338	80	90
6-253	80	100
1-81	80	90
2-81	80	90
2-148	80	80

Tabelle 29a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	5	100
2-129	5	100
1-129	5	100
6-116	5	90
3-338	5	80
1-26	5	90
2-26	5	80
1-208	5	90
2-208	5	80
3-208	5	80
1-130	5	80
2-130	5	80
1-131	5	80
2-131	5	90
1-149	5	90
2-149	5	90
6-124	5	90
5-59	5	90
5-58	5	90
5-117	5	100
5-75	5	90
5-74	5	80
5-123	5	90
5-122	5	90
1-82	5	90
1-87	5	80
2-87	5	80
1-88	5	90
2-88	5	90
1-4	5	80
1-25	5	80
2-25	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
1-27	5	100
2-27	5	100
1-173	5	80
2-173	5	100
1-273	5	90
2-273	5	80
3-273	5	80
6-212	5	80
1-44	5	80
2-46	5	80

Tabelle 29b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	20	100
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	100
2-338	20	90
3-338	20	100
2-337	20	90
3-337	20	100
1-26	20	90
2-26	20	90
3-26	20	90
6-26	20	80
1-208	20	90
2-208	20	100
3-208	20	90
6-159	20	90
2-125	20	80
3-125	20	80
1-130	20	80
2-130	20	80
6-117	20	90
1-81	20	90
2-81	20	90
2-82	20	80
6-58	20	80
1-147	20	80
2-147	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
1-148	20	90
2-148	20	80
1-131	20	100
2-131	20	90
6-118	20	100
1-149	20	90
2-149	20	90
6-124	20	90
5-59	20	100
5-58	20	90
5-117	20	100
5-253	20	80
5-75	20	100
5-74	20	90
5-123	20	90
5-122	20	100
1-82	20	90
1-87	20	100
2-87	20	90
1-88	20	90
2-88	20	100
1-209	20	90
1-4	20	90
1-25	20	100
2-25	20	100
3-27	20	80
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	100
1-273	20	100
2-273	20	90
3-273	20	90
6-212	20	90
1-44	20	80
2-44	20	80
1-45	20	80
6-32	20	80
1-46	20	80
2-46	20	80
6-33	20	80

Tabelle 29c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen STEME in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	STEME
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	90
2-337	80	90
6-117	80	90
1-81	80	90
2-81	80	100
2-82	80	90
6-58	80	80
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	80

Tabelle 30a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen VERPE in %

5

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
1-129	5	80
2-337	5	80
1-149	5	80
1-87	5	80
1-88	5	80
1-44	5	80
2-46	5	80
1-304	5	80
1-132	5	90
1-135	5	80
2-133	5	80
1-277	5	80
2-277	5	80
1-278	5	80
1-279	5	80
1-57	5	80
2-207	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-271	5	80
2-32	5	90
1-72	5	80
1-73	5	80
2-73	5	80
1-74	5	80
1-183	5	80
2-286	5	80
2-287	5	80
1-289	5	80
2-289	5	80
1-271	5	80
1-165	5	80
1-166	5	80
1-341	5	80
1-292	5	80
1-89	5	90
2-89	5	80
1-346	5	80
1-353	5	80

Tabelle 30b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen VERPE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-129	20	80
1-129	20	80
2-338	20	90
3-338	20	90
6-253	20	80
2-337	20	100
3-337	20	90
2-123	20	80
1-26	20	80
1-208	20	80
2-208	20	80
1-81	20	80
2-81	20	80
2-82	20	80
1-147	20	90
2-147	20	80
1-148	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-148	20	80
1-131	20	90
1-149	20	100
5-59	20	80
5-58	20	80
5-117	20	80
5-122	20	80
1-82	20	80
1-87	20	90
2-87	20	80
1-88	20	90
2-88	20	80
1-209	20	80
1-25	20	80
2-25	20	90
1-27	20	100
2-27	20	80
2-173	20	80
1-273	20	90
3-273	20	80
1-44	20	100
2-44	20	80
1-45	20	80
1-46	20	90
2-46	20	80
1-31	20	80
2-31	20	80
1-304	20	80
2-304	20	90
1-305	20	80
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	90
1-177	20	80
2-177	20	80
1-178	20	80
1-179	20	80
1-132	20	90
1-135	20	90
2-135	20	90
6-254	20	80
1-134	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-134	20	80
1-133	20	90
2-133	20	80
6-120	20	80
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	100
1-279	20	100
2-279	20	90
1-197	20	80
2-227	20	80
1-227	20	80
1-225	20	90
1-226	20	90
2-226	20	90
2-196	20	80
1-56	20	90
2-57	20	90
1-58	20	80
2-56	20	80
1-57	20	90
1-207	20	90
2-207	20	90
2-271	20	90
2-32	20	90
1-34	20	90
2-34	20	80
6-255	20	80
2-42	20	90
2-146	20	80
1-37	20	80
2-37	20	80
1-72	20	90
2-72	20	80
1-73	20	80
2-73	20	90
1-74	20	90
2-74	20	80
1-183	20	90
2-183	20	90
1-181	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
1-228	20	90
1-230	20	80
2-230	20	90
2-286	20	80
1-287	20	80
2-287	20	100
2-288	20	80
1-212	20	80
1-289	20	90
2-289	20	100
1-291	20	80
2-291	20	80
2-292	20	80
1-271	20	90
2-47	20	80
1-339	20	90
2-339	20	80
6-258	20	80
1-49	20	90
1-340	20	80
2-340	20	90
1-47	20	80
1-33	20	80
1-32	20	90
1-155	20	80
1-165	20	80
1-166	20	90
1-156	20	80
2-156	20	90
1-276	20	80
1-274	20	80
1-272	20	80
1-341	20	90
1-292	20	90
1-83	20	90
2-83	20	80
1-89	20	90
2-89	20	90
1-342	20	80
1-343	20	80
1-344	20	90
1-345	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-344	20	80
1-346	20	80
2-345	20	80
1-347	20	90
2-346	20	80
1-195	20	80
1-185	20	80
2-186	20	80
1-349	20	80
1-84	20	90
2-84	20	80
1-352	20	90
2-350	20	80
1-86	20	90
1-92	20	90
2-92	20	90
1-90	20	90
1-353	20	90
2-351	20	90
1-354	20	90
2-352	20	90
1-355	20	90
2-353	20	100
1-356	20	90
2-354	20	90

Tabelle 30c : Nachauflaufwirkung bei 80g/ha gegen VERPE in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
3-129	80	80
2-129	80	90
1-129	80	100
6-116	80	90
1-338	80	100
2-338	80	100
3-338	80	90
6-253	80	90
2-337	80	100
6-117	80	80
1-81	80	90
2-81	80	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VERPE
2-82	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	80
2-148	80	90

Tabelle 31a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	5	80
2-129	5	80
1-129	5	80
1-26	5	100
1-208	5	80
2-208	5	100
3-208	5	100
1-125	5	100
2-125	5	100
1-130	5	90
2-130	5	90
1-131	5	100
2-131	5	100
1-149	5	100
2-149	5	100
5-58	5	80
5-117	5	90
5-123	5	80
5-122	5	90
2-88	5	80
1-209	5	100
1-25	5	100
2-25	5	80
3-27	5	80
1-27	5	100
2-27	5	100
1-173	5	90
1-273	5	100
1-45	5	80
2-45	5	80
1-46	5	80
2-46	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VOTR
1-304	5	80
2-304	5	80
6-231	5	90
1-305	5	90
2-305	5	80
2-306	5	90
1-177	5	90
2-177	5	80
1-178	5	80
1-179	5	80
2-179	5	90
1-132	5	80
1-135	5	80
1-134	5	90
2-134	5	80
1-277	5	80
2-277	5	90
1-278	5	90
2-278	5	90
1-279	5	90
2-279	5	80
2-195	5	100
2-225	5	100
2-227	5	90
1-227	5	100
2-197	5	80
1-226	5	100
2-226	5	90
1-56	5	100
2-57	5	90
1-58	5	90
2-58	5	100
2-56	5	80
1-57	5	100
1-207	5	100
2-207	5	100
2-271	5	80
1-146	5	80
1-73	5	80
1-74	5	80
1-183	5	90
2-183	5	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-182	5	100
2-287	5	80
2-288	5	90
1-212	5	80
1-288	5	90
1-289	5	80
1-291	5	90
2-291	5	80
2-47	5	80
1-83	5	90
2-83	5	80
1-89	5	90
2-89	5	90
1-345	5	90
2-344	5	90
1-346	5	90
2-345	5	90
1-347	5	80
2-346	5	80
1-195	5	90
2-185	5	100
1-84	5	100
2-84	5	100
1-352	5	100
2-350	5	100
1-86	5	90
2-86	5	100
2-92	5	100
1-90	5	80
2-90	5	100
1-353	5	100
2-351	5	100

Tabelle 31b : Nachauflaufwirkung bei 20g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	20	90
2-129	20	100
1-129	20	100
6-116	20	80
2-338	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-338	20	90
6-253	20	80
1-337	20	80
3-337	20	100
1-123	20	100
1-26	20	100
2-26	20	80
3-26	20	90
6-26	20	100
1-208	20	100
2-208	20	100
3-208	20	100
1-125	20	100
2-125	20	100
3-125	20	80
1-130	20	90
2-130	20	100
2-82	20	80
1-148	20	80
1-131	20	100
2-131	20	100
6-118	20	80
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	100
5-59	20	80
5-58	20	80
5-117	20	100
5-75	20	80
5-123	20	90
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	80
2-87	20	100
1-88	20	80
2-88	20	90
1-209	20	100
1-25	20	100
2-25	20	90
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VOTR
1-173	20	90
2-173	20	100
1-273	20	100
1-44	20	80
2-44	20	80
1-45	20	90
2-45	20	100
1-46	20	80
2-46	20	80
1-304	20	90
2-304	20	90
6-231	20	90
1-305	20	90
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	90
1-177	20	90
2-177	20	100
1-178	20	80
2-178	20	90
6-141	20	80
1-179	20	90
2-179	20	100
1-132	20	90
2-132	20	90
1-135	20	90
2-135	20	90
1-134	20	90
2-134	20	90
1-133	20	80
2-133	20	80
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-279	20	90
2-195	20	100
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VOTR
2-197	20	100
1-225	20	80
1-226	20	100
2-226	20	100
6-165	20	80
1-56	20	100
2-57	20	100
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
2-271	20	80
6-210	20	80
1-140	20	80
1-146	20	100
1-37	20	80
1-72	20	90
2-72	20	80
6-49	20	80
1-73	20	80
2-73	20	100
6-50	20	80
1-74	20	90
2-74	20	80
1-180	20	90
2-180	20	100
1-183	20	90
2-183	20	100
1-182	20	100
2-182	20	100
1-228	20	80
2-228	20	80
2-286	20	80
1-287	20	80
2-287	20	90
2-288	20	100
1-210	20	90
2-210	20	90
1-212	20	90
2-213	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VOTR
1-288	20	90
1-289	20	90
2-289	20	90
1-291	20	100
2-291	20	90
2-292	20	80
1-271	20	90
2-47	20	90
2-47	20	80
2-340	20	80
1-47	20	80
1-33	20	80
1-32	20	80
2-155	20	80
1-165	20	80
1-166	20	80
2-156	20	80
2-272	20	80
2-276	20	80
1-276	20	80
1-274	20	80
1-272	20	90
1-341	20	80
1-292	20	80
1-83	20	90
2-83	20	80
1-89	20	90
2-89	20	90
1-342	20	80
1-343	20	80
2-342	20	80
2-343	20	90
1-345	20	100
2-344	20	100
1-346	20	100
2-345	20	90
1-347	20	100
2-346	20	100
1-195	20	100
1-184	20	90
1-185	20	80
2-185	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
2-186	20	80
2-348	20	80
1-351	20	80
2-349	20	80
1-84	20	100
2-84	20	100
1-352	20	100
2-350	20	100
1-86	20	100
2-86	20	100
1-92	20	100
2-92	20	100
1-90	20	100
2-90	20	100
1-353	20	100
2-351	20	100
1-354	20	90
2-352	20	90
1-355	20	100
2-353	20	80
1-356	20	90
2-354	20	100

Tabelle 31c : Nachaufwirkung bei 80g/ha gegen VIOTR in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
3-129	80	100
2-129	80	100
1-129	80	100
6-116	80	100
1-338	80	90
2-338	80	100
3-338	80	100
6-253	80	80
2-337	80	90
6-117	80	80
1-81	80	80
2-81	80	90
2-82	80	80
1-147	80	80
2-147	80	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	VIOTR
1-148	80	90
2-148	80	80

Tabelle 32a : Nachauflaufwirkung bei 5g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-26	5	90
2-26	5	90
6-26	5	90
1-208	5	80
2-208	5	80
6-159	5	80
1-130	5	90
2-130	5	80
1-131	5	100
2-131	5	90
6-118	5	100
1-149	5	100
2-149	5	100
5-59	5	90
5-58	5	90
5-117	5	90
5-75	5	90
5-74	5	90
5-123	5	90
5-122	5	90
1-82	5	90
1-87	5	100
2-87	5	90
1-88	5	90
2-88	5	90
1-4	5	80
1-25	5	90
2-25	5	80
1-27	5	90
2-27	5	100
1-173	5	90
1-273	5	90
2-273	5	80
3-273	5	80
6-212	5	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-44	5	80
1-45	5	80
6-32	5	80
1-46	5	80
2-305	5	80
1-306	5	90
2-306	5	80
1-177	5	90
1-179	5	90
6-254	5	80
1-133	5	90
1-277	5	90
2-277	5	90
1-278	5	90
2-278	5	90
1-279	5	90
2-279	5	90
2-195	5	80
1-197	5	100
1-227	5	100
1-225	5	90
1-226	5	90
1-56	5	90
6-45	5	90
6-44	5	80
2-57	5	90
6-43	5	90
1-58	5	100
2-58	5	100
2-56	5	90
1-57	5	100
1-207	5	90
2-207	5	80
6-210	5	90
1-34	5	80
2-34	5	80
6-255	5	90
6-256	5	80
1-181	5	90
1-228	5	90
2-228	5	80
2-286	5	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-287	5	100
2-287	5	90
2-288	5	90
1-210	5	80
2-210	5	80
1-212	5	90
1-288	5	90
1-289	5	90
2-289	5	90
1-291	5	90
2-291	5	90
2-292	5	90
1-271	5	90
2-47	5	90
1-339	5	90
2-339	5	80
1-49	5	80
2-49	5	90
1-41	5	80
1-229	5	90
2-340	5	80
1-155	5	90
6-260	5	90
1-165	5	90
1-166	5	90
2-272	5	90

Tabelle 32b : Nachaufwirkung bei 20g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-26	20	100
2-26	20	90
6-26	20	90
1-208	20	90
2-208	20	90
6-159	20	90
1-130	20	90
2-130	20	80
6-117	20	80
1-81	20	80
2-81	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-82	20	90
6-58	20	80
1-147	20	90
2-147	20	90
1-148	20	90
2-148	20	90
1-131	20	100
2-131	20	90
6-118	20	100
1-149	20	100
2-149	20	100
6-124	20	90
5-59	20	90
5-58	20	100
5-117	20	90
5-253	20	80
5-75	20	90
5-74	20	90
5-123	20	90
5-122	20	90
1-82	20	90
1-87	20	100
2-87	20	90
1-88	20	90
2-88	20	90
6-75	20	90
1-209	20	90
1-4	20	90
1-25	20	100
2-25	20	90
3-27	20	100
1-27	20	100
2-27	20	100
1-173	20	100
2-173	20	80
1-273	20	90
2-273	20	90
3-273	20	90
6-212	20	90
1-44	20	90
1-45	20	80
2-45	20	80

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
6-32	20	80
1-46	20	80
2-31	20	80
2-28	20	80
1-304	20	90
1-305	20	80
2-305	20	90
1-306	20	90
2-306	20	90
1-177	20	90
6-141	20	80
1-179	20	90
1-132	20	90
2-132	20	80
1-135	20	90
2-135	20	80
6-254	20	90
1-134	20	90
2-134	20	80
1-133	20	90
1-277	20	90
2-277	20	90
1-278	20	90
2-278	20	90
1-279	20	90
2-279	20	90
2-195	20	90
2-225	20	100
1-197	20	100
2-227	20	100
1-227	20	100
2-197	20	90
1-225	20	90
1-226	20	100
2-226	20	80
6-165	20	90
2-196	20	90
1-56	20	100
6-45	20	90
6-44	20	90
2-57	20	100
6-43	20	100

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-58	20	100
2-58	20	100
2-56	20	100
1-57	20	100
1-207	20	100
2-207	20	100
6-210	20	90
2-32	20	90
1-34	20	90
2-34	20	100
6-255	20	100
6-256	20	90
1-181	20	90
1-228	20	90
2-228	20	80
1-230	20	90
2-230	20	90
2-286	20	90
1-287	20	100
2-287	20	90
2-288	20	90
1-210	20	90
2-210	20	90
1-212	20	100
2-212	20	100
2-213	20	90
1-288	20	100
1-289	20	90
2-289	20	100
6-228	20	80
1-291	20	100
2-291	20	100
2-292	20	90
1-271	20	100
2-47	20	90
6-34	20	80
1-339	20	90
2-339	20	90
6-258	20	90
1-49	20	90
2-49	20	90
1-41	20	90

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
1-229	20	90
1-340	20	90
2-340	20	90
1-47	20	90
1-33	20	90
2-154	20	90
6-259	20	90
1-155	20	90
6-260	20	90
1-164	20	80
6-261	20	90
1-165	20	90
1-166	20	90
1-156	20	90
2-156	20	80
6-262	20	90
6-264	20	80
2-211	20	80
2-272	20	90

Tabelle 32c : Nachaufwirkung bei 80g/ha gegen DIGSA in %

Beispielnummer	Dosierung [g/ha]	DIGSA
2-337	80	90
6-117	80	90
1-81	80	90
2-81	80	90
2-82	80	90
6-58	80	90
1-147	80	90
2-147	80	90
1-148	80	90
2-148	80	90

5

Vergleichsversuche

In den folgenden Versuchen wurde die herbizide Wirkung zahlreicher erfindungsgemäßer und die der strukturell nächsten aus D1 (WO 2012/028579 A1) bekannten Verbindungen unter den oben genannten

Bedingungen im Voraufbau und Nachaufbau verglichen. Die in den Tabellen genannten Beispiel-Nr. beziehen sich auf die in den jeweiligen Dokumenten offenbarten Verbindungen.

Tabelle 5: Herbizide Wirkung im Voraufbau

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	AVEFA	ABUTH	MATIN	STEME	VIOTR
1-129, erfindungsgemäß	80	100	100	100	100	100	100
4-251, aus D1	80	0	0	50	70	70	0

5

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	AVEFA	SETVI	AMARE	STEME	VIOTR
1-147, erfindungsgemäß	80	90	100	100	100	100	100
4-251, aus D1	80	0	0	20	70	70	0

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen				
		ALOMY	AVEFA	SETVI	STEME	HORMU
2-147, erfindungsgemäß	80	90	100	100	70	90
5-251, aus D1	80	0	0	80	40	10

10

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		AVEFA	MATIN	ABUTH	AMARE	STEME	VIOTR
1-129, erfindungsgemäß	20	100	100	100	100	100	100
4-251, aus D1	20	0	0	40	0	30	80

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		AVEFA	SETVI	ABUTH	MATIN	POLCO	VIOTR
2-129, erfindungsgemäß	20	100	100	100	100	100	100
5-251, aus D1	20	0	30	70	70	40	80

Tabelle 6: Herbizide Wirkung im Nachauflauf

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	AVEFA	MATIN	PHBPU	POLCO	VIOTR
1-147, erfindungsgemäß	20	80	90	100	80	90	70
4-251, aus D1	20	20	0	30	60	30	50

5

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	AVEFA	LOLRI	MATIN	PHBPU	HORMU
2-147, erfindungsgemäß	20	80	90	70	100	70	80
5-251, aus D1	20	60	30	30	50	50	30

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	ECHCG	SETVI	ABUTH	STEME	VIOTR
1-129, erfindungsgemäß	5	90	100	100	100	100	80
4-251, aus D1	5	0	50	0	70	60	20


10

Beispiel-Nr.	Dosierung (g a.i./ha)	Herbizide Wirkung gegen					
		ALOMY	AVEFA	SETVI	AMARE	MATIN	HORMU
2-129, erfindungsgemäß	5	100	100	100	100	80	80
5-251, aus D1	5	30	20	30	80	30	20

Patentansprüche


1. Isothalsäurediamide der Formel (I) und deren Salze

5




worin die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:


Q bedeutet Q¹, Q², Q³ oder Q⁴




(Q¹)



(Q²)



(Q³)



(Q⁴)

10

R¹ bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl,

R² bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl,

15

R^x bedeutet (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Alkyl-O-(C₁-C₆)-alkyl oder Phenyl,

R^y bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl oder Halogen-(C₁-C₆)-alkyl,

20

R^z bedeutet Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl oder Halogen-(C₁-C₆)-alkyl,

X bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, R¹O, R²(O)_nS oder R¹O-(C₁-C₆)-Alkyl oder R²S(O)_n-(C₁-C₆)-Alkyl,

25

Y bedeutet Halogen, (C₁-C₆)-Alkyl, Halogen-(C₁-C₆)-alkyl, R¹O oder R²(O)_nS,

Z bedeutet Wasserstoff,

jeweils durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus Halogen, Cyano, R¹C(O), R¹OC(O), R¹O und R²(O)_nS substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl-(C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-Alkyl-O-(C₁-C₆)-alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkenyl-(C₁-C₆)-alkyl, (C₂-C₆)-Alkynyl, (C₂-C₆)-Alkynyl-(C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, R²S(O)_n-(C₁-C₆)-Alkyl, R¹C(O),

30

$R^1OC(O)$, $R^1C(O)-(C_1-C_6)$ -Alkyl, $R^1OC(O)-(C_1-C_6)$ -Alkyl, $R^1NH-(C_1-C_6)$ -Alkyl, $R^1_2N-(C_1-C_6)$ -Alkyl, $R^1NHC(O)-(C_1-C_6)$ -Alkyl oder $R^1_2NC(O)-(C_1-C_6)$ -Alkyl,

oder


5 jeweils durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus Halogen, (C_1-C_6) -Alkyl, Halogen- (C_1-C_6) -alkyl, (C_1-C_6) -Alkoxy, Halogen- (C_1-C_6) -alkoxy, $R^1C(O)$ und $R^1OC(O)$ substituiertes Phenyl, Benzyl, Phenyl, Benzyl, Heterocyclyl oder Heterocyclyl- (C_1-C_6) -alkyl,

n bedeutet 0, 1 oder 2,

10 s bedeutet 0, 1, 2 oder 3.

2. Isophthalsäurediamide gemäß Anspruch 1, worin


15 Q bedeutet Q^1 , Q^2 , Q^3 oder Q^4




(Q^1)



(Q^2)



(Q^3)



(Q^4)

R^x bedeutet Me, Et, Pr, i-Pr, c-Pr, $(CH_2)_2OMe$ oder Ph,

20 R^y bedeutet Cl, Me, Et oder CF_3 ,

R^z bedeutet Wasserstoff, Me, Et oder CF_3 ,

25 X bedeutet Halogen, (C_1-C_6) -Alkyl, Halogen- (C_1-C_6) -alkyl, c-Pr, OMe, OEt, SMe, SEt, SO_2Me , SO_2Et , CH_2OMe , CH_2SMe , CH_2SO_2Me , $(CH_2)_2SMe$ oder $(CH_2)_2SO_2Me$,

Y bedeutet Halogen, Halogen- (C_1-C_6) -alkyl, OMe, SMe, $S(O)Me$, SO_2Me , SEt, $S(O)Et$ oder SO_2Et ,

30 Z bedeutet Wasserstoff, (C_1-C_6) -Alkyl, (C_3-C_6) -Cycloalkyl, CH_2c -Pr, Halogen- (C_1-C_6) -alkyl, $(CH_2)_2OMe$, $(CH_2)_2OEt$, Allyl, Propinyl, $(CH_2)_2SMe$, $(CH_2)_2SO_2Me$, $C(O)Me$, $C(O)cPr$, $C(O)OMe$, $C(O)OEt$, CH_2 -(tetrahydrofuran-2-yl), Oxetan-3-yl, $CH_2C(O)Me$, $CH_2C(O)cPr$, $CH_2C(O)NMe_2$, CH_2CN , Ph, CH_2Ph oder CH_2 -(thien-2-yl), OMe, OEt, OPr, Oi-Pr.

3. Isophthalsäurediamide gemäß Anspruch 1 oder 2, worin
- 5 Q bedeutet Q1 oder Q4,
- R^x bedeutet Me, Et oder Pr,
- R^z bedeutet H oder Me,
- 10 X bedeutet F, Cl, Br, I, Me, Et, c-Pr, OMe, SMe, SEt, CH₂OMe oder CF₃,
- Y bedeutet F, Cl, Br, I, SMe, S(O)Me, SO₂Me, CF₃, CHF₂ oder C₂F₅,
- 15 Z bedeutet Wasserstoff, Me, Et, c-Pr, Pr, i-Pr, c-Bu, CH₂-c-Pr, CH₂CHF₂, CH₂CF₃, CH(Me)-c-Pr, (CH₂)₂OMe, (CH₂)₂SMe, CH₂CN, CH₂-(tetrahydrofuran-2-yl), CH₂C(O)NMe₂, Ph oder CH₂-(thien-2-yl), Oxetan-3-yl, OMe, OEt, OPr, Oi-Pr.
- 20 4. Herbizides Mittel oder pflanzenwachstumsregulierendes Mittel, dadurch gekennzeichnet, dass es eine oder mehrere Isophthalsäurediamide der allgemeinen Formel (i) oder deren Salze nach einem der Ansprüche 1 bis 3 enthält.
5. Herbizide Mittel nach Anspruch 4, die ferner ein Formulierungshilfsmitteln enthalten.
- 25 6. Herbizide Mittel nach Anspruch 4 oder 5 enthaltend mindestens einen weiteren Wirkstoff aus der Gruppe der Insektizide, Akarizide, Herbizide, Fungizide, Safenern und/oder Wachstumsregulatoren.
- 30 7. Herbizide Mittel nach Anspruch 4 oder 5 enthaltend einen Safener.
8. Herbizide Mittel nach Anspruch 7, worin der Safener ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Mefenpyr-diethyl, Cyprosulfamid, Isoxadifen-ethyl, Cloquintocet-mexyl, Benoxacor und Dichlormid.
- 35 9. Verfahren zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, dass man eine wirksame Menge mindestens eines Isophthalsäurediamids der Formel (I) gemäß einem der

Ansprüche 1 bis 3 oder eines herbiziden Mittels nach einem der Ansprüche 4 bis 8 auf die Pflanzen oder auf den Ort des unerwünschten Pflanzenwachstums appliziert.

10. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder von
5 herbiziden Mitteln nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen.
11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Isophthalsäurediamide der Formel (I) zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen in Kulturen von Nutzpflanzen eingesetzt werden.
- 10
12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Nutzpflanzen transgene Nutzpflanzen sind.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2021/058608

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>C07D 257/06</i> (2006.01)i; <i>C07D 271/08</i> (2006.01)i; <i>C07D 403/12</i> (2006.01)i; <i>A01N 43/713</i> (2006.01)i; <i>A01N 43/82</i> (2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2012028579 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]; BRAUN RALF [DE] ET AL.) 08 March 2012 (2012-03-08) cited in the application page 42, compound 1-251; page 63, compound 2-251; page 88, compound 3-251; page 117, compound 4-251; page 163, compound 5-251; page 199, compound 6-252;claims	1-12
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>“&” document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 14 June 2021		Date of mailing of the international search report 22 July 2021
Name and mailing address of the ISA/EP European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer Beys-Kahana, Ellen Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2021/058608

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2012028579	A1	08 March 2012	AR	082828	A1	09 January 2013
				AU	2011298424	A1	21 March 2013
				BR	112013005070	A2	26 April 2016
				CA	2809487	A1	08 March 2012
				CN	103282354	A	04 September 2013
				CO	6670599	A2	15 May 2013
				DK	2611785	T3	25 August 2014
				EA	201390265	A1	30 August 2013
				EP	2611785	A1	10 July 2013
				ES	2503815	T3	07 October 2014
				HR	P20140779	T1	07 November 2014
				IL	224757	A	30 June 2015
				JP	5805767	B2	10 November 2015
				JP	2013536817	A	26 September 2013
				KR	20130101506	A	13 September 2013
				MX	339739	B	07 June 2016
				MY	162780	A	14 July 2017
				PL	2611785	T3	31 October 2014
				PT	2611785	E	09 September 2014
				TW	201221059	A	01 June 2012
				UA	109150	C2	27 July 2015
				US	2012058892	A1	08 March 2012
				UY	33583	A	30 March 2012
				WO	2012028579	A1	08 March 2012
				ZA	201302334	B	25 September 2014

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2021/058608

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. C07D257/06 C07D271/08 C07D403/12 A01N43/713 A01N43/82 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C07D		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2012/028579 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]; BRAUN RALF [DE] ET AL.) 8. März 2012 (2012-03-08) in der Anmeldung erwähnt Seite 42, Verbindung 1-251; Seite 63, Verbindung 2-251; Seite 88, Verbindung 3-251; Seite 117, Verbindung 4-251; Seite 163, Verbindung 5-251; Seite 199, Verbindung 6-252; Ansprüche -----	1-12
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 14. Juni 2021		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 22/07/2021
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Beyss-Kahana, Ellen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2021/058608

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2012028579 A1	08-03-2012	AR 082828 A1	09-01-2013
		AU 2011298424 A1	21-03-2013
		BR 112013005070 A2	26-04-2016
		CA 2809487 A1	08-03-2012
		CN 103282354 A	04-09-2013
		CO 6670599 A2	15-05-2013
		DK 2611785 T3	25-08-2014
		EA 201390265 A1	30-08-2013
		EP 2611785 A1	10-07-2013
		ES 2503815 T3	07-10-2014
		HR P20140779 T1	07-11-2014
		IL 224757 A	30-06-2015
		JP 5805767 B2	10-11-2015
		JP 2013536817 A	26-09-2013
		KR 20130101506 A	13-09-2013
		MX 339739 B	07-06-2016
		MY 162780 A	14-07-2017
		PL 2611785 T3	31-10-2014
		PT 2611785 E	09-09-2014
		TW 201221059 A	01-06-2012
		UA 109150 C2	27-07-2015
		US 2012058892 A1	08-03-2012
		UY 33583 A	30-03-2012
		WO 2012028579 A1	08-03-2012
		ZA 201302334 B	25-09-2014
