

善
510.87
12-1
20

20



63291

重刊孫真人備急千金要方卷之十八 大腸腑

大腸腑脉論第一



論曰大腸腑者主肺也鼻在中央是其候也肺合氣於大

腸大腸者為行道傳寫之腑也號監倉椽重二斤十二兩

長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀

一斗二升主十二時定血脉和利精神金明堂外臺同

尺大四寸徑一寸之少半 臍遠以長以候大腸

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也若少氣心下有水氣

立秋節即效刺手太陰治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也若腸中切痛如針刀所

刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬之日重感于寒則壯當臍

而痛不能久方與胃同候取巨虛上廉

腸中雷鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺育之原巨

虛上廉三里

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸有寒驚澹有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便利噎氣客於

大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裹大者大

腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相

離者大腸結

扁鵲云手太陰與陽明為表裏大腸泄瀉病實則傷熱熱則

脹滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食下胃胃
而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒
則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸水苦
大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

手陽明之脈起於大指次指之端外側循指上廉出合谷
兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外
則廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡
肺下膈屬大腸其肢者從缺盆直而上頸貫頰入下齒縫
口還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病
齒痛頰腫是主津所生病者目黃口乾鼻衄喉痺有前臆
痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則
寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小

於寸口也

大腸虛實第一 脈二條 灸法七首

方一首

大腸實熱

右手寸口氣口以前前脈陽實者手陽明經也

病苦腸滿善喘發面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

生薑泄腸湯 治大腸實熱腹脹不通口為生瘻者方

生薑

楮皮

青竹茹

黃芩

梔子人

白朮

各三兩

桂心

壹兩

茯苓

芒消

各二兩

生地黃

拾兩

大棗

拾肆枚

右十一味以水七升煮取三升去滓下芒消勿服

治腸中腫脹不消方

灸大腸輸四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也

病苦胃中喘腸鳴虛渴唇乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

黃連補湯治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐方

黃連 四兩

茯苓

芎藭 各參兩

酸石榴皮

五片 地榆 五兩

伏龍肝

雞子大壹枚

右六味以水七升煮取一升半去滓下伏龍肝末分服

治腸中雷鳴相逐痢下方

灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各三寸半

沿腸中常鳴時上衝心方

灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之

腹脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛濯濯冬日重感於

寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫

俠臍急天樞主之

腸鳴而痛溫留主之

肛門論第三

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事人之中史重十
二兩長一尺二寸廣二寸二分應十一一時若臍傷熱則以

門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若筋傷寒則肛門開大
行洞寫肛門出出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和
平依經調理方見第二十四卷中

皮虛實第四論一首 方一首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膏肉若病從外
主則皮毛膏肉燥枯強急若病從內發則骨髓痛疼然陰
陽表裏外內隨其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實
者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱則應
補寒則應刺

治皮虛主大腸病寒氣閉格方

胡蘆根葉切分

桃葉皮枝切分

葛蒲葉切分

細糠壹斗

秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯之於盆上作小竹牀子置盆入身坐牀中四面周迴將蓆薦障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通身接汗可得兩食久許如此三日蒸還溫藥足汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火淋但治寒但是皮膚一切勞冷悉皆治之

梳子 治皮實主肺病熱氣方

梳子人

枳實

大青

杏人

柴胡

芒消 各貳兩

生地黄

淡竹葉 切各壹升

生玄參 五兩

石膏 捌兩

右十味以水九升煮取二升去滓下芒消分為二服

欬嗽第五

論一五首

方六十一首

證七條

灸法十四首

論曰經云五臟六腑皆令效肺居外而近上合於皮毛皮
毛喜受邪故肺獨易為效也邪客於肺則寒熱上氣喘汗
出效動有背喉鳴甚則唾血肺效經久不已傳入大腸其
狀效則遺糞腎效者其狀引腰背痛甚則效涎腎效經久
不已傳入膀胱其狀效則遺尿肝效者其狀左脅痛甚者
不得轉側肝效經久不已傳入膽其狀效則清苦汁出心
熱者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心效經
久不已傳入小腸其狀效則失氣脾效者其狀右脅痛陰
陰引肩背甚者不得動動則效劇經久不已傳入胃其狀
效而嘔嘔甚則長蟲出久效不已二焦受之二焦效之狀
效而腹滿不能飲食此皆效於胃關於肺使人多涕唾而
面浮腫氣逆也右順時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間

入新臟為熱上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與
肺合則熱嗽上氣或胃脇又痛或唾有血者是也熱得非
時之寒暴薄之氣得漸散伏結深喜肺難也因熱服溫藥
反先劇反壯熱心腹血汗出惡寒是也天有非時寒者急

春四時之氣

皆曰欲病有十何謂也師曰有風熱有寒熱有肢熱有肝
熱有心熱有脾熱有時熱有時熱有肺熱有胃陰熱問曰
十熱之證以何為異師曰欲語因熱舌白不得竟謂之風熱
飲冷食寒因之而熱謂之寒熱心下堅滿熱則支痛其脈
反遲謂之肢熱熱則引脅下痛謂之肝熱熱而唾血引手
少陰謂之心熱熱而涎出續續不止引小腹謂之脾熱熱
引頸項而唾涎沫謂之肺熱熱則耳無所聞引腰并臍中

謂之腎欬欬而引頤痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之
厥陰欬風欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺
手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽
欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

夫久欬為痰欬而時發熱脈在九菽一作半者非虛也此為
胃中寒實所致也當吐之

夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐耳
欬家其人脈弦為有水可與十棗湯下之方見不能卧出

者陰不受邪故也留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬

者如小兒掣縱狀夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過

度所致也其脈沈者不可發汗久欬數歲其脈弱者可治

實大數者死其脈虛者必善言其人本有支飲在胃中故

也治屬飲家上氣汗出而效屬飲家效而小便利若失溺不可發汗汗出即發逆冷

夫病吐血喘效上氣其脉數者有熱不得卧者死寒家效而上氣其脉數者死謂其人形損故也脉大而散散者為氣實而血虛名曰有表無裏上氣面肘腫有息其脉浮大不治加痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

青龍湯 治效逆倚息不得卧方

麻黃

芍藥

細辛

桂心

乾薑

甘草 各二兩

五味子

半夏

各半升

右八味咬咀以水一斗先煮麻黃減一升去上沫乃內

諸藥煮取三升去滓分三服弱者服半升若渴去半夏

加栝婁根二兩若微刺去麻黃加薤花如雞子大若食

飲噎者去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去
麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升

青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣從小

腹上衝胃咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小

便難時復冒者與茯苓甘草五味子湯治其氣衝

茯苓 肆兩

桂心

甘草

各貳兩

五味子 半升

右四味以水八升煮取三升去滓分三服溫服

衝氣即低而反更欬胃滿者用茯苓甘草五味子去桂加

乾薑細辛以治其欬滿方

茯苓 肆兩

甘草

乾薑

細辛

各貳兩

五味子 半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也

服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水方

半夏

五味子 各半升 茯苓 肆兩

細辛

乾薑

甘草 各貳兩

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痺故不內麻黃內杏仁方

杏仁

五味子

半夏 各半升 茯苓 肆兩

細辛

乾薑

甘草 各貳兩

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃利之方

大黃

乾薑

細辛

甘草

各二兩

茯苓

肆兩

五味子

半夏

杏仁

各半升

右八味咬咀以水一斗煮取二升去滓溫服半升日三

效而上氣肺脹其脉浮心下有水氣脇下痛引缺盆設若

有實者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之之方

石膏

乾薑

桂心

細辛

略

芍藥

甘草

略

麻黃

肆兩

半夏

半升

五味子

壹升

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃減一升下藥煮取二

升半強者服一升羸者減之小兒四合

仲景用治肺脹

下而喘脉浮者心

澤稼湯治上氣其脉沈者方

澤漆三斤細切以東流水伍斗煮取一斗伍升去滓益清半夏半升

牛薑一作紫苑白前各伍兩黃芩

甘草 桂心 人參各伍兩

右九味內澤漆汁中煮取五升每服五合日二夜一

麥門冬湯下氣止逆治大逆上氣咽喉不利方

麥門冬汁參升半夏壹升粳米參合

人參 甘草各貳兩大棗貳拾枚

右六味以水一斗二升煮取六升去滓服半升日三夜

射干麻黃湯治欬而上氣喉中如水雞聲者方

射干 細辛 款冬花 紫苑各伍兩麻黃

生薑各肆兩大棗柒枚半夏 五味子各半升

右九味以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫內

藥煮取三升去滓分三服日二

厚朴麻黃湯治欬而大逆上氣胷滿喉中不利如水雞聲

其脉浮者方

厚朴伍兩麻黃肆兩石膏伍兩細辛各兩乾薑各兩

小麥壹升杏仁半夏五味子各半升

右九味以水一斗二升煮小麥熟去麥內藥煮取

三升去滓分三服日二

麻黃石薑湯治上氣胷滿者方

麻黃肆兩石膏伍兩厚朴伍兩小麥壹升杏仁半升

右五味以水一斗先煮小麥熟去之下藥煮取三升去

滓分三服深師用治久逆上氣喉中如水雞鳴各小

皂莢圓治欬逆上氣時時唾濁但坐不得卧方

皂莢八兩為末蜜和丸如梧子大以棗膏和湯服三
九日二夜一必效方以酥炙皂莢

十棗湯夫有支飲家欬煩胃中痛者不卒死至一百日一
歲可與此方

大棗 拾枚 大戟 甘遂 芫花 各等分

右大戟甘遂芫花搗為末以水一升五合煮棗取八合
去滓內藥末強者一錢七羸者半錢頓服之平日服而
不下者明日更加藥半錢下後自然補養

欬而引脇下痛者亦十棗湯主之方見前

溫脾湯治食飽而欬者方

甘草 肆兩 大棗 貳拾枚

右一味咬咀以水五升煮取一升分三服溫服之法

中痛而聲鳴者加乾薑一兩

白部根湯治嗽不得卧兩眼突出方

百部根 生薑各一兩 細辛 甘草各一兩 貝母

五味子 白木各一兩 桂心肆兩 麻黃陸兩

右九味以水一斗二升煮取二升去滓分二服

錄用本方人肆

海藻湯治欬而下利胃中痞而短氣心中時悸四肢不欲

重手足煩不欲食肩背痛時惡寒方

海藻肆兩 五味子 半夏各半升 生薑壹兩

細辛貳兩 茯苓陸兩 杏仁伍拾枚

右七味以水一斗煮取三升去滓分三服日三

方無五味子生薑

白前湯 治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁不
得卧咽中作水雞鳴方

白前 紫苑 半夏 大戟各貳兩

右四味咬咀以水一斗浸一宿明日煮取三升分三服

治九種氣欬欲死白病方

乾薑 半夏 細辛 紫苑 吳茱萸

蕤花一作荒花茯苓 甘草 甘草 防葵

人參 烏頭 大黃 杏仁各壹葶藶貳分

巴豆 厚朴 白薇各叁五味子 遠志

前胡 菖蒲 枳實 蜀椒 皂莢

當歸 大戟 桂心各半

右二十八味為末蜜丸如梧子大先食服一九日三服

以知為度不知增之

紫菀散 治上氣嗽

麻黃半斤

杏仁百枚

甘草參兩

桂心壹兩

右四味治下節別研杏仁如脂內藥末和合臨氣上時服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至三匕氣發便服即止一方去桂心甘草

大醫令王叔和所撰御服**蜀椒圓**治上氣欬嗽甚良

蜀椒伍分

烏頭

杏仁

菖蒲

皂莢

礬石各壹分細辛各壹分

欬冬花

紫菀

乾薑各壹分

吳茱萸

麻黃各肆分

右十一味為末蜜丸梧子大暮卧吞二一九治二十年久

欬不過二十九

通氣園治久上氣欬嗽咽中腥臭虛氣憊心心痛眼疼耳中
嘈嘈風邪毒注時氣食不生肌胃中隔塞嘔逆多唾惡心
心下堅滿飲多食少惡疰淋痛病方

飴糖叁升 蜀椒貳升 杏仁壹升 蜈蚣伍節 大附子伍

乾薑 人參各肆分 桂心陸分 烏頭柒分 天門冬貳分

右十味為末別治杏仁如脂稍稍內藥末擣千杵烱糖
乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三四服
以膏中溫為度若夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食
不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加
烏頭二枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶一
兩

欬嗽上氣方

蜀椒

桂心

海蛤各肆分昆布

海藻

乾薑

細辛各陸分麥門冬拾分

右八味為末蜜九梧子大飲服十九加至二十一九日
服有人風虛中冷胷中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣
上欬欬服此方得瘥

治欬嗽胷膈支滿多唾上氣方

礬石鑿作

烏頭不助

菖蒲各壹分細辛

黃環各貳分

欬冬花

紫苑

杏仁各叁分

吳茱萸肆分

乾薑伍分

蜀椒伍分

右十一味為末蜜九梧子大每服一九著牙上咽汁日

五六服劇者常含不止

方薑汁膏升半

砂糖伍分

右一味煎薑汁減半內糖更煎服之

又方白糖伍分

皂莢末一方寸匕

右二味先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如小豆先食服二丸

又方酒

一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七

日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

又方巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三

枚

又方服芥子七丸以油酒下之

射干煎治欬嗽上氣方

生射干

欵冬花

紫苑

細辛

桑白皮

附子

甘草各貳分

白蜜

竹瀝

生薑汁

各五兩

升

飴糖

伍兩

右十一味以射干先內白蜜并竹瀝中煎五六沸去之
咬咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃
飴薑汁煎如餠服如酸棗丸日二劑者夜一不知加
之以知為度

杏人煎治冷嗽上氣鼻中不利方

杏人伍合

五味子

款冬花各伍兩

紫苑

乾薑

各貳兩

桂心叁兩

甘草

肆兩

麻黃壹斤

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠
飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得煎如飴先食服
如半棗許日一服不知加之以知為度

又方治忽暴嗽失聲語不出方

杏仁

薑汁

砂糖

蜜各壹升 五味子

紫苑

各壹兩

通草

貝母

各肆兩

桑根白皮

伍兩

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓內杏仁脂薑汁

蜜糖和攪微火煎取四升初服二合日再夜一後稍加

通草膏方

五味子

款冬花

通草

各叁兩

人參

細辛

青竹皮

桂心

葛蒲

各貳兩

杏仁

薑汁

各壹升

白蜜

貳升

棗膏

叁升

酥

伍升

右十二味咬咀以水五升微火煎二上二下去滓內薑

汁棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大一丸

杏仁飲子

治暴熱嗽方

杏仁

肆拾枚

紫蘇子

壹升

橘皮

壹兩

柴胡

肆兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服常作散服

蘇子煎治上氣欬嗽方

蘇子 生薑汁 地黃汁 白蜜 杏仁 栝實

右五味搗蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆又絞令味盡去滓熬杏仁令黃黑治如脂又以物澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置甑中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一程在無地黃汁

又方乾薑末 冬二兩 膠飴薑片

右一味和令調蒸五升米下冷以棗大含稍稍咽之日

五夜二

元化園治新久嗽方

羌花

乾薑 各貳兩

白蜜 貳升

右三味為末內蜜中令相和微火煎令如糜每服如棗

核大一枚日二夜一以知為度欲利者多服深師以治

治三升年久嗽者以水伍升煮羌花取
三升去滓內薑加蜜合煎如藥服之

欬冬煎 治同煎

欬冬花

乾薑末

紫苑 各伍兩

五味子

羌花 壹兩 熬令赤

右五味咬咀先以水一斗煮三味取三升半去滓內羌

花乾薑末加蜜二升合投湯中令調於銅器中微火煎

令如糖每服半棗許日二

治三升年久嗽或飲或欬寒氣嗽雖不同悉主之之方

細辛

欬冬花

防風

紫苑 各二兩

藜蘆 各二兩

蜀椒 伍合

右六味咬咀取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛次款
冬花次椒以大棗百枚間著諸藥間以水一斗一升
火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明日服
一枚以胃中溫溫為度甚強人欲嗽吐者可小增服之
便吐膿囊裹結吐後勿冷飲食效愈止藥藥勢靜乃食
不爾令人吐不已

治三二十年久嗽方

百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸匕日二服

外莖和飴膏片煎成煎以溫鴉散下深
師方以白蜜貳升更煎五六沸服叁合

又方紫苑 貳兩

款冬花 叁兩

右二味治下篩先食飲服一方寸匕日二服七日差

又方 白蜜壹斤

生薑貳斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止日服如棗大含一丸日三服禁一切雜食

治久嗽不瘥方

兔屎

肆拾玖枚 礪砂 貳分

胡桐律 壹分

右三味為末蜜和丸如梧子大每服三丸以粥飲下日三吐冷物盡即瘥

治積年欬喉中呖聲一發不得坐卧方

紫苑

貝母

半真

桑根白皮

五味子

射干

百部

各伍分 欬久花

皂莢

乾薑

橘皮

鬼督郵

細辛 各肆分 白石英

杏仁 各捌分 蜈蚣 臍核

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再稍加

至平九崔氏無半夏射干乾薑麻皮鬼督郵細辛白

湯送

又方 治三二十年上氣欬嗽唾膿血喘息不得卧方

欬冬花

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

芎藭 各伍分 人參

細辛

蕤花

紫苑

甘草

桔梗

防風

芫花

茯苓

皂莢 各叁分

右十六味為末蜜丸如梧子大酒服三五丸日二服

又方 欬冬花

紫苑

細辛

石斛

防風

芎藭

人參

當歸

藁本

甘草

蜀椒

白朮

半夏

天雄

菖蒲

鍾乳

桂心

蘇黃各壹兩獨活貳兩烏頭

羌花

附子貳兩附子各壹兩桃人貳兩大棗貳拾伍枚

右二十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日服

不知加之酒漬服亦得

又方

款冬花

乾薑

桂心

細辛貳分

杏仁

皂莢

紫苑各叁分

菖蒲

烏頭各壹分蜀椒伍分

礬石壹分吳茱萸伍分

右十一味為末蜜丸如梧子大酒服五九日二夜一二

十年嗽不過五十日愈果效咳嗽喉鳴上氣服一劑永瘳

治肺傷欬唾膿血腸澀背氣不能食惡風目暗疏疏早服

太冷方

白膠

生薑

各伍兩 桂心

人參

紫苑

各貳兩

大棗

貳拾枚

乾地黄

切半

桑白皮

切壹

芎藭

大麻人

飴糖

各壹升

大麥

叁升

右十一味 以水一斗五升 煮麥取一斗 去麥下藥

煮取二升 分五服

五味子湯 治唾中有膿 血牽胃腸痛方

五味子

桔梗

紫苑

甘草

續斷 各壹

竹茹

叁兩

赤小豆

壹升

地黄

各伍兩

右九味 以水九升 煮取一升 七合 分為二服

竹皮湯 治欬逆下血 不息方

生竹皮

叁兩

紫苑

貳兩

飴糖

壹斤

生地黄

切壹

右四味 以水六升 煮取一升 去滓 分二服

百部圓

治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根

冬三兩

升麻

半兩

桂心

五味子

甘草

紫苑

乾薑

各壹兩

右七味為末蜜和丸如梧子大每服二九日一以知為

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

牛薑汁

杏仁

各壹兩

糖

蜜

各壹兩

升

猪膏

貳合

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令淨薑如

膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜

六七服漸漸增加

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥二十斤二編鍊傳取凝當出醍醐服一合日三

服差止一切藥皆不出此神方

又方一鍊酥如雞子黃滴寒溫灌鼻中日再夜一

鍾乳七星散治寒冷欬嗽上氣脅滿唾膿血方又名吸散

鍾乳

礬石

欬冬花

桂心各等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日二不知加之數試大驗又云臨并吸之

又方鍾乳

細辛

欬冬花

天雄

紫苑

石膏各等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日日只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知小益之勿太多一

七星散治二三十年欬嗽方

欬冬花

紫苑

桑根白皮

代赭

細辛

伏龍肝各壹兩

右六味治下篩作七星聚聚如藕且者以竹筒口當藥
上一一吸咽之令藥入腹中先食日三三元服四日日復
作七星聚以一藥肉炙令熟以展轉藥聚上令藥柔悉徧
肉上仰卧咀嚼之細細咽汁令藥力散散割割然毒氣
入咽中藥力盡總咽却取瘥止未瘥復作如初羊牛鹿
肉皆可猪肉不可用

治嗽熏法

以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以硫黃末薄布艾
上務令調勻以荻一枝如紙長捲之作十枚先以火
燒纏下去荻煙從孔出口吸煙咽之取吐止明日復
熏之如前日一二止自然可瘥得食白粥餘皆忌恐
是熏黃如硫黃見火必燬矣

又方 熏黃一兩研令細以蠟紙并上熏黃令與蠟相入調
勻捲之如前法熏之亦如上法日一二止以吐爲度
七日將息後以羊肉羹補之

又方 爛青布廣四寸布上布艾艾上布青礬末礬上布少
熏黃末又布少鹽又布少豉末急捲之燒令著內燥
罐中以紙蒙頭更作一小孔口吸取煙細細咽之以
吐爲度若心腎悶時略歇煙盡止日一二度用二捲
不盡瘥二七日慎油膩

論曰凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體
悟之

灸法

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥。又以蒲當乳頭周匝

圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯。○又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯。三日畢兩邊者是口合度。○灸從大椎數下行第五節下第六節上穴在中間。此即神隨年壯并主上氣。○灸手屈臂中有橫文外骨捻頭得痛處十四壯良。

上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯。○上氣欬逆短氣風勞百病灸脊井一百壯。○上氣短氣欬逆胃背痛灸風門熱府百壯。○上氣欬逆胃滿短氣牽背痛灸巨闕期門各五十壯。○上氣欬逆短氣胃滿多唾唾惡冷痰灸肺輸五十壯。○上氣胃滿短氣欬逆灸雲門五十壯。○上氣欬逆胃痺背痛灸胃堂百壯不針。○上氣欬逆灸胃中五十壯。

上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜炎天瞿五十壯天突
逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痺
頸項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾
煩滿狂走易氣凡二十一病皆灸絕骨五十壯穴在內踝
上三寸宛宛中

痰飲第六

論一首
灸法一首

方四十一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲
問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間
漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在脅下欬唾引痛謂之懸
飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼重
謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得卧其人如腫謂之支
飲

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癩先寒即
爲虛先熱即爲實故水在於心其人心中堅築築短氣惡
水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其
人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿噯而痛水在於腎
心下悸

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者
則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦
者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短
氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沈
滑者留飲病病有留飲者脅下痛引缺盆嗽轉甚其人勢
而不得卧引項上痛欬者如小兒掣癢狀夫胃中有留飲
其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沈者有留飲也心下有

留飲其人背寒冷大如手病人有息上引此皆有溢飲在
胃中又者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上
之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒自汗自出其人振振
身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉
沉細此非風也必有飲在上焦其脉虛者為微勞榮衛氣
不周故也冬自瘥一本作夏自瘥
病痰飲者當用溫藥和之

半夏真湯病心腹虛冷遊痰氣上胃脇滿不下食嘔逆者

半夏壹升

生薑壹斤

橘皮肆兩

右三味以水一斗煮取三升分三服若心中急及
心痛內桂心四兩若腹滿痛內當歸二兩羸弱及老人
尤宜服之一方用人參二兩仲景無橘皮人參

又方 半夏壹升 生薑壹斤 桂心叁兩 甘草壹兩

右四味以水七升煮取二升半分三服

其草湯 治心下痰飲胃脅支滿目眩方

甘草貳兩 桂心 白木各叁兩 茯苓肆兩

右四味以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日

三小便當利

十葉湯 治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而效

者此為飲也 方見效嗽篇中

小青龍湯 病溢飲者當發其汗 方見效嗽篇中 范汪用大青龍湯

木防己湯 膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈者用此方

木防己叁兩 桂心貳兩 人參肆兩 石膏雞子大

右四味咬咀以水六升煮取一升分一服虛者即愈
者二日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒
消二合以水六升煮取一升去滓下消令烊分二服繼
下利即愈一方不加茯苓

厚朴大黃湯 夫酒客飲者必致吐血此坐久飲過度所致
也其脈虛者必冒其胃中本有支飲支飲腎滿主之之方

厚朴 壹尺

大黃 陸兩

枳實 肆兩

右三味咬咀以水五升煮取一升分爲一服溫服之

厚朴大黃湯

治支飲不得息方

見肺痿篇中

小半夏湯

嘔家不渴渴者爲欲解本渴今反不渴

心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴却嘔者此爲

水停心下小半夏加茯苓湯主之治卒嘔吐心下痞膈悶

有水目眩悸方

半夏膏升

茯苓 參兩

生薑半斤

右三味以水七升煮取一升五合去滓分再服溫服之胡治不用茯苓用桂心肆兩

五苓散假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癩眩水也此方

主之方見前第九卷中

腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目

木防已

大黃各壹兩

葶藶 貳兩

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服一九日二後稍增口中有津液止渴者加芒消半兩

甘遂半夏湯病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下

續堅滿此為留飲欲去故也此方主之

甘遂 大者

芍藥 各五枚

半夏 拾貳枚水半升

甘草 壹枚如指大水膏升煮取半升

右四味以蜜半升內一藥汁合得一升半煎取八合頓服之

大棗苓湯 主胃中結痰飲癖結臍下弦滿嘔逆不得食亦

主風水方

茯苓

白朮 各參兩

當歸

橘皮

附子 各參兩

半夏

半夏

桂心

細辛 各肆兩一作人參

右九味以水一斗煮取三升去滓分三服

茯苓湯 治胃膈痰滿方

茯苓 肆兩

半夏 壹升

生薑 壹斤

桂心 捌兩

右四味以水八升煮取一升半分四服冷極者加

大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚此方與第百十六卷嘔吐篇方相

重分兩加減法不同

大半夏湯治痰冷癖飲胃膈中不理方

半夏壹升 白木參兩 生薑捌兩 茯苓

人參 桂心 甘草 附子各貳兩

右八味以水八升煮取三升分三服

半夏湯治痰飲癖氣吞酸方

半夏 吳茱萸各參兩 生薑陸兩 附子壹枚

右四味以水五升煮取一升半分二服老小各半日二

乾棗湯治腫及支滿癖飲方

大棗拾枚 大戟 大黃 黃芩

甘草 甘遂各壹兩 芫花 葶花

右八味咬咀以水五升煮取一升六分四服或空心服以快下為度

當歸湯 治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸 人參 桂心 黃芩 甘草

芍藥 芒消各貳兩 大黃肆兩 生薑 澤瀉各叁兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參 旋復花 橘皮 細辛各壹兩 澤瀉

白朮 杏仁 枳實各貳兩 茯苓 柴胡

生薑 半夏 芍藥各叁兩

右十三味咬咀以水九升煮取二升七分二服日二

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔 拾貳枚
生薑

杏仁

白朮 各肆兩

半夏 捌兩

茯苓 伍兩

橘皮 叁兩

右七味 以水一斗 煮取二升 去滓 分三服

吳茱萸湯 治胃中積冷 心嘈煩滿 汪汪不下 飲食不化 胃應

背痛方

吳茱萸 叁兩
半夏 肆兩

桂心

人參 各貳兩

甘草 壹兩

生薑 伍兩

大棗 貳拾枚

右七味 以水九升 煮取三升 去滓 分三服 日三

治胃膈心腹中痰水冷氣 心下汪洋 嘈煩或水鳴 多唾口

中清水 自出 脅肋急脹 痛不欲食 此皆胃氣弱受冷故也

其脉喜沈弦細 遲悉主之方

半夏

生薑 各伍兩

茯苓 肆兩

旋復花

細辛

橘皮

桂心

人參

甘草

桔梗 各貳兩

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服病先有時

喜水下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加大黃

一二兩須微調者用乾地黄

治冷熱久癖實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡

生薑

茯苓

半夏 各肆兩

甘草

枳實

白朮

各叁兩 桂心 貳兩

右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

調胃湯 治胃中久寒癖實隔塞胃痛氣不通利二焦冷熱

不調飲食減少無味或寒熱身重卧不欲起方

前胡

人參

當歸

甘草

半夏 各叁兩 大黃

防風

麥門冬

吳茱萸

黃芩

各壹兩

生薑 肆兩

杏仁

肆拾枚

右十二味 㕮咀 以水一斗 煮取三升 去滓 分三服 深師方云

若脇下滿加大棗拾貳枚此利水亦生

旋復花湯 治胃膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花

細辛

前胡

甘草

茯苓

各貳兩

生薑

捌兩

桂心

肆兩

半夏

壹升

烏頭

伍枚

右九味 㕮咀 以水九升 煮取三升 去滓 分三服

薑椒湯 治胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐

薑汁

柒合

蜀椒

叁合

桂心

附子

甘草

各壹兩

橘皮

桔梗

茯苓

貳兩

半夏

叁兩

右九味 㕮咀 以水九升 煮取一升半 去滓 內薑汁 煮取

一升分二服服三劑佳若欲服大散諸五石丸必先服此湯及進黃耆丸佳一方不用甘草

薑附湯治痰冷癖氣胃滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

生薑捌兩

附子肆兩生用四破

右一味咬咀以水八升煮取二升分四服亦主卒風

養心散治心上結痰飲實寒冷心悶方

瓜丁貳拾枚

赤小豆貳拾 桑人參

甘草各壹分

右四味治下篩酒服方寸匕日一亦治諸黃

枳實湯治胃中痰癖方

枳實貳兩

甘草

枳實各壹兩

瓜蒂貳拾枚

右四味咬咀以水酒各一升半煮取一升半分二服後

服漸減之得快吐後須服半夏湯方見前篇

松蘿湯 治胃中痰積熱皆除方

松蘿貳兩 烏梅 梔子各拾肆枚 甘草壹兩 怕山叁兩

右五味以酒三升浸一宿平日以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止

杜蘅湯 主吐百病方

杜蘅 松蘿各叁兩 瓜丁 叁柒枚

右二味以酒一升二合漬一宿去滓分二服若一服即吐者止未吐者更服相去如行十里又令藥力盡服一升稀糜即定老小用之亦佳

蜜煎 主寒熱方

蜜伍合 怕山 甘草各貳兩

右二味取二味以水一斗煮取一升去滓服之

服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水草一大勺用

又
蜜員合

醋捌合

右二味調和平日頓服須臾猥猥然欲吐擿之若意中

不盡明日更服無不大嘔安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胃膈中痰厥氣

上衝所致名為敏頭痛吐之即瘥方

單煮茗作飲一二升許適冷暖飲一升須臾擿即吐

吐畢又飲如此數過劇者須吐膽乃止不損人而渴

則瘥

治冷熱膈脹發時頭痛悶亂欲吐不得者方

葱白貳茶莖

烏頭

甘草

真珠

恒山各半兩

桃葉壹把一作

右六味咬咀以水酒各四升和煮取三升去滓內珠每服一升吐即止

大五飲圓主五種飲一曰留飲停水在心下一曰澀飲水澀在兩脅下三曰淡飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方

從容 遠志 苦參 藜蘆 烏賊骨

白朮 甘遂 大黃 石膏 栝蒌根

桔梗 半夏 紫苑 前胡 五味子

芒消 桂心 羌花 當歸 人參

貝母 茯苓 芍藥 大戟 葶藶

黃芩各青 甘草 怕山 薯蕷 厚朴

細辛

附子各二分

巴豆

各二分

右三十三味為末蜜和丸如梧子大飲服三九日三稍稍加之以知為度

旋復花圓

治停痰澀飲結在兩脅腹脹滿羸瘦不能食食

不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利腹中動搖作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方

旋復花

桂心

枳實

人參各伍分

甘遂

各二分

吳茱萸

細辛

大黃

黃芩

葶藶

厚朴

芫花

橘皮各肆分

乾薑

芍藥

白木各陸分

茯苓

狼毒

烏頭

與石各一分

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五九日一後加以

知為度

延年方無白木狼毒烏頭與石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂莢附子各一分

椒防葵杏仁各叁
兩乾地黃肆分

中軍候黑圓治癖飲停結滿悶目暗方 黑又作里

芫花 冬二兩 巴豆 捌分 杏仁 伍分 桂心 桔梗 各肆分

右五味為末蜜丸如胡豆每日服三丸稍增得快下止

順流紫圓治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利

小腹切痛膈上塞方

石膏 伍分 代赭 烏賊骨

半夏 各叁分 桂心 肆分 巴豆 柒枚

右六味為末蜜丸如胡豆平曰服一丸加至二丸胡洽

薑薤從各壹分當歸各壹分茯苓各壹分 當歸 壹分 茯苓 壹分 薤白 壹分 薑 壹分 石膏 半 夏 有

治停痰癖飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不消喜唾

乾嘔大小便或澀或利方

旋復花

大黃

附子

茯苓

椒目

桂心

羌活

狼毒

乾薑

芍藥

枳實

細辛

各捌分

右十二味為末蜜丸如梧子飲下三九日三服後漸增

治風氣膈上痰飲方

不開口苦瓠湯煮三三五沸以物暴熨心膈上

治結積留飲癖囊胃滿飲食不消方

灸通谷五十壯

九蟲第七論一首 方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害凡蟲之

形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸

又有九蟲一曰伏蟲長四分一曰蚘蟲長一尺三曰白蟲

長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲
狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰
蟻蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲則羣蟲之主也虻蟲貫心
則殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五寸亦能
殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃
喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟻蟲居
腸之間多則為痔劇則為癩因人瘡瘻即生諸癰疽癰
疔疥齧蟲無所不為人亦不必盡盡有有亦不必盡多或偏
有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白
草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是尸蟲所畏也
論曰凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并痰飲宿癖
醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力

治肝勞生長蟲在肝為病恐畏不安眼中方

蠟

吳茱萸東行根皮 各二兩

乾椽 肆兩

雞子 伍枚去黃 粳米粉半斤

右五味擣茱萸皮為末和藥銅器中煎可丸如小豆大

宿勿食平日飲服一百丸小兒五十九丸蟲當爛出 集驗方無

茱萸根名雞子丸

治心勞執傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心為病方

雷丸

橘皮

石蠱

桃人 各伍分一作桃皮

狼牙

陸分

貫衆

貳枚

殭蠶 伍分

吳茱萸根皮

柒分

蕪荑

青箱

乾椽 各肆分

亂髮 如雞子大燒

右十二味為末蜜丸如梧子空心腹苦酒下七丸加至二

七丸日一服一方無石蠱

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下蟲方

大麻子 捌升

橘皮 貳兩

東引吳茱萸根 大者壹尺

右三味咬咀以水煎臨時量服凡合藥聲勿語道作藥

蟲當聞便不下切忌之

治肺勞熱生蟲在肺為病方

狼牙

叁兩

東行桑根白皮

切壹升

東行吳茱萸根白皮

伍合

右三味咬咀以酒七升煮取一升平日頓服之

治腎勞熱四肢腫急蟻蟲狀如菜蟲在腎中為病方

蕪荑

胡粉

槐皮

各壹兩

乾椹 貳兩

貫衆

叁枚

杏仁

肆拾枚

吳茱萸

伍拾枚

右七味治下篩平旦并花水服方寸匕加至一匕

以心煩處方

以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿不食
空心頓服之

又方 真珠 貳兩

亂髮 如雞子大燒末

右二味治下篩以苦酒調曰起頓服之肘後方用

麻黃圓 治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐

悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝舉方

蘇蕪

貫衆

雷丸

山茱萸

天門冬

狼牙

各捌分

瞿蘆

甘菊花各肆分

右八味為末蜜丸如大豆二歲飲服五丸五歲以上以

意加之漸至十丸加瞿蘆六分名瞿蘆丸治老小及婦

人等萬病腹內冷熱不通急滿痛胃膈堅滿手足煩熱

上氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹內狀如水雞鳴
婦人月經不調無所不治

治蛭蟲方

藜蘆末以飲臑和服方寸匕不覺加之備急以治蛭蟲

治熱患有蛭蟲懊懷方

藜蘆各一分 乾椹各一分 篇竹各二分

右二味治下篩米飲和合服之日三

治蛭蟲在胃中漸漸羸人方

醇酒 白蜜 好椹各壹升外 基作好益

右二味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚溫酒中

宿勿食日服之蟲必下未下更服治蛭蟲

又方取棟實厚苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中入三寸

日易之 集驗方用治百長蟲

治蛇蟲攻心腹痛方

劉蕒以根二斤以水七升煮取三升先食服之蟲即死出

又方 鶴虱古酒空腹服方寸匕佳

又方 七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕

治寸白蟲方

吳茱萸細根壹把 熟搗 大麻子叁升 熬搗末

右二味以水三升和搗取汁平日頓服至巳時與好食令飽須臾蟲出不瘥明日更合服之不瘥二日服

蟲以酒漬取汁服

又方 蕪荑 陸分

狼牙 陸分

白欬 貳分

右二味治下篩以苦酒一合和一宿次早空腹服之

又方胡麻壹升

胡粉壹兩

右二味為末明日空腹以猪肉臙汁噉盡即瘥

又方榧子四十九枚去皮以月上旬平日空腹服七枚七

日服盡蟲消成水永瘥

又方取吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿

平日分二服凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不在用

又方用石榴根如茱萸法亦可水煮

又方研大麻取汁五升分五服亦治小兒蟻蟲

又方以好油麻二升煎令熟內葱白二寸葱白黑便熟冷

頓服之

又方 熱湯令十分燥作末以藥方寸匕內羊肉臠中服之

又方 桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食平旦

空腹頓服中已多蟲故也宜自遠理之

又方 檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取一升

半去滓內末頓服暖臥蟲出或不盡更合服取瘥止

宿勿食日服之

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空

虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齧斷無色舌上盡

白甚者腎裏有瘡四肢沈重忽忽喜眠當數看其上脣內

有瘡唾血脣內如粟瘡者心內懊懣痛悶此蟲在上蝕其

五臟下脣內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不

能知可服此蝕蟲藥不兩劑蟲殺入又曰凡患濕匿者多多

是執病後或久下不止或有寒熱結在腹中或易水土溫
涼氣著多生此病亦有乾蠶不甚泄痢而下部瘡癢不閉
乾濕久則殺人凡濕得冷而苦痢單煮黃連及艾葉苦參
之屬皆可可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憤
不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以
下部為意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於
竹筒熏之

治傷寒蠱病方

取生雞子小頭叩出白入椀一合熟和攪令極調當
沫出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲處
者再服蟲盡熱除病愈

治濕蠱方

黃連

生薑各各兩艾葉捌兩

苦參肆兩

右四味以水一斗煮取三升分三服久者服三劑

快懷散治濕蠱瘡爛殺蟲除蠱方

菖竹半兩

桂薑

雷丸

青稍

女青

桃人各各兩

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕亦酒服

青稍散治熱病有蠱下部生瘡方

青稍子壹兩

橘皮

菖竹各各兩

藿蘆肆兩

甘草壹分

狼牙叁分

右六味治下篩米飲和每服一合日三不知稍加之

無封

薑蜜湯治濕蠱方

生薑汁五合

白蜜三合

黃連三兩

右二味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜更煎取一升二合五歲兒平白空腹服四合日二

治蠱蟲蝕下部癢穀道中生瘡方

阿膠

當歸

青葙子各一兩

艾葉壹把

壹把

右四味以水八升煮取一升半去滓分二服

杏仁湯治蠱方

杏仁伍拾枚

苦酒壹升

鹽壹合

右二味和煮取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯治蟻蟲蛔蟲及痔蠱蟲食下部生瘡方

桃皮

艾葉各壹兩

槐子三兩

大棗伍拾枚

伍拾枚

伍拾枚

伍拾枚

右四味以水二升煮取半升頓服之良

猪胆苦酒汤治热病有𩇛上下攻移殺入方

猪胆一具苦酒半升和之火煎令沸三上三下藥成
放温空腹飲二滿口蟲死便愈

治温病下部有瘡蟲蝕人五臟方

雄黃

皂莢各壹分麝香

朱砂各壹分

右四味為末蜜和搗萬杵初得病酒服如梧子大一丸

日一若下部有瘡取如梧子大末內下部日一

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖取內下部口中右日瘡令良之

治濕𩇛方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以

水一升半合和相得平日空腹服仍削生薑一枚如

繭大以揪葉苦桃葉數重裹訖於煨
灰火中燒令極
熱內下部中食頃若濕成者
二日作頓服無有不差
又方青黛貳兩黃連黃蘗丁香合香麝香貳分
右五味治下篩以小棗大內下部中日
一度重者棗大
和車脂一二合灌下部中日一服

雄黃灸散

治時氣病腫下部生瘡方

雄黃半兩挑人壹兩青箱子黃連苦參各叁

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸

匕日三

治疔瘻蟲方

燒馬蹄灰作末以猪脂和傅綿繩上內下部中日四

五度

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀和捻長二寸綿裹訖宿內大孔
中明日蟲皆出水銀損腸宜慎之

治蟲蝕下部方

胡粉

雄黃

右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

治傷寒熱病多睡變成濕蠱四肢煩疼不得食方

羊桃十斤切搗令熟暖湯一斗淹浸之日正午時入

中坐一炊久不過二度搓

治熱病蝕毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利膿血當

數視其人下部大小之孔搜搜然一二三赤則匿長者也

劇因殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之方

以泥作小甕令受一升竹筒一枝如指大者一頭橫
穿入甕腹中一頭內人穀道中淺入可取熟艾如雞
子大著甕中然之於甕口吹煙令人入腹艾盡乃止
大人可益艾小兒減之羸者不得多多亦害人日所
熏不過二作蟲則死下斷亦可末燒雄黃如此熏之

書 號 碼 善 510.87 377 V.20
 12-1
 著 譯 者 孫思聰
 書 名 (重刊孫真人) 備急千金要方

號 數	借 期	還 期

出借符不

出借符

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

圖書號數 善 510.87 377 V.20
 圖書冊數 12-1
 登記號數 63291

