

善
510.87
12-1
14

14



63285

重刊孫真人備急千金要方卷之十一 膽腑

膽腑論第一



論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清之腑也難經云膽

者清淨之腑甲乙云中精之腑號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分

在肝短葉間下貯水精汁一合難經作三合能怒能喜能剛能

柔目下果大其膽乃橫凡膽腦髓骨脈女子胞此六者地

氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而不瀉名曰竒恒

之腑若胃大腸小腸二焦膀胱此五者天氣之所生也其

氣象天故瀉而不藏此受五臟濁氣名曰傳化之腑此不

能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣作神而不瀉故滿

而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然

者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實

而不滿滿而不實也

左手關上陽絕者無膽脈也若膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大趾間或刺三毛中左手關上陽實者膽實也若腹中不安身軀習習也刺足少陽治陽在足上第一趾本節後一寸是

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

膽脹者脅下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝熱不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則蕩胃則訟甲乙之二云夢關訟自剝

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者

膽急爪尖色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑

多敗者膽結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁其病若實極則

傷熱熱則驚動精神而不守臥起不定若虛則傷寒寒則

恐畏頭眩不能獨卧發於玄水其根在膽先從頭面起腫

至足方見治水篇中

膽有病則眉為之傾病人眉系傾者七日死

足少陽之脈是動則病口苦善太息心脅痛不能反側甚

則面微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病

者頭痛角額痛目兌背痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭
汗出振寒瘧脅中脅肋解膝外至脗絕骨外踝前及諸節
皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則
人迎反小於寸口也

其經脈經筋支別已具
第十一卷所藏部中

膽虛實第一 脈二條 方九首 灸法一首

膽實熱

方手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不
下咽乾頭痛洒洒惡寒脇痛名曰膽實熱也

半夏湯 治膽腑實熱精神不守瀉熱方

半夏

宿薑

各參三兩

黃芩

壹兩

生地黃

伍兩

遠志

茯苓

各貳兩

秫米

壹斗

酸棗仁

伍合

右八味以千呷長流水五斗煮秫米令蟹目沸揚

三子餘編澄清取九升煮藥取三升半分二服集驗方治虛煩

悶不得眠煎地黃遠志有麥門冬桂心各參兩甘草人參各貳兩

治胃中膽病方

灸濁浴隨年壯穴在俠膽輸傍行相去五寸

膽虛寒

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖臂不能起僵仆目黃失精眊眊名曰膽虛寒也

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此方

半夏

竹茹

枳實各貳兩

橘皮參兩

生薑肆兩

甘草壹兩

右六味以水八升煮取三升分三服

治膽虛方

灸二陰交各二十壯穴在內踝上一夫

千里流水湯 治虛煩不得眠方

麥門冬 半夏 各參三兩 茯苓 肆兩 酸棗人 貳升

甘草 桂心 黃芩 遠志

萆薢 人參 生薑 各貳兩 秫米 壹斗

右十一味 咀咀以千里流水一斛 煮米令蟹目沸 揚萬遍 澄清取一斗 煮藥取一升半 分三服

酸棗湯 治虛勞煩擾奔氣在胃中不得眠方

酸棗人 伍升 人參 桂心 生薑 各貳兩

石膏 肆兩 茯苓 知母 各參三兩 甘草 壹兩半

右八味 咀咀以水一斗 先煮酸棗人取七升 去滓下藥 煮取三升 分三服 日三

治虛勞煩悶不得眠方

大棗貳柒枚

葱白柒莖

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊懷欲死方仲景

二云發汗吐下後虛損不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懷 大拖子拾肆枚 豉柒合

大拖子拾肆枚 豉柒合

右三味以水四升先煮拖子取二升半內豉更煮二沸

去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩

亦可加生薑二兩

治煩悶不得眠方

拘杞白皮 生地黃伍兩 麥門冬 甘草

前胡各伍兩

茯苓 知母各肆兩 人參貳兩 粟米

豉各伍兩

右十味或咀以水八升煮取三升七分四分四服
治虛勞不得眠方

酸棗

榆葉各等分

右二味爲末蜜丸如梧子每服十五丸日再

又方乾薑四兩爲末湯和頓服覆取汗病愈

咽門論第三

論曰夫咽門者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也
喉嚨胞囊舌古者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽
門者肝膽之候也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺
六寸主通五臟六腑津液神氣應十二時若臟熱則咽門
閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶母薑酒主之方見第
熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣

髓虛實第四論一首方一首

論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主於肝膽若其腑臟有病從髓生熱則應臟寒則應腑

治補髓圓治髓虛腦痛不安膽腑中寒方

羌活

芎藭

當歸各三兩

桂心貳兩

人參

肆兩

棗肉

研如脂

羊髓

酥各壹升

大麻人

熬研

牛髓

各壹升

右十味先搗五種乾藥為末下棗膏麻人又搗相濡為

一家下一髓并酥內銅鉢中重湯煎取好為丸如梧子

酒服二十九日一服稍加至四十九

柴胡淡並湯治髓實勇悍驚熱主熱方

柴胡

升麻

黃芩

細辛

枳實

梔子人

芒消

冬二兩

淡竹葉

生地黃

澤瀉身兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓下消分三服

風虛雜補酒前第五

方十八首

巴戟天酒

治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣方

巴戟天

牛膝各三斤

枸杞根白皮

麥門冬

地黃

防風各貳斤

右六味並生用卒無生者用乾者亦得咬咀以酒一石四斗浸七日去滓溫服常令酒氣相續勿至醉吐慎生冷猪魚油蒜春七日秋冬二七日夏勿服先患冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虛勞加五味子菝葜各一斤陰下濕加五加根皮一斤有石斛加一斤佳每加一斤藥則加酒七升此酒每年入九月中旬即

合入十月十日旬即服設服餘藥以此酒下之大妙涼
乾搗為末以此酒服方寸匕日三益生常加甘草十兩
佳虛勞加黃耆一斤

又方巴戟天

生牛膝各三斤

右一味咬咀以酒五斗淹浸服如前法

五加皮治虛勞不足方

五加皮

枸杞根白皮各五斗

右一味咬咀以水一石五斗煮取汁七斗分取四斗浸
麴一斗餘二斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服
之多少任性禁如藥法倍日將息

大劑治男子五勞七傷八風十二痺傷中六極一

氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛一肺極則寒痺腰痛

心下堅有積聚小便不利手足不仁二脈極則顏色苦青
逆意喜恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾寒熱惡
風不可動不嗜食苦眩喜怒哀言四筋極則拘攣小腹堅
脹心痛膝寒冷四肢骨節皆疼痛五骨極則肢節痠逆黃
疸消渴癰疽妄發重病浮腫如水病狀六肉極則發疔如
得擊不復言甚者至死復生衆醫所不能治此皆六極七
傷所致非獨房室之爲也憂恚積思喜怒哀懼復隨風濕
結氣欬時嘔吐食已變大小便不利時泄利重下溺血上
氣吐下乍寒乍熱卧不安席小便赤黃時時惡夢與死
人共飲食入冢神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰脊
相引難可悅仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不明癩
極則陰痿不起住而不交骨極則傷腎傷腎則短氣不可

久之陰痿惡寒其甚者如縮陰下生瘡濕痒手搔不欲住汗
出此皆為腎病其甚者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰
脚弱一名脚氣醫所不治此悉主之方

天門冬

生地黄

各切各三斗半

白蜜

酥各三升

枸杞根

切各三斗淨洗以水貳石伍斗煮取壹斗叁升澄清

麝骨

壹斤搗碎以水壹石壹斗伍斗煮取壹斗叁升澄清

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黄汁減半乃
合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗內銅器重金
煎空隱掌可丸如梧子大平旦空腹酒服二十九日二
加至五十九丸慎生冷醋滑猪雞魚蒜油麪等須擇四時
王相日修合其合和如第一卷合和篇說散藥如左

茯苓

桂心

白朮

萎蕤

五加皮

葛蒲

遠志

澤瀉

薯蕷

柏子仁

人參

石斛

牛膝

杜仲

覆盆子

細辛

獨活

枳實

芎藭

大豆黃卷

黃耆

茯苓

續斷

狗脊

胡麻仁

單解

白芷

橘皮

茯神

巴戟天

石南

略貳阿膠拾兩

甘草

陸兩

蜀椒

薏苡仁體

大棗

壹斤校煮作膏

鹿角膠兩

蔓荊子

叁兩

右三十八味治下篩內煎中有牛髓鹿髓各加二升大

佳小便澀去柏子仁加秦芫一兩乾地黄六兩陰痿失

精去萎蕤加五味子二兩頭風去柏子仁加菊花防風

各一兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹

中冷去防風加乾薑一兩無他疾依方修合凡此煎丸

月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十一月
日合者經夏至七月下旬止若停留經夏不壞常於合
北陰處入地深六尺填沙置藥中上加少覆之則經夏
不損也女人先患熱者得服患冷者勿服

有胃氣者宜服治內勞少氣寒疝裏急腹中喘逆腰脊痛方

生地黄一斤

肉苁蓉

甘草

阿膠各壹斤

麥門冬

乾地黄貳斤 乾薑

茯苓

桑根白皮

桂心各兩

人參

桔梗

五味子

附子各伍兩

石斛五斤

牛髓叁斤

白蜜拾斤

清酒肆斗

麻子人升

大棗拾伍枚

當歸拾肆兩

乾漆貳斤

蜀椒肆兩

右二十一三味先以清酒一斗六升內桑根白皮麻子人

棗膠為刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內

蜜黠地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許今可丸止
大變盛發吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱者煎轉味
可以蜜地黃汁和諸藥成末為丸如梧子服十五丸不
知稍加至三十九

治男子風虛勞損兼時氣方

甘草壹斤 石斛 防風 菴蓉 山茱萸

茯苓 人參 薯蕷各肆兩 桂心 牛膝

五味子 菟絲子 巴戟天 芎藭各叁兩並為末

生地骨皮切碎 生地黃汁各壹升 丹參貳兩

生薑汁 胡麻以水貳斗煮取肆升 牛髓

白蜜 生麥門冬汁各叁升

右二十一味先煎地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓

薑門冬等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調內銅鉢
中湯上煎令可丸如梧子大酒服二十九日一加至五
十九

鹿骨丸

鹿骨 壹具碎治一切虛羸皆服之方

鹿骨

壹具碎

枸杞根

切貳升

右三味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合
一器共煎取五升日一服盡好將慎皆用大斗

地黃小圓

治五勞七傷羸瘦乾削方

乾地黃

末壹升

胡麻油

半升

蜜

貳升

猪脂

壹斤

右四味銅器中煎令可丸如梧子大飲服三九日二稍
加十九日又常服大有所益瘦黑者肥充

陸初膏

治虛冷枯瘦身無精光虛損諸不足方

牛髓

羊脂

真升

酥

經心錄

生薑汁

白蜜

各參

升

右五味先煎酥令熟次內薑汁次內蜜次內羊脂牛髓

後微火煎三上三下令薑汁水氣盡即膏成攪令凝止

溫酒服隨人能否不限多少令人肥健發熱也

經心錄云治百

病勞損風濕補益神效男女通服之

枸杞煎

補虛羸久服輕身不老神驗方

九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五六沸

出取熟研瀝取汁令其子極淨曝令乾擣末和前煎汁

微火煎令可丸酒服一方寸匕日一加至三匕亦可

丸服二十九

雙姬杏仁煎方

杏仁二升內湯中去皮尖兩人熟擣盆中水研取七

八升汁以鐵釜置糖火上取羊脂四斤就釜內磨消
內杏仁汁溫之四五日色如金狀餌如彈子日三服
百日肥白易容人不能識也

又方杏仁熬黃去皮及尖擣服如梧子日三治枯瘦令人潤
澤無所禁效逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得
茯苓數冬紫苑併力大良其藥生執執冷喉中如有
息肉者亦服之

桃人煎方

桃人 爲末

蜜 各壹斤

酥 半斤

胡麻 壹升末

牛乳 伍升

地黃 拾斤取汁

右六味合煎如餠旋服之

治五勞七傷方

白羊頭蹄

壹具淨治更以草火燒令黃

胡椒

畢撥

乾薑

各壹兩

葱白

壹升

豉貳升

右七味先以水煮頭及蹄半熟即內藥煮令極爛去藥

冷暖任性食之日一具七日凡七具忌生冷酢滑五辛

陳臭等物

治虛勞補方

羊肚壹具切

白朮壹升

右二味以水一斗煮取六升每服一升日三

又方

豉

壹升蒸參遍

薤白

壹斤切

右二味以水七升煮取三升分二服小取汗

又方

治羸瘦方

不中水猪肪煎取一升內葱白一握煎令黃出內益

中平曰至空腹服訖暖覆卧至哺時食白粥粥不得稀

過二日服補藥方如左

羊肝壹斤

羊脊膂肉壹斤

麴末半斤

枸杞根拾斤

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肝等內汁

中煮著葱豉鹽如羹法合煎着如稠糖即好食之七日

禁如藥法

補虛方

猪肚壹斤

人參伍兩

蜀椒壹兩

乾薑貳兩半

葱白柒兩

白梁米半升
金翼用粳米

右六味以咀諸藥令相得和米內肚中縫合勿令泄氣

取四斗半水緩火爛煮至空腹食之大佳兼下少飯

吐血第六

論一首

灸法十首

方三十首

論曰稟立云吐血有二種有內衄有肺疽有傷胃內衄者
出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流
入胃中或如豆羹汁或如切齧血凝停胃中因即滿悶便
吐或去數斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常所爲
也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一
合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不
能消化不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上
衝蹙因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脉緊
而數者爲難治也問曰病腎脅支滿妨於食病至則先聞
腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名爲
河何以得之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血
若醉入房中氣竭而肝傷故使月事衰少不來也治以鱉

賊骨蘭茹一味并合九以雀卵大如小豆以五九為後飯
飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也凡吐血後體中但背淹淹
然心中不悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛
倒不安醫工又與黃土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如
此悶者當急吐之

瓜蒂貳分

杜蘅

人參各壹分

右二味治下篩服一錢匕或無水漿但得下即可羸人
小減之吐去青黃或吐血一二升無苦

美土湯治吐血方

伏龍肝

雞子大貳枚

桂心

乾薑

當歸

芍藥

白朮

甘草

阿膠

芎藭

生地黄

捌兩

細辛

吳茱萸

貳升

各壹兩

右十二味以酒七升水三升合煮取三升半去滓
內膠煮取三升分二服亦治衄血

又方 治卒吐血及衄血方

伏龍肝 半升 甘草

乾薑 仲景作地黃

白朮 阿膠

黃芩 各參三兩

右六味以水一斗煮取三升去滓下膠分三服仲景

有附子參二兩為柒味

生地黄湯 治憂恚嘔血煩滿少氣胃中痛方

生地黄 壹斤 大棗 伍拾枚 阿膠 甘草 各參三兩

右四味以水一斗煮取四升分四服日三夜一

堅中湯 治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

糖 參三斤 芍藥 半夏 生薑

甘草 各參三兩 桂心 貳兩 大棗 伍拾枚

右七味以水二斗煮取七升分七服日五夜一針

翼無甘草桂心有生地黃

治噫止唾血方

石膏 肆兩 厚朴 參兩 麻黃 生薑

五味子 半夏 杏仁 各貳兩 小麥 壹升

右八味以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮取二升半分再服

治吐血胃中塞痛方

芍藥 乾薑 茯苓 桂心

當歸 大黃 芒消 各參三兩 阿膠

甘草 人參 各貳兩 麻黃 壹兩 乾地黃 肆兩

蝨蟲

水蛭各別拾枝

大棗貳拾枝 桃人伯枝

右十六味以水一斗七升煮取四升分五服夜日三

治吐血內崩上氣面色如土方

乾薑

阿膠

柏葉各貳兩 艾壹把

右四味以水五升煮取一升內馬通汁一升煮取

一升頓服仲景名柏葉湯不用阿膠

治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩者方

蒲黃

犀角

栝蒌根

甘草各貳兩

葛根

桑寄生各叁兩

右六味以水七升煮取二升分三服

澤蘭湯 治傷中裏急胃脅攣痛欲嘔血時寒時熱小便赤

黃此皆傷於房勞故也

澤蘭

糖各壹斤

積石

桑根白皮

人參

各叁兩

遠志

貳斤

生薑

伍兩

麻人

壹斤

右八味以淳酒一斗五升煮取七升去滓內糖食

前服一升日二夜一勿勞動

治忽吐血一兩口或是心衄或是內崩方

蟻螬

牛膝

牡丹

王不留行

麥門冬

貳兩

車釐

芍藥

乾地黄

肆兩

續斷

阿膠

各叁兩

右干味以生地黃汁五升赤馬通汁三升煮取三

升分三服不瘥更合數劑取瘥止

又方 熟艾二雞子許水五升煮取二升頓服

又方 燒亂髮灰水服方寸匕日二服集驗云治舌上忽出

便出
血者

治虛勞吐血方

生地黄肥者五升擣以酒一升煮沸三上三下去滓

頓服

又方 凡吐血服桂心末方寸匕日夜可二十服肘後云亦

又方 生地黄五斤絞取汁微火煎二沸投白蜜一升又煎

取二升每服半升日三主胃痛百病久服佳

又方 柏葉一斤以水六升煮取二升分三服

又方 生地黄汁半升川大黃末壹方寸匕

右二味先溫地黄汁一沸次內大黃攪和空腹頓服日

二三瘥

身痛黃湯治傷寒及溫病應發汗而不汗之內畜血者

及鼻血吐血不盡內餘痰血大便黑面黃消痰血方

犀角壹兩 生地黃捌兩 芍藥叁兩 牡丹皮貳兩

右四味以咀以水九升煮取二升分二服喜妄如狂者

加大黃一兩黃芩二兩其人脈大來遲腹不滿自汗滿

者為無熱但依方不須有所增加

治五臟熱結吐血衄血方

伏龍肝雞子壹枚 生竹茹壹升 芍藥 當歸

黃芩 芍藥 甘草貳兩 生地黃壹斤

右八味以咀以水一斗二升先煮竹茹減二升下藥取

二升分三服千金翼有替心

當歸湯 治衄血吐血

當歸 乾薑 芍藥 阿膠貳兩 黃芩叁兩

右五味以水六升煮取二升分二服

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死並主之

艾葉

竹茹各壹升

阿膠如手

乾薑貳兩

右四味以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升

煮取一升頓服

取新馬屎與少水和絞取汁一方不

用竹茹加乾薑作七兩

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑如漆方

黃耆

芍藥

芎藭

甘草

肆兩

生薑壹斤

右五味以酒五升浸一宿明日更以水五升煮取

四升分四服日二夜一下陰中毒如湯沃雪凡夏月不

得宿浸藥酒客勞熱發痔下血其穀道熱者去生薑用

生地黃代之凡進二兩劑

治吐血汗血大小便下血方

竹茹貳升甘草

芎藭

黃芩

當歸各

芍藥

白朮

人參

桂心各壹兩

右九味以水一斗煮取二升分四服日三夜一

治九孔出血方

擣荆葉汁酒服一合
一本作荆芥

治吐血蠱毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者方

取東向藁荷根擣絞取汁二升頓服立瘥

治下血先見血後見便此為遠血宜服黃土湯

治下血先見便後見血此為近血宜服赤小豆散方

赤小豆叁升熬當歸叁兩

右一味治下篩每服方寸匕日二

說地黃圓 治血虛勞胃腹煩滿疼瘀血往來臟虛不受

穀氣逆不得食補中理血方

乾地黃 叁兩

當歸

乾薑

麥門冬

甘草

黃芩 貳兩

厚朴

乾椽

枳實

防風

大黃

細辛

白朮 壹兩

茯苓 伍兩

前胡

陸分人參 伍分 蝨蟲

麝蟲

各伍拾枚

右十八味為末蜜丸如梧子大先食服十九日一稍加

麥門冬湯 治凡下血虛極方

麥門冬

白朮 各肆兩

甘草 壹兩

牡蠣

芍藥

阿膠 各伍兩

大棗 貳拾枚

右七味以水八升煮取一升分再服

胃中痰血積滿脅膈痛不能久立膝痿寒之里主之

唾血肩脅痛口乾心痛與背相引不可效效引腎痛不容

主之 一作容

心膈下嘔血上管主之

唾血振寒吐乾大淵主之

嘔血大陵及郄門主之

嘔血上氣神門主之

內傷唾血不足外無膏澤刺地五會

灸法

虛勞吐血灸胃管二百壯亦主勞嘔逆吐血少食多飽多

唾百病 多唾 一作多睡

吐血唾血灸胃堂百壯不針

吐血酸削灸肝輸百壯

吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯

吐血唾血上氣效逆灸肺輸隨年壯

吐血嘔逆灸手心主五壯 千金翼云大陵是

凡口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯入髮際一寸是

大便下血灸第一十椎隨年壯

萬病丸散第七 論述三首 方十二首

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不虞倉卒之際
應手皆得故有萬病方焉余以此方散在羣典乃令學者
難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶使造次可得好事君
子安不忘危無事之暇可預和合以備痾瘵也

萬病散治一切風冷痰飲癰瘕疔瘡疔瘡萬醫所不治者皆治
之一名登仙酒 一名二建散

芫花

桔梗

紫苑

大戟

王不留行

烏頭

附子

天雄

白朮

五加皮

堯花

狼毒

莽草

藥荊

枯婁根

躑躅

麻黃

白芷

荆芥

茵芋俗名

車前子

石斛

人參

石南

石長生

蛇牀子

單薺

牛膝

狗脊

菟絲子

茯苓

秦艽

藜蘆

薯蕷

黃芩或人

巴戟天

細辛

當歸

芍藥

乾地黃

食茱萸

杜仲

厚朴

黃耆

山茱萸

乾薑

芍藥

桂心

黃芩

吳茱萸

防己

遠志

蜀椒

獨活

五味子

牡丹

橘皮

通草

柴胡

柏子仁

藁本

葛蒲

茯苓

續斷

各貳分

右六十四味

下金靈其有麻花半夏亦車使者高良薑紫蘇威無白木食茱萸

並不治不

擇不多炙不燬但振去塵土搗以粗羅下之即與服凡是

猪雞五辛生冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥

不得食

藥散 參三兩

細麴末 貳升 糯米 叁升

真酒 伍升

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣春月
稍涼夏月揚絕火氣令極冷秋稍溫次下麴末搗使和
柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃下真酒重搗使
散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須
密封凡服藥平日宜心服之以知為度微覺發動流入
四肢頭面習習然為定勿更加之如法服之常常內消
非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水
酒漿飲無在稍滓以少為度服丸者細下篩蜜丸如梧
子每服七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲
得補不令吐瀉但取內消大益勝於五石兼逐諸病功

效一等然作酒服佳於丸散美而易服流行迅疾若有
患人抱病多時積癥宿食大塊久氣癥瘕積聚一切癥
結者即須一兩度增加令吐下泄去惡物盡後少服內
消便爲補益凡服藥慎勿早食早食觸藥必當大吐吐
亦無損酒更還定但令人咽喉痛二兩日後始痊服者
宜知之平日服藥至午時待藥勢定宜先食冷飯殖飲
冷漿水及午後藥勢一定任意熱食無忌若藥勢未定
不得強起行行即連悶旋倒眼花暗然迷絕此是逐風
所致不須疑怪風盡之後縱令多服更佳不然悶時但
坐但卧須更醒然不異於常若定後任意所之若必便
旋當策杖如廁少覺悶亂即須坐定坐定即醒醒乃可
行病在膈上久冷痰癥積聚癥結疝瘕宿食堅塊效逆

上氣等一切癰結重病終日吐唾逆氣上衝膈喉此皆
胃口積冷所致三焦腸間宿冷以成諸疾如此例便當
吐却此等惡物輕者一度下轉藥令吐却若重者三
五度下之令盡其吐狀法初吐冷氣沫次吐酢水須臾吐
黃汁濃甚者苦似牛涎病若更多者當吐出紫痰似紫
草汁狀常齧斷有此者例入死道不久定死若有痰者
吐血陳久黑血新者鮮血吐罷永瘥不發下此吐藥當
吐時大悶須臾自定即不虛憊得冷飲食已耳不虛聾
手足不痺若胃口有前件等病勢久成者正當吐時有
一塊物塞膈喉吐復不出咽復不入當有異種夫悶更
加一二合藥酒重投藥下少時即當吐出塊物如拳大
真似蝦雞子中黃著地以刀斫碎重者十塊輕者三

校凡人有上件等病若服藥時不吐却者當時雖得漸
損一二年後還發為此故須下吐藥欲服取吐者當以
春二月服之春宜吐故也凡膈上冷小腹滿腸鳴膀胱
有氣冷利多者須加利藥於此酒內服之便去惡物利
法出泔涎如清水如黃汁如青泥輕者一兩度下利藥
得利以盡病源重者五度下利藥令頻數得大利以盡
病根利法曰起服藥比至晡時可得兩三行即斷後服
凡長病人瘦弱虛損者又貴人此等人但令少服積日
漸漸加增令多內消痰除久病不加吐利也藥若傷多
吐利困極不止者水服生大豆末方寸匕即定及藍葉
烏豆葉嚼以咽之登時即定此據大困時用之小小時
不須也凡在世人有虛損陽衰消瘦骨立者服之非常

補益旬月之間肌膚充悅顏色光澤髓溢精滿與少壯
一等凡衆痾萬病皆除之治一切風病歷節風二十兩
和酒五斗賊風熱風大風上同偏風癢癢風癱緩風十
二兩和酒三斗此七種亦帶熱須加冷藥押使常數便
利賊風掣癱八兩和酒一斗濕風周痺上同腰脚攣痛
十二兩和酒三斗筋節攣急八兩和酒一斗重病後汗
不流初覺二服一服一盞年久服一升食熱食如錐刀
刺者八兩和酒一斗口喝面突一眼不合者初得四兩
和酒一斗年久十二兩和酒三斗頭面風似蟲行又似
毛髮在面上者八兩和酒一斗起即頭旋良久始定者
四兩和酒一斗心悶嘔逆頭強者風在心藏欲風欲兩
便即先發者八兩和酒一斗因瘡得風口強脊脈急者

五服即定一服一盞治一切冷病積冷瘵瘦者四兩和
酒一斗強者六兩和酒一斗半痰飲疝瘕上同宿食嘔
吐四兩和酒一斗癥瘕腸鳴噫八兩和酒一斗又疰及
久勞上同癩痔塊堅冷嗽上氣一斗和酒五斗奔豚
冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注忤心
腹脹氣急欲死者二服定一服一盞大吐出鮮血瘵氣
上同蠱毒五服定一服一盞溫瘵瘡瘻並上同可服一盞
治婦人諸風諸病等並依前件帶下十一兩和酒二斗
崩中六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不產並上同
斷緒不產八兩和酒一斗月水前後不調乍多乍少亦
令人絕產四兩和酒一斗產後風冷不產六兩和酒二
斗若重者八兩和酒一斗甚者十六兩和酒二斗大重

者子宮下垂十六兩和酒四斗

論曰遠覽前古莫覩此方有高入李孝隆者自云隋初受之於定州山僧惠通道人此後用之大有效驗秘而不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之於靜智道人將三紀於茲矣時俗名醫未之許也然比行之極有神驗其用藥殊不倫次將服節度大不近人情至於救急其驗特異方知神物效靈不拘常制至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所以然而然雖聖人莫之辨也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳之非止救物兼深抑亦庶幾於博見矣

治七種瘕塊

五種癩病十種疰忤七種飛尸

十一種蠱毒五種黃病十一種瘧疾十種水病八種大風

十一種瘧症并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水
雞聲不得眠臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉
不通心腹脹滿及連腎背鼓氣堅結流入四肢或復又心
膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疔蟲寸白
諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力陰入骨髓
便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重行立
不能久婦人因產冷入子臟臟中不淨或閉塞不通胞中
瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因此斷產并小兒
赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病此藥以三九為一劑服
藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其以牛
黃為主故一名牛黃丸以耆婆良醫故名耆婆丸方

牛黃

麝香

犀角

一各一分

桑白皮

茯苓

乾薑

桂心

當歸

芎藭

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆

前胡

紫苑

蒲黃

葶藶

防風

蜈蚣

石蜥蜴

人參

朱砂

雄黃

黃連

大戟

禹餘糧

芫花

芫青

柴枝

右三十一味

崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風為二十七味

並入精細牛黃麝

香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者各搗重縮下

篩以白蜜和更搗二千杵密封下破除日平日空腹酒

服二丸如梧子大取微下二三升惡水為良若卒暴病不

拘平日早晚皆可服但以吐利為度若不吐利更加一

丸或至三二丸五丸須吐利為度不得限以丸數病強藥

少即不吐利更非他故若其發遲以熱飲汁投之若吐
利不止即以醋飯兩三口止之服藥已陳臭生冷酢滑
粘食大蒜猪雞魚狗馬驢肉白酒行房七日外始得一
日服二日補之得食新米非骨汁作羹粥臙飲食之二
四頓大良亦不得全飽產婦勿服吐利以後常須閉口
少語於無風處溫牀暖室將息若旅行卒暴無飲以小
便送之爲佳若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小
豆亦以吐利爲度近病及卒病皆用多積久疾病即少
服常取微溏利爲度

卒病欲死服三九如小豆取吐利即瘥

卒得中惡口噤服二九如小豆暖水一合灌口令下微

利即瘥

諸有痰飲者服三九如小豆

五疰鬼刺客忤服二丸如小豆不瘥後日更服三丸
男女邪病歌哭無時腹大如姪娠服二丸如小豆日三
夜一間食服之
大痢服一丸如小豆日三

猫鬼病服三丸如小豆未瘥更服

蠱毒吐血腹痛如刺服二丸如小豆不瘥更服

瘥病未發前服一丸如小豆不瘥後日更服

冷癖服三丸如小豆日三皆間食服之常令微溲利

宿食不消服二丸如小豆取利

癥瘕積聚服二丸如小豆日三皆間食服之以利瘥止

拘急心腹脹滿心痛服三丸如小豆不瘥更服

上氣喘逆胃滿不得卧服二丸如小豆不瘥更服

疴濕以一丸如杏仁大和酢一合灌下部亦服二丸如

小豆

鼻衄服二九如小豆即瘥

水病服三九如小豆日一皆間食服之瘥止日人弱開

頭痛惡寒服二九如小豆覆取汗

傷寒時行服二九如小豆日三間食服之

小便不通服二九如小豆不瘥明日更服

大便不通服二九如小豆又內一九下部中即通

耳聾聒耳以綿裹一九如小棗核大塞之瘥

癰腫丁腫破腫內一九如麻子大日一傳其根自出瘥

犯丁腫血出以猪脂和傅有孔內孔中瘥止

背脊腰脅腫以酢和傅腫上日一易又服二九如小豆

癩瘡先以酢泔洗後取藥和猪脂傅之

瘻瘡有孔以一九如小豆內孔中兼和猪脂傅之

痔瘡取藥塗綿筋上內孔中白別易瘥止

瘰癧以酢和傅上瘥 惡刺以一丸內瘡孔中即瘥

諸冷瘡積年不瘥者以酢和塗瘡上作餅貼之瘥

癬瘡先以布揩令汁出後取酢和傅上日一易立瘥

蠍螫以少許傅螫處 蜂螫以少許傅螫處

蝮蛇螫取少許內螫處若毒入腹心悶欲絕者服三九

如小豆大

婦人諸疾胞衣不下服一丸如小豆取吐利即出

小兒客忤服一丸如米粒和乳汁傅乳頭令啣之

小兒驚癇服一丸如米粒塗乳頭令啣之隨兒大小量與

小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米粒塗乳頭令啣之

不瘥更服

治一切蠱毒妖邪鬼疰病者有遊有浪積聚堅結心痛如
齧不得坐卧及時行惡氣濕病風熱瘴氣相染滅明或時
熱如瘖嚥咽喉腫塞不下飲食或煩滿短氣面目時赤或
目中赤黃或乾嘔或吐逆或下赤白痢或熱氣如雲或欲
狂走自殺或如見鬼或手足清冷或熱飲冷水而不知足
或使手撥空或面目癱腫生瘡或耳聾目暗頭項背脊強
不得屈伸或手足卒癢或白鬼惡疰狐魅走入皮膚痛無
常處方

麝香

丹砂

特生礬石

馬目毒公

馬齒莧

雄黃兩

巴豆一枚

青野葛

本不用

右八味為末別搗巴豆如膏合搗五千杵內蜜更搗一
萬杵丸如小豆大強者服一九弱者一九入腹雲行四

布通徹表裏從頭下行周徧五臟六腑魂魄靜定情性
得安病在膈上吐膈下利或蛇蟲諸毒五色熱水或不
吐下便微漸除瘵萬蠱妖精狐狸鬼魅諸久痼癖塊皆
消散在表汗出在裏直下已忌名其藥故此方無名也

仙人玉虛圓方

雄黃

藜蘆

丹砂

礬石

一作礬石

巴豆

八角附子

各實兩

右六味先搗巴豆三千杵次內礬石又搗三千杵次內

藜蘆三千杵次內附子三千杵次內雄黃三千杵次內

丹砂三千杵內蜜又搗萬杵佳若不用丹砂者內真珠

四兩無在每內藥輒治五百杵內少蜜恐藥飛揚治藥

用壬子相吉日良時童子齋戒為良天晴明日無雲霧白

書藥成封密器中勿泄氣著清潔處大人服九如小豆
欲下病者宿勿食平日服二九不知者以暖粥飲發之
令下下不止飲冷水以止之病在膈上吐膈下利或但
噫氣即已甚若欲漸除及將服消病者服如麻子大二九
卒中惡欲死不知人以酒若湯和二九強開口灌喉中
鬼疰病百種不可名漿水服二九日再

男女與鬼交通歌哭無常或腹大絕經狀如妊娠漿水
服二九如胡豆大日三夜一又苦酒和令如粉每日傳
手間使心王心主在手腕後第一約橫文當中指至暮
又傳足三陰三陽及鼻孔七日愈又漿服麻子大二九
日三服二十日止 惡風逆心不得氣息服二九
腹中如有蟲欲鑽脅出狀急痛一止一作是惡風一五九

憂恚氣結在胃心苦連噫及效胃中刺痛服如麻子大
三九日三
腹痛脹滿不食服一九

心腹切痛及心中熱服一九如麻子大日三服五日瘥
風疝寒疝心疝弦疝每發腹中急痛服一九

卒上氣氣但出不入并逆氣衝喉胃中暴積聚者服二
九日再
辭飲痰飲平日服一九

腹中二蟲宿勿食明日炙牛羊肉二鬻食之須臾進二
丸如胡豆大日中當下過日中不下更二丸爛蟲必下
卒關格不得大小便欲死服二九

卒霍亂心腹痛煩滿吐下手足逆冷服二九

傷寒嗽瀉時氣熱病溫酒服一九厚覆取汗不汗更服
寒熱往來服一九
瘥未發一九已發二九便斷

積寒熱老痞服二九

癥結堅痞一九日二取愈

下痢重下者一九取斷

食肉不消腹堅脹一九立愈

苦淋瀝瘦瘠百節酸疼服一九日三

頭卒風腫以苦酒若膏和傅之絮裹之

癰疽疔癩瘰癧及欲作癩以苦酒和傅之

若惡瘡不可名癰疥疽以膏若苦酒和先以鹽湯洗瘡

去加拭乾傅之

齒痛綿裹塞孔中

鼠瘻以猪脂和傅瘡取駁舌狗子舐之

中水毒服二九若已有瘡苦酒和三九傅之

耳聾膿血汁出及卒聾以赤穀皮裹一九內之

風目赤或痒視物漠漠淚出爛眦蜜解如粉涂注目眦

若爲蠱毒所中吐血腹內如刺服一九如麻子稍加大

如胡豆亦以塗鼻孔中又以膏和通塗腹背亦可燒之熏口及鼻

若為蛇蝮諸毒所中及獠犬狂馬所咋苦酒和傳又水服一丸

婦人產後餘疾及月水不通往來不時服一丸日再

婦人胃中苦滯氣氣息不利小腹堅急繞臍絞痛漿

如麻子一丸稍加之如小豆大

小兒百病驚癇痞塞及有熱百日生歲者以一丸如黍

米大置乳頭飲之一歲以下如麻子一丸日二飲以下

小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚服一丸

小兒寒熱頭痛身熱及吐衄服一丸如麻子六

小兒羸瘦下痢不能食食不化漿水服一丸日三又苦

酒和如梧子大傅腹上良

一切萬病量之不過一二丸莫不立愈

欲行問孝省病服一九又一九繫額上行無所異至喪

家帶一九辟百鬼若獨止宿山澤冢墓社廟叢林之中

燒一九百鬼不敢近仍以蠟和一九如彈丸大著絳囊

中繫臂上男左女右山精鬼魅皆畏之

張仙景 **三物備急圓** 司空裴秀為散用治心腹諸卒暴百

病方

大黃

乾薑

巴豆 各等分

右皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑下篩為散別研

巴豆如脂內散中合搗千杵即爾用之為散亦好下蜜

為丸貯密器中莫令歇氣若中惡客忤心腹脹滿刺痛

口噤氣急停死卒死者以暖水若酒服大豆許二三枚老
 小量與扶頭起令得下喉澀更未醒更與二三枚腹中鳴
 轉得吐利便愈若口已噤可先和成汁傾口中令從齒
 間得入極良

大理氣圓 治萬病方

牛膝 甘草 人參 茯苓 遠志

栝山 苦參 丹參 沙參 龍膽

龍骨 牡蒙 半夏 杏仁 紫苑

芍藥 天雄 附子 葛根 橘皮

巴豆 狼牙各貳兩 大黃 牡蠣 白木各參兩

生薑末伍兩 白薇陸分 玄參柒分 藿蘆入者壹枚

右二十九味先擣篩一十七味令熟次擣巴豆杏仁

膏然後和使相得加白蜜更擣五千餘杵丸如梧子大
空腹酒服七丸日三四疝癥癥結五十日服永瘳吾常用
理氣大覺有效

大藥類考 治鬼疰飛尸萬病方

麝香各二分 礬石搗分 牛黃 附子 鬼臼

真珠 莽草 犀角 礬石 細辛

桂心 獺肝 藜蘆各貳分 雄黃壹兩 丹砂貳兩

蜈蚣 蜥蜴各壹斤 巴豆 杏仁各伍拾枚 芫青

地膽外臺作蚺蛇膽 亭長 斑蝥各柒枚

右二十三味為末蜜和合口更擣二千杵丸如小豆大飲

服一九日再漸加至三九蟲毒所螫摩之以知為度若

欲入毒疫癘鄉死喪病處及惡鬼塚墓盛絳袋中男左

女右肘後繫之又以少許傳臍下人中及卧不覺

小麋刺百圓治同前

麝香 莽草 犀角 梔子人參雄黃

當歸外臺不用丹砂各肆分乾薑 桂心 芍藥

細辛各伍分附子 烏頭各伍枚蜈蚣壹枚巴豆伍拾枚

右十五味為末蜜和合搗千杵丸如小豆大服三丸日
三可加至五丸一切尸疰痛悉皆主之

紫葛圓治諸熱不調方

紫葛 石膏 人參 丹參

紫參 苦參 玄參 細辛

齊鹽 代赭 茯苓 巴豆

烏頭各伍分乾薑 桂心 獨活各伍分

右十六味為末蜜和更搗萬餘杵丸如小豆服六丸食
前三丸食後三丸忌五辛猪雞魚蒜餘不在禁限若覺
體中大熱各減一丸服之令人肥悅好顏色強陽道能
食服藥後十日得利黃白汁大佳婦人食前食後只服
一二丸兩歲以下小兒服丸如米粒大令人能飲酒除百
病藥之功能損益備述如左

腹中積聚心腹滿○心下堅○痰飲○宿食○食吐逆

○上氣○短氣○欬嗽○咽喉鳴○黃疸○久瘧○面

腫○身浮腫○四肢煩重○坐起體重○熱病濕匿下

部痒○體瘡痒○關格不通○大腸出○熱淋○下利

○顏色不定羸瘦無力弱房少精○精冷○身體斑駁

○從高墮下絕傷○墮胎後傷損血○皮肉焦爛○月

水不定或後或前 月水斷心下悶滿有膊沈重○小兒百病○小兒癖氣○乳不消○小兒身常壯熱腹內有病所錄諸病皆紫葛丸治之若積日服餌未愈消息準方服之取瘥止藥性冷尤宜患熱人服之

大心神續 治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癩狂鬼語

蠱毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治方

丹砂

曹青

雌黃

雄黃

礞石 各肆兩

金牙 貳兩半

右六味各搗細下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醎醋浸之曹青用好酒於銅器中漬紙密封訖日中曝百日經憂急五日亦得無日以火暖之然後各研令如細粉以醎酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥固際勿令泄

氣乾後安鐵環掩脚高一尺五寸置真金上以漸放火照

問乾硬炭等皆得初放火取熟兩秤炭各長四寸置釜

上待三分一分盡即益如此二度盡用熟火然後用益

生炭其過三上熟火已外皆須加火漸多及至一伏時

其火已欲近釜即便滿就釜下益炭及經兩度即罷火盡

極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色

者次一色者下雖無五色但色光明皎潔如雪最佳若

飛上不盡更令與火如前以雄雞翼掃取或多或少不

定研和棗膏丸如黍粒一本云用丹砂曾青雄黃雌黃各

青美酒漬紙密密封閉日暴一百日日雄黃雌黃各油煎九

日九夜去油膩更擣數千杵皆勿研之別以大酢拌

令溫溫然內藥土釜中以雄黃在下次下雌黃次曾青

次丹砂以甘土泥塗勿令餘毫毛許乾以剛炭火燒之

九日九夜去釜五寸九日九夜至釜底九日九夜侵釜

腹三寸三九二七日冷之一日一夜以刀子於釜際

利著一匣開之取丹成細研如粉以棗膏和一切

丹不得用磁石皆用棗膏學者宜知此術舊不用磁石金

而用之治偏風大風惡疾癩癧癰疽鬼打等最良服法

平日空腹一丸如黍米為度其瘡病積久百方不瘥又

加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服一丸吐即

瘥亦有不自吐瘥者若不吐復不瘥者更服一丸半仍不

瘥者後日增半丸漸服無有不自瘥氣亦定當吐出青黃

白物其因瘥兩脅下有癖塊者亦當消除若心腹不脹

滿者可與一丸日日加之以知為度不必專須吐亦可

一丸即瘥勿併與服亦可三日一服皆須以意斟酌量

得其宜或腹內有水使即下者勿恠若患瘡日近精神

健亦可斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆至
午後食勿使冷勿使熱設漿粥任意食之若病瘥盜汗

虛弱者日服一九至二日吐即止若患瘧不汗氣復不流
脚冷者服一九至二日若不汗氣復脚即暖有濇汗不
至二三日吐即止若患瘧無顏色者服藥後三日即有顏
色亦有須吐差者亦有服少許而差者亦有殺藥強入
服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一槩與之
但作黍米大服之爲始漸加以知爲度藥力驗壯勿併
多服特慎油麪魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在
牀羸瘦并腹脹滿及腫或下痢者多多死但與藥救之十
人中或瘥三四人也又一說瘥瘵積聚服一刀圭以飲
漿水送下治諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸症
惡風症忤大病相易死亡滅門狂癩鬼語已死氣絕心
上微暖者扶起其頭以物校開口不可開琢去兩齒以

漿飲送藥藥下即活諸久病者日服一刀圭覆令汗汗
出即愈不愈者不過再服亦有不汗而瘥復有不汗不
愈者服如上法加半刀圭以瘥爲度常以絳囊帶九刀
圭散男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡時氣射公小兒
患可以苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在上
治之亦有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥下便
活若不得入腹不活若加金牙磁石者服至五服內必
令人吐逆下利過此即自定其藥如小豆大爲始從此
漸小不得更大大風惡癩可一十服偏風癱瘓諸惡風
癩病等亦可一十服自餘諸惡病者皆止一一服量人
輕重強弱不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服
此藥後小應頭痛身熱一一日來大不能得食味後日

漸得氣味五日後便能食若貪食過多者宜節之轉弱
藥下悶亂可煮木防已湯服之即定凡言刀圭者以六
粟為一刀圭一說云三小豆為一刀圭

作土釜法

其法取兩箇瓦盆各受一大斗許以甘土塗其內令
極乾又一法作一瓦釜作一熟鐵釜各受九升瓦在
上鐵在下其狀大小隨藥多少不必依此說本云

半綳篩水和作泥硬軟如坯瓦泥泥膏并內細紙
擣可受拾斤亦可隨藥多少作之陰乾二十日置日

中曝亦三十日日夕翻轉向日乾訖以糠伍碩內金
糠中四向土攪攤之令糠編金周回土上下各厚柴寸

以火從下放五日五夜勿令人近之土友待冷一日
一夜乃取掃拭令淨以黃用醋和如鴉粥掃其中令

厚壹分乃內藥凡合丸用八石招意太清神仙者大
丹皆用此金作之萬成終不落節其古金六一泥及

金皆除去之勿更用也此金壹具前後數十回用
不動又又轉此法師甚秘之余欲令當來天下學

十得解之所以
委曲具述之也

作六一泥法

赤石脂

牡蠣

滑石

礬石

黃礬

鹵土

蚯蚓屎

各取兩

右取酸酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥

以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火

燒周二日最好一日亦得出火破團取藥各擣碎絹篩

然後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥既得好酢

可用二分酢一分水和用取前瓦盆以此泥塗之曹書

如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好崑崙碌亦得瘥病

砂亦甚粟砂亦得舊不用磁石金牙今加之用法治諸種

凡有患連年積歲不可治者宜須人以此一為
皆以王相日天晴明齋戒沐浴如法治之

述曰古之仙者以此救俗特為至秘余以大業年中數
以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤
於飛鳥玄武大獲曾青蜀人不識今須識者隨其大小
但作蚯蚓屎者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合
成一金以之治病神驗不可論宿癘風氣百日服者皆
得痊愈故叙而述焉○凡雄黃皆以油煎九日九夜乃
可入丹不爾有毒慎勿生用丹必熱毒不堪服宜慎之

金合和治卒鬼擊鬼疝鬼刺心腹痛如刺下血便死不知
人及卧魘嚙脚踵不覺者諸惡毒氣病方

此是漢文帝時
太倉君合淳子意

方故
名

特生礬石

皂莢

雄黃

藜蘆

各等分

右四味治下篩取如大豆許內管中吹入病人鼻得嚏

則氣通便活若未嚏復更吹之以得嚏為度此藥起死回生

小金牙散 治南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼疰方

金牙 每分 雄黃 草薺 黃芩 蜀椒

由跋 桂心 莽草 天雄 朱砂

麝香 烏頭 各分 牛黃 壹分 蜈蚣 壹枚 陸寸者

細辛 萎蕤 犀角 乾薑 各分 黃連 肆分

右十九味治下篩合牛黃麝香搗二千杵温酒服錢五

匕日二夜一以知為度絳囊盛帶男左女右一方寸匕

省病問孝不避夜行塗人中晨昏霧露亦塗之

大金牙散 治一切蠱毒白疰不祥醫所不治方

金牙 鸛骨 石膏 各分 斑蝥 柒分 活草子

胡燕矢 白木 雷丸 龍牙各屋分 銅鏡鼻

梔子人 乾擦 龜甲 龍甲 鬼督郵

桃白皮 大黃各分 桂心 為藥 徐長卿

羚羊角 射干 升麻 鳶尾 馬目毒公

蜂房 細辛 乾薑 芒消 由跋

犀角 甘草 狼毒 蜣螂 龍膽

狼牙 雄黃 真珠各分 芫花 莽草

射罔 烏梅各壹 蛇蛻皮青尺 鐵精 赤小豆各壹

地膽 樗雞 芫青各柒枚 桃奴 巴豆各壹枚

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之碎百

邪治九十九種症一本有藥射香白無白木

重刊孫真人備急千金要方卷之十一

書 號 碼 善 510.87 V.14
 12-1
 著 譯 者 孫君邈
 書 名(重刊孫真人)備急千金要方

號 數	借 期	還 期	號 數	借 期	還 期

出借符

出借符不

借閱者注意

- (一)加意愛護勿失原有形狀
- (二)損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三)借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四)逾期不歸還者應照章納金

圖書號數 善 510.87 V.14
 圖書冊數 12-1
 登記號數 63285

