

善
510.87
12-1
19



重刊孫真人備急千金要方卷之十七 肺藏

肺臟脈論第



論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之藏也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣內主腎與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻主藏魄號為魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣為欬在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝腎滿仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣交及於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物

凡肺藏象金與大腸合爲腑其經手太陰與陽明爲表裏
其脉浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萋
萋枝條杌然獨在其脉爲微浮衛氣遲榮氣數數則在上
遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲邪
所中二氣感濕故陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊
則爲慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出曰中曰
發暮中暮發藏有遠近脉有遲疾周有度數行有漏刻遲
在上傷毛采數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽
氣下陷陰氣則溫陽反在下陰反在巔故名曰長而且留
秋脉如浮秋脉肺也西方金也萬物之所以收成也故其
氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其
氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而

橫此謂不及病在中太過則令人氣逆而背痛愠愠然
及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本肺脈
來不上不下如循雞羽曰肺病巢源無不字

肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺死

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折羽
秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有
弦曰春病弦甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存
人皮革焦毛悴色夭死于夏

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗營
則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者

則爪皮一作枯毛折者則氣先死丙篤丁死火勝金也

肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其
脉微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子
爲虛邪雖病易治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘
母爲實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之
尅金爲賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘
肺木之陵金爲微邪雖病即瘥肝乘肺必作虛

右手關前寸口陰絕者無肺脉也若短氣欬逆喉中塞噎
逆刺手陽明治陽

右手關前寸口陰實者肺實也若少氣胃中滿臃腫腹脹
相引刺手太陰治陰

肺脉來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離

經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脈也

肺脈急甚為癩疾微急為肺寒熱怠惰欬唾血引腰背脊

若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風一作頭已下

汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胃背起腰內小

甚為殮泄微小為消痺滑甚為息貫上氣微滑為上下出

血澆甚為嘔血微澆為鼠瘻在頸腋腋之間下不勝其上

其能喜酸

肺脈搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏灌一作汗至

今不復發散

白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胃中喘而虛

名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黃帝問曰經脈十二而手太陰之脈獨動不休何也陰本

岐伯對曰足陽明胃脈也胃者五臟六腑之海
謂跌上大趾間上行其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行
之其行之也以息往來故人一呼脈再動一吸脈亦再動
呼吸不已脈動不止

黃帝問曰氣口何以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海
六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五藏氣口者
太陰是也藏腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬肺
藏主即呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胃滿則仰息其陽氣
壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉
水等肺在聲爲哭在變動爲欬在志爲憂憂傷肺精氣片
於肺則悲

味主秋結滿而血者病在腎及以飲食不節得病者取之
合故命曰味主合

病先發於肺喘欬三日之肝脅痛支滿一日之脾閉塞不
通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出
病在肺下晡慧日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麋肉得之不者當以夏時發
得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝攣髀
臑胫足皆痛虛則少氣不能報息耳聾啞乾取其經手太
陰足太陽之外厥陰內少陰血者

肺脈沈之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便
赤肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風

肺病其色白身躰但寒無熱時時效其脉微遲為可治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸臑中百壯背第三椎二十五壯

邪在肺則皮膚痛發寒壯上氣氣喘汗出效動肩背取之膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷其人勞倦則效唾血其脉細緊浮數皆吐血此為躁擾嗔怒得之肺傷氣擁所致也

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

肺中寒者其人吐濁涕

肺水者其人身體腫而小便難時時大便鴨瀉

肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大

跌陽脈浮緩少陽脈微緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳
診得肺積脈浮而毛按之辟易脅下時時痛逆背相引痛
少氣善忘目瞑結癰皮膚膏寒秋愈夏劇主皮中時痛如蠶
緣之狀甚者如針刺之狀時瘡色白也

肺之積名曰息貫在右脅下覆大如杯久久不愈病洒洒
寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺
肺當傳肝肝適以春土王者不受邪肺復欲還心心不肯
受因留結爲積故知息貫以春得之

肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脈當短濇今反浮
大其色當白而反赤者此是火之剋金爲大逆十死不治

商音日人者主肺聲也肺聲哭其音磬其志樂其經手太陰
脈逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷傷
則寒寒則虛虛則厲風所中嗑吸戰掉語聲嘶塞而散下
氣息短懣四肢僻弱面色青葩遺失便利甚則不可治依
源麻黃續命湯主之方見第八卷中

又言音喘急短氣好唾此為火剋金陽擊陰陰氣沈陽氣
昇昇則實實則熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口赤
而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不
歌可治也

肺病為瘥者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見者
怕山湯主之方見第八卷中若其人本來語聲雄烈忽爾不亮拖
氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰

病勢當一 又此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應
源審治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人
金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發
動身輕精廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬不耐春夏春夏
感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正竦則肺應之正
白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大
大則虛虛則寒喘鳴多飲善病膺喉痺逆氣巨肩反膺陷
喉者則肺高高則實實則熱上氣肩有息欬逆合腋張脅者
則肺下下則逼賁迫肝善脅下痛鼻塞或壅而涕生息肉
好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆
脆則易傷於熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端正則和

利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病腎偏痛鼻亦偏疾
凡人分部陷起者必有病生大腸陽明爲肺之部而藏氣
通於內外部亦隨而應之沈濁爲內浮清爲外若外病內
入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內
出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休
否則藏神前變形于外人肺前病鼻則爲之孔開焦枯若
肺前死鼻則爲之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應
之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時
月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指脈點見顏
頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但氣出而不
還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄則
則爲青雖有天救不可復生面黃目白死枯骨死吉凶之

色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年上
不應三年之中禍必應也

秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經輸秋者金始治肺
將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及躰陰氣未
盛未能深入故取輸以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰
故取於合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在
腋下一動脉其脉根于太倉太倉在臍上三寸一夫是也

其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側
上循臂結肘中上臍內廉入腋下上出缺盆結肩髃前上
結缺盆下結胃裏散貫貫下抵季脅

其脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫
出腋下下循臍內行少陰心主之前下肘中後循臂內上

骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後
直次指內廉出其端合手陽明爲表裏陽明之本在肘骨
中同會于手太陰

太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中
散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則
手兌掌起起則陽病陽脈反逆大於寸口三倍病則欬上
氣喘渴煩心胃滿臍臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩
背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則欠欬小便遺數數則
陰病陰脈反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以
息季脅空痛死色變卒遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰
太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊腎發泄邪生則

腑傷溫隨秋受瀉其病相反若腑虛則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若藏實則為陽毒所損身熱生斑氣喘引飲故曰白氣狸病也
扁鵲云灸心肺二輸主治丹毒白狸病當依源為療調其陽理其陰則臟腑之病不生矣

肺虛實第二 脈四條 方十首 灸法三首

肺實熱

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也
治肺實熱曾憑仰息泄氣除熱方

石膏 搗兩

白前

杏仁

各三兩

橘皮

白木 各伍兩

赤蜜 共合

枸杞根皮

切貳升

右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分

三服

治肺熱言音喘息短氣好睡膿血方

生地黄切貳升 石膏搗兩 麻黃伍兩

杏仁肆兩 升麻 羚羊角

芒消各叁兩 赤蜜壹升 淡竹茹雞子大膏煎

右九味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分

三服

治肺熱胸不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥

泄胸中喘氣方

桃皮 羌花各壹升

右二味咬咀以水四斗煮取二斗五升去滓以故布手

巾内汁中薄膏温四肢不盈數日即歇

橘皮湯 治肺熱氣上欬息奔喘方

橘皮 麻黃 各參兩 乾紫蘇 刪繁作乾藍

柴胡 各貳兩 宿薑 杏仁 各肆兩 石膏 捌兩

右七味以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取

三升去滓分三服不瘥與兩劑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角 玄參 射干 雞蘇

芍藥 升麻 拍皮 各參兩 生地黄 切壹

梔子人 肆兩 淡竹茹 雞子大壹枚

右七味以水九升煮取三升分三服須利者下芒

消三兩更煮三沸

右肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘方

麻黃肆兩

甘草

五味子各叁兩

杏仁伍拾枚

母薑伍兩

淡竹葉切壹升

右六味咬咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升去滓分三服

烏師散治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫

起即頭眩欬逆上氣時忽忽心欲絕心下弦急不能飲食或吐膿血胷痛引背支滿欲嘔方

五味子一百部各兩茯苓

附子 茯苓

當歸

石斛

遠志

續斷各壹兩

細辛

甘草各壹兩

防風

蜀椒

紫苑

桂心

款冬花

乾薑各兩桃人各半

杏人各拾枚

杏人叁拾枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三後稍加至二匕
灸法

肺脹氣搶脅下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃管兩邊相
去一寸胃管在心下三寸

肺脹脅滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各
上七壯

肺與大腸俱實

右手寸口氣口以前前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱
實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收名曰
肺與大腸俱實也

治肺與大腸俱實令人氣憑滿黃散方

茯苓

麻黃各陸分黃耆

大青

桂心各陸分

細辛

杏仁各伍分

石膏貳兩

丹參半兩 五味子

甘草

貝母

橘皮

芍藥各壹兩

枳實參枚

右十五味治下篩為粗散帛裹一方寸匕半井花水一

升五合煮取七合為一服日再

肺虛冷

右手寸口氣口以并

肺陰虛者手少太陰經也病苦少氣不

治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱痿瘠風入肺方

防風

獨活

芍藥

秦椒

乾薑

黃耆

各肆拾貳銖

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

甘草

各參拾陸銖

秦艽

桂心

薯蕷

杜仲

人參

細辛

防己拾三銖

甘菊花

紫苑

各貳拾肆銖

貫衆貳枚

附子柒分

右二十一味治下篩以酒服方寸匕日二分有石膏時

酥 治肺虛寒厲風所傷語聲嘶塞氣息喘憊效唾

止氣嗽通聲方

酥

崖蜜

飴糖

生薑汁

生百部汁

棗肉

杏仁各研

甘皮伍具末

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁

等各減半止溫酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一

又方 猪脰叁具

大棗百枚

右二味以酒五升漬之秋夏七日春夏五日出布絞去

滓七日服盡二七日忌鹽羊脰亦得治效嗽胃脅支滿

多喘上氣尤良

肘後方治久嗽上氣
二十年者治不痊者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾寒方

棗肉貳升研

杏仁壹升

生薑汁

白糖

白蜜

生百部汁各壹升

右七味合和微火煎常攪約一炊久下之細細溫清酒服二合日二

補肺湯

治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起

口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方

五味子叁兩

乾薑

桂心

款冬花貳兩

麥門冬壹升

大棗壹升

棗壹升

粳米貳合

桑根白皮壹升

右八味以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三

升分三服

又方

黃耆伍兩 甘草

鍾乳

人參各貳兩 乾地黄

桂心 茯苓

白石英

桑白皮

厚朴

乾薑

紫苑

橘皮

當歸

五味子

遠志

麥門冬各二兩

大棗貳拾枚

右十八味以水一斗四升煮取四升分五服日三

夜二

又方治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲

食方

蘇子壹升桑白皮兩五半夏陸兩紫苑

陸兩

紫苑

人參

射干

五味子

杏仁貳兩

貳兩

款冬花

射干各壹兩

各壹兩

麻黃

乾薑

桂心貳兩

貳兩

細辛壹兩半

壹兩半

右十四味以水一斗一升煮取三升半分五服日

三夜二

又方治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪

無音聲而渴舌本乾燥方

五味子

蘇子

各壹升

白石英

鍾乳

各叁兩

欬冬花

竹葉

橘皮

桂心

桑白皮

茯苓

紫苑

各貳兩

粳米

貳合

麥門冬

肆兩

生薑

伍兩

杏仁

伍拾枚

大棗

拾枚

右十六味以水一斗三升先煮桑白皮粳米大棗

米熟去滓內諸藥煮取五升分六服日三

又方

治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾膿血芻脊

痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌或怒乾嘔心煩

耳中聞風雨聲面色白方

欬冬花

桂心

各貳兩

桑白皮

壹兩

生薑

五味子

鍾乳

各壹兩

粳米

伍合

大棗

拾枚

麥門冬

肆兩

右九味以咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去之內

藥煎取二升分三服温服之一方用白石英二兩廣濟

苑人參各口一
兩名紫苑湯

麻子湯治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方

麻子壹升 桑白皮 錫各壹斤 桂心 人參各貳

阿膠 紫苑各壹兩 牛薑叁兩 乾地黄肆兩

右九味以咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升

分五服

錫煎治肺氣不足咽喉苦乾方

作錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相

得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攪火上煎勿令

堅令連連服如雞子大清酒吞之日三夜二

治肺風氣痿絕四肢滿脹逆逆骨痛方

灸肺輸各二壯肺輸對乳引繩度之在第二椎下兩
傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱
虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖名
曰肺與大腸俱虛也

小建中湯治肺與大腸俱不足虛寒之氣小腹拘急腰痛

羸瘠百病

大棗拾貳枚 生薑一兩 桂心兩 甘草貳兩 芍藥陸兩

右五味以水八升煮取三升去滓內糖八兩煮三

沸分三服用後用黃耆人參各貳兩名黃耆建中湯

肺勞第三論一首 方二首 灸法一首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂閉格病則生矣

麻黃湯治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方

麻黃 杏仁 生薑 半夏 各伍分

紫蘇 肆分 白前 細辛 桂心 各參分

橘皮 貳分 石膏 捌兩 竹葉 切壹升

右十一味以水一斗煮取三升去滓分三服

半夏湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胃脅氣滿從胃達

背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛乏不足方

半夏 壹升 生薑 壹斤 桂心 肆兩 甘草

厚朴 各貳兩 人參

橘皮

麥門冬 各貳兩

右八味 以水一斗 煮取四升 分四服 腹痛加當歸

二兩

厚朴湯 治肺勞風虛冷痰澀水氣晝夜不得卧頭不得近

枕上 氣曾滿喘息氣絕此痰水盛溢方

厚朴

麻黃

桂心

黃芩

石膏

大戟

橘皮 各貳兩

枳實

甘草

秦艽

杏仁

茯苓 各參兩

細辛 壹兩

半夏 壹升

生薑 拾兩

大棗 拾五枚

右十六味 以水一斗三升 煮取四升 分五服

治喉痺氣逆欬嗽口中涎唾方

灸肺輸七壯亦可隨年壯至百壯

氣極第四論一首 方六首 灸法一首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病
為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒濕之氣客於
六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胃常欲自恚以秋庚
辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒
則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則其陰氣至溫氣生故甚
陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上
胃臆甚則唾血然陽病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其
表是以陰陽表裏衰主之源故知以陽調陰以陰調陽陽
氣實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脈則
治之若至六腑五臟半死矣

扁鵲曰氣絕不治喘奔作而冷汗出一日死氣應手太陰

大陰氣絕則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚其氣短息寒亦治百病令人力強能飲食去風冷方

鍾乳 別研

乾薑

桔梗

茯苓

細辛

桂心

附子

人參 各二兩

白朮 壹兩

防風

括婁根

牡蠣 各兩

右十二味治下篩酒服方寸匕日三漸加至二七五十

以上可數服得力乃止

千金要方云有冷加椒有熱加黃芩各二兩

黃耆湯治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損

之方

黃耆 肆兩

人參

白朮

桂心 各二兩

生薑 捌兩

大棗 拾枚

附子

參拾銖一方不用

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分四服

大醫宿圓治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於

六腑腹脹虛滿寒冷積聚百病方

礬石附後作礬石

乾薑

桂心

皂莢

桔梗

附子各參兩

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九日三漸加之慎熱及近火等

流東圓治氣極虛寒澀飲胃中痰滿心腹痛氣急不下飲

食方

硫黃

礬石

乾薑

附子

烏頭

桂心

細辛

白朮

桔梗

茯苓酪二

右七味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三漸加之以知

為度附後無自木杜結種為丸在州大冷夏月温食不

大前胡湯治氣極傷熱喘息衝胃常欲自恚心腹滿痛內

外有熱煩嘔不安方

前胡捌兩半夏 麻黃 芍藥各肆兩

生薑伍兩黃芩叁兩枳實四枚大棗拾貳枚

右八味以水九升煮取三升去滓分三服温

續命湯治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口燥

咽乾方

竹葉貳升麥門冬 小麥 生地黃各壹升

生薑 石膏各陸麻黃叁兩甘草壹兩大棗拾枚

右九味以水一斗煮取三升去滓分三服

灸法

嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯尺澤者在腕後肘中橫文
腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

積氣第五 論一首 灸法一十四首 九十一首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種
氣積聚堅大如杯若絆在心下腹中疾痛不能飲食時來
時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即嘔逆惡
心熱氣即說物不竟而迫怒氣即上氣不可忍熱痛上撿
心短氣欲死不得息恚氣則積聚在心下不得飲食喜氣
即不可疾行不能久立憂氣即不可劇作暮卧不安愁氣
即喜忘不識人語置物四方遠取不得去處若聞急即四
肢肘腫手足筋攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子

卒得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣圓方

烏頭

大黃

各茶

紫苑

半夏

前胡

細辛

丹參

茯苓

芎藭

桃人

胡洽作木只人

葛蒲

一作藥

石膏

吳茱萸

桂心

桔梗

各五分

人參

甘草

防葵

各壹兩

乾薑

蜀椒

各半兩

右二十味為末蜜丸梧子大酒服三九日三加至十丸

一方去半夏加甘遂三分

胡洽無用丹參甘草

七氣圓

主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁

氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時

去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩暈

失精怒氣狀不可當熱痛上澀心短氣欲絕不得息恚氣

狀精聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不
可苦作卧不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢肘腫不
舉止亦治產後中風餘疾方

太黃貳兩

人參

半夏

吳茱萸

柴胡

乾薑

細辛

桔梗

葛蒲各貳分

茯苓

芍藥

甘草

蜀椒桂石膏

桃人各叁分

右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下二三丸日三四
漸加至十九千金翼十味無茯苓芍藥甘草石膏桃人

七氣湯治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞

氣內傷五臟不調氣衰少力方

乾薑

黃芩

厚朴深師作桂心

半夏

甘草

括蕞根深師作橘皮

乾地黃

芍藥各貳分

蜀椒冬兩 師作桔梗

枳實每枚 人參壹兩 吳茱萸合

右十二味 㕮咀 以水一斗 煮取三升 分三服 日三

又方 治虛冷上氣勞氣等方

半夏壹升 人參 生薑 桂心 甘草各壹兩

右五味 㕮咀 以水一斗 煮取三升 分三服 日三

五膈圓 治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病 同藥服 以憂恚

思慮 食飲得之 若冷食及生菜 便發其病 苦心滿 不得氣

息 引背痛如刺之狀 食即心下堅大 如粉絮 大痛欲吐 吐

即瘥 飲食不得下 甚者及手足冷 上氣欬逆 喘息短氣 方

麥門冬 甘草各伍兩 蜀椒 遠志 桂心

細辛各叁兩 附子壹兩 人參壹兩 乾薑貳兩

右九味 為末 蜜和 丸 散 使 泔 先 食 含 如 彈 丸 一 枚

咽之喉中曾中當執藥力稍盡復含一九日三夜一服

藥七日愈延年方云若不能含者日可分一大丸作七小丸盡服之夏月含共血麥冬門冬甘草人參胡洽

云亦可梧子大十九丸酒服之經心錄以吳茱萸代桂心酒服如梧子五丸空腹服之必如寒冷則心痛咽中有物

吐之不出咽之不入食飲少者

治結氣冷癥積在脅下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病

大蒜去心皮三升擣令極熟以水三升和令調絞取

汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁更擣

餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所

得滓可挑顆大棄却以微火煎取三升下牛乳三升

合煎取三升日起空腹一頓溫服令盡至申時食三

日服一劑二十日服十劑止

大蒜煎治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣欬刺風

風癩偏風半身不隨腰疼膝冷氣息不舌塞百病方

蒜陸斤肆兩去皮切水
肆斗煮取壹斗去滓

酥壹升內牛乳
肆升

葶撥

胡椒

乾薑

石蜜

阿魏

戎鹽

各貳兩

石菖蒲

木香

各壹兩

乾蒲桃

肆兩

右十二味為末合內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空
腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺四體安
和更加至六兩此治一切冷氣甚良

桔梗破氣圓

治氣上下不塞不能息方

桔梗

橘皮

乾薑

厚朴

枳實

細辛

葶撥

吳茱萸

白木

胡椒

蜀椒

烏頭

葶撥

人參

桂心

附子

茯苓

前胡

防葵

芫花

甘草

大黃

檳榔

當歸各捌分

右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十九日
有熱者空腹服之

檳榔湯

治氣實若積聚不得食息方

檳榔

冬茶枝

附子

壹枚

半夏

壹升

細辛

壹兩

生薑

捌兩

大黃

紫苑

柴胡

各叁兩

橘皮

甘草

紫蘇

冬用子

茯苓

各壹兩

右十二味以水一斗煮取三升分三服相去如人

行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲一兩防葵一兩

氣上加桑白皮切一升枳實厚朴各旦一兩消息氣力強

弱進一劑後隔十日更服前桔梗破氣圓

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫

所不治復謂是盡方

檳榔

大者肆

附子

壹枚

半夏

壹升

柴胡

冬兩

生薑

捌兩

橘皮

甘草

桂心

當歸

枳實

各貳兩

右十味以水一斗煮取三升分二服五日一劑服

三劑永除根本

半夏湯

治逆氣心腹滿氣上膈脇痛寒冷心腹痛嘔逆及

吐不下食憂氣結聚方

半夏

壹升

生薑

桂心

各伍兩

橘皮

肆兩

右四味以水七升煮取三升分四服日三夜一人

強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

又方

治逆氣心中煩滿氣悶不理氣上

方凡藥者皆以水一斗煮取四升分四服

貝母湯 治上氣咽喉空塞短氣不得卧腰背痛胃滿不得食面色萎黃方

貝母 壹兩

生薑 伍兩

桂心

麻黃

石膏

甘草 各貳兩

杏仁

冬拾枚

半夏

伍合

右八味以水一斗煮取三升分為二服日三

麻黃湯 治上氣脉浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲

死方

麻黃 捌兩

甘草 肆兩

大棗

冬拾枚

射干

如博棊子貳枚

右四味以井花水一斗煮麻黃二沸去沫內藥煮

取四升分四服日二夜一

奔氣湯 治大氣上奔胃膈中諸病發時迫滿短氣不得卧

劇者便溺欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

生薑壹斤

半夏

吳茱萸各壹斤

桂心伍兩

人參

甘草各叁兩

右六味以水一斗煮取三升分四服

枳實湯 下氣治胃中滿悶方

枳實叁枚 附子貳枚 大棗拾肆枚 半夏伍兩 人參

甘草 白朮 乾薑 厚朴各貳兩

右九味以水七升煮取一升半每服八合日三

下氣治氣滿腹脹方

半夏壹升 生薑壹斤 人參壹兩半 橘皮叁兩

右四味以水七升煮取三升去滓分三服日三

方無人參止三味

治氣兩脅滿急風冷方

杏人

茯苓

防葵各別分

吳茱萸

橘皮

桂心

防風

澤瀉各伍分

白木

射干

芍藥

蘇子

桔梗

枳實各陸分

右十四味為末蜜丸梧子大酒服十九日一加至三十

治氣滿閉塞不能食喘息方

訶梨勒十枚為末蜜丸如梧子食後服三丸不忌得

利即止

治上氣欬逆方

蘇子壹升

五味子

麻黃

細辛

紫苑

人參

黃芩

甘草

各貳兩

桂心

當歸各壹兩

生薑

伍兩

半夏

叁兩

右十一味以水一斗煮取二升分三服

治氣上不得卧神秘方

橘皮

生薑

紫蘇

人參

五味子各伍兩一方作桔梗

右五味咬咀以水七升煮取三升分三服

治執發氣上衝不得息欲死不得卧方

桂心半兩

白石英

麥門冬

枳實

白鮮皮

貝母

茯苓

檳榔人

天門冬

各貳兩半

車前子

貳兩人參

前胡

橘皮

白薇

杏仁

各壹兩半

郁李人

叁兩

桃人

伍分

右十七味為末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十九日

一二三至二十九

竹葉法

竹葉

紫蘇子各二升 紫苑

白前各二兩

百部

甘草

生薑各二兩

右七味咬咀以水八升煮取三升温下前九藥盡更合

人參湯

安食下氣理胃骨并治客熱方

人參

麥門冬

乾薑

當歸

茯苓

甘草

五味子

黃耆

芍藥

枳實各二兩

桂心各二兩

半夏

大棗拾伍枚

右十二味咬咀以水九升煮取三升去滓每服九合從

日三晡令盡皆熱服慎勿冷

海藻橘皮圓

下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔

令咽喉氣悶往來方

海藻

橘皮

白前各二兩

杏仁

茯苓

芍藥

桂心 各五分

蘇子 每合

棗肉

桑根白皮

昆布 各二兩

吳茱萸

人參

白朮

葶藶 各二兩

右十五味為末蜜丸如梧子大飲服十九日一加至十

五丸以利小便為度

治氣上方

礪砂

細辛

牛膝 各等分

右三味末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法

治上氣方

上酥 膏升

獨頭蒜 伍顆

右一味先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合共煎令

熟空腹溫服一方寸匕

治上氣嘔吐方

芥子二升為末蜜丸寅時并花水服如梧子七九日
一亦可作散空腹服之及有酒浸服并治臍下絞痛

治勞氣方

小芥子三升擣末絹袋盛酒二斗浸之密封七日去
滓温服半升漸至一升半得方更合忌如藥法

治上氣三十年不瘥方

大棗

杏仁

又曰豈伯枝

豉豉青伯貳拾粒

蜀椒

貳伯粒

右四味先擣杏仁豉人熟後內棗椒更擣為丸如棗核
大含稍稍咽之日二夜一

治積年上氣不瘥垂死者方

葶苈子

熬令色變

熟羊肝

薄切曝乾

右二味各擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食

空腹服一方寸匕須臾針兩食間以冷漿白粥一匕止
之隔日一服永瘥四十日內得煮飯汁作蕪菁羹食之
已外一切禁斷

下氣方

生薑 伍兩

小麥 青升

右二味以水七升煮取一升頓服

又方 大棗 貳柒枚

紫蘇葉 切壹升

右二味以酒二升煮取一升半分再服水煮亦得一方

加橘皮半兩 肘後方無棗用橘皮

治氣方

桃皮一斤去黃者以咀以水五升煮取二升 每服一升

又方 酒服鹽脂二合日一瘥止

又方黃牛乳一升煎散一升和生乳一升空腹服之日

又方驢乳初服三合二日後日別五合後至七合七日後

至一升忌葵菜猪魚油等

又方尿空腹服百日止治一切病

又方烏牛尿空腹服日再至一二升止

補氣虛逆方

大棗 叁升

甘皮 去脉 拾具

乾薑 貳兩

乾地黄 捌兩

右四味治下篩酒四升漬棗二宿漉出棗取酒為炊汁

將棗內甑中微火蒸令棗膏入釜中煎酒令餘二升

許候甑中棗只留皮核在乃止火貯器中將煎散及熱

下攪令調大畧與糖相似以酒服二合日再此方非止

補氣亦通治一切短氣并形體羸瘦甚良

大補氣方

乾地黃兩伍甘草

秦椒兩乾薑

昆布

地骨皮兩肆白朮

桂心 人參

厚朴

海藻兩叁羊腎

壹具去膏肆枚羊肚壹具去心如食法土人膏月管

右十二味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為

度及熱木臼合搗取肚腎與藥為一家曝乾更搗為散

酒服方寸匕日二

白石英散

明目利小便治氣及補五勞七傷無所不治方

鍊成白石英十兩

白石英無多少以錫子碾上細研

取白淨者為佳搗絹下之 絹袋於銅器中水飛之如作粉法如此一二度研訖

之漸漸去水水盡至白石英曝得乾者上粗惡者去之取中央好者在下有粗惡者亦去之更研

用者使熟白絹袋子盛置著藥於中以燒蓋之於三斗米下蒸之飯熟乾取出

之為

石斛

茯苓

各口陸分

澤瀉

茯苓

橘皮

各壹兩

莢絲子

叁兩

右七味治下篩總於堯器中研令相得重篩酒服方寸

匕日一不得過之猪魚鵝鴨蒜冷酢滑

補傷風治肺傷善泄效善驚恐不能動筋不可遠行膝不

可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引胃中卧不安

席忽忽喜夢寒熱小便赤黃目不遠視唾血方

天門冬精防風

澤瀉

人參

阿膠各壹兩

栝蒌根 前胡

芍藥

石膏

乾薑

大豆卷貳紫苑

白斂貳桂心

白木貳

乾地黄 甘草

薯蕷

當歸各貳兩半

右十九味治下篩食上酒服方寸匕日二

白石英圓 補養肺氣方

白石英 一作白石英脂

陽起石 磁石

黃絲子 菴蓉

乾地黄 各半兩 石斛

括蕞根 白朮

五味子 各二兩 防風

巴戟天 各伍分 桂心

人參 各壹兩 蛇牀子 半兩

右十五味為末蜜丸如梧子酒下十五丸加至三十丸 二十一日服

理氣圓 治氣不足方

杏仁 桂心 各壹兩 乾薑 益智子 各貳兩

右四味為末蜜丸如梧子末食服二丸以知為度

治冷氣氣短方

蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸一七日服之任意多少

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥

油

糖

酒

白蜜升

右五味合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服令盡宜慎生冷

天方 人參

甘草

茯苓

當歸各二兩

地骨皮

芍藥

芍藥

乾地黄

黃耆各三兩

大棗棗核

右十味以水一斗煮取三升分二服一方用桂

治卒短氣方

擣韭汁服一升方瘥

肘後方云卒上氣噤息便欲絕

治乏氣方

牛薑

枸杞葉各貳兩

右二味以水三升煮取一升頓服

治少年房多短氣方

鼓 藥合

梳子 貳 藥合

右二味以水一升煮鼓取一升半去鼓內梳子煮取八合服半升不瘥更服

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉吐嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止○上氣厥逆灸胃堂百壯穴在兩乳間

胃膈中氣灸關輪隨年壯扁鵲云第四椎下兩傍各一寸半名關輪

心腹諸病取滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不

消腸鳴泄利灸太倉百壯太倉穴一名胃房在心下四寸乃胃管下一寸○結氣

囊裏針藥所不及灸盲募隨年壯育募一穴從乳頭邪度

臍中陷去半從乳下行度頭是穴

下氣灸肺輸百壯又灸太衝五十壯

凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴
在臍下三寸

短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間○又灸大椎
隨年壯○又灸肺輸百壯○又灸肝輸百壯○又灸尺澤
百壯○又灸小指第四指間交脈上七壯○又灸手十指
頭合十壯○少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯○又鹽灸
臍孔中一七壯

乏氣灸第五椎下隨年壯

論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脅心下痛滿奄奄欲絕此為
奔豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之

奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半○又灸關元百壯穴

在臍下三寸○奔狫灸期門百壯穴直兩乳下第一助端
傍一寸五分

奔狫腹腫灸章門百壯章門一名長平一穴在大橫外直
臍季助端○奔狫捨心不得息灸中極五十壯中極一名
玉泉在臍下四寸

奔狫上下腹中與腰相引痛灸中府百壯穴在乳上二助
間○奔狫上下灸四滿一七壯穴俠丹田兩傍相去二寸
即心下八寸臍下橫文是也

肺痿第六 論一首 方五首

論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師
曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺
痿從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數

被賦藥下重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗
陽脈早索陰脈不澀二焦踈踈入而不出陰脈不澀身體
反冷其內反煩多唾膏燥小便反難此為肺痿傷於津液
便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欲效不得效效
出乾沫久久小便不利其脈平弱肺痿吐涎沫而不效者
其人不可渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也
此為肺中冷必眩師曰肺痿效唾咽燥欲飲者自愈自張
口者短氣也

溫臟湯治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不
渴不效甘白湯者屬上虛下不能制澀服此湯已小溫覆之

甘草肆兩

乾薑兩○集驗附後

右二味以水二升煮取一升半去滓分二服

甘草湯 治肺痿涎唾多出出血心中温温液液方千金翼名温液湯

甘草二兩 以水三升 煮取一升半 去滓 分二服

生薑甘草湯 治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方

生薑 伍兩 甘草 肆兩 人參 叁兩 大棗 拾貳枚

右四味 以水七升 煮取二升 去滓 分三服

桂枝皂莢湯 治肺痿吐涎沫不止方

桂枝 生薑 各叁兩 甘草 貳兩 皂莢 壹兩 大棗 拾伍枚

右五味 以水七升 煮取二升 去滓 分二服

麻黃湯 治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水方

麻黃 芍藥 生薑 仲景用 細辛

桂心 各叁兩 半夏 五味子 拾半 石膏 肆兩

右八味 以水一斗 煮取三升 分三服 小者加石

膏湯用甘草
二兩為丸味

肺癰第七論一首 方五首

論曰病欬唾膿血其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何類何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮緩胃氣如

經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺癰其脈數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯治欬曾中滿而振寒脈數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰者方

桔梗 參三兩集驗用貳兩 甘草 貳兩

右二味以水三升煮取一升去滓分二服必吐膿血也 一方有欬冬花壹兩半

瀉肺湯治肺癰喘不得卧方

葶藶 參三兩為末

大棗 貳拾枚

右三味先以水三升煮棗取一升去棗內藥一棗大煎

取七合頓服令盡二日服一劑可至三四劑治肺癰

胸脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭欬逆上氣

喘鳴迫塞未進此方宜先服小青龍湯却服前藥其青龍湯方在十八卷

黃昏湯治欬有微熱煩滿胃心甲錯是為肺癰者方

黃昏手掌大一片是合昆昏皮也欬咀以水三升煮取

一分二服

又方薏苡人瓜瓣半升挑人伍拾枚葦莖切二升水二斗煮取五升去滓

右四味欬咀內葦汁中煮取二升服一升當有所見吐

膿血

飛尸鬼疰第八論一首法十一一首方四十五首

論曰凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但天血氣息

急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癢堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

中風湯 治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃

甘草

各參三兩

當歸

芍藥

各貳兩

烏頭

拾枚

生薑

蜜

各壹斤

桂心

肆兩

右八味以咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服三合如人行三里又更進一服日三不知加至四合

蜈蚣湯 治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不

定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣

壹枚

牛黃

壹分

大黃

貳兩

丹砂

壹分

人參

各壹分

細辛

鬼臼

當歸

桂心

乾薑各二兩

黃芩

麝香各半兩

附子肆枚

右十二味以水一斗煮取二升去滓下牛黃麝香

末分二服

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時
捨心曾滿脅痛如刀刺口噤者方

甘草

乾薑

茯苓

乾地黃

羊脂

當歸

細辛各二兩

芍藥

吳茱萸

桂心各貳兩

梔子拾伍枚

右十一味以水八升煮取二升去滓內脂烱盡分

三服欲利者加大黃二兩

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

乾地黄

茯苓

芍药

当归

甘草

各壹兩

吴茱萸

桂心

乾薑

芍药

枳实

各壹兩

右十味以水八升煮取二升分二服痛甚者加羊

脂二兩當歸人參芍药各一两心腹坚急加大黄二兩

桃皮湯

治中惡氣心腹痛脅脹滿短氣方

桃白皮

壹握 真珠

附子

各壹兩

梔子

拾肆枚

當歸

叁兩

吴茱萸

鼓

各伍合

桂心

貳兩

右八味以水五升煮取一升去滓内真珠末分作

二服一方無當歸以下四味

桃奴湯

治中惡諸尸蟲

心腹卒絞痛方

桃奴

當歸

人參

乾薑

各壹兩

芍药

甘草

丹砂

麝香

茯苓

犀角

鬼箭羽

桂心

各二兩

右十一味以水九升煮取一升半去滓分一服未

食服大便不通腹滿者加大黃二兩芒消一兩胡洽有雄黃膏

兩無用砂考窮

治卒中風寒冷溫氣入腹虛脹急滿捨心腎脇又痛氣息不通脈弦緊汗不出及得傷寒方

吳茱萸

當歸

麻黃

獨活

甘草

桔梗

茯苓

各貳兩

桂心

青木香

石膏

大黃

犀角

各二兩

右十一味以水九升煮取二升分二服日二

治風冷氣入腹忽絞痛堅急如吹大小便閉小腹有氣結

如斗大脹滿起其脈弦老者沈遲方

瞿麥

當歸

猪苓

鬼箭羽

桔梗

防己

海藻

吳茱萸

芎藭

各二兩

桂心

大黃

各二兩

用犀角兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升分三服

治諸雜症相連續死亦治二十年衆症方

桃根白皮一斤咬咀以水一斗煮取一斗去滓分八

九服須令一日服盡確氏用桃根白皮治症腹痛不可忍者

又方擣桃人二十七枚研酒服**又方**小芥子末雞子白和傳

尸疰鬼疰者即立尸之中尸疰又挾諸鬼邪為害者也其

變動乃有二十六種至九十九種大畧令人寒熱淋瀝沈

沈默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯

以至於死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候者宜且急

疎之之方

獼肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具
不瘥更作

小附著散治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發一
日半日乃瘥須臾復發者方

細辛

甘草

一作莽草

天雄

各一分

桂心

各三分

附子

烏頭

乾薑

各壹兩

雄黃

真珠

各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知為度胡治有蜀

椒肆分不用桂心附子

大附著散

治五尸疰忤與前狀同者方

黃芩

由跋

椒目

細辛

雄黃

乾薑

黃連

各壹兩

金牙

犀角

麝香

牛黃各壹分 天雄

桂心各半兩 真珠各三分 蜈蚣壹枚

右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知為度

大金牙散治一切瘧病方見新十一卷中

金牙散治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊腎脇流無常處

不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者方

金牙 雄黃 鐵精 野葛 露蜂房

芎藭 大黃 甘草 曹青 蛇蛻皮

真珠 丹砂 蘭茹 乾漆各壹分 石長生

狸骨一作鸕骨 桔梗 鬼臼 鬼箭羽 鬼督郵

椒目 烏頭 狼毒 蕪荑 藜蘆

雷丸 鼈甲 滑石各壹分 毒公

胡燕菜 牛黃各壹分 人參 狼牙 寒水石

桂心各肆分

石膏伍分

蜈蚣

蜥蜴

附子各壹枚

蜣螂

亭長各柒枚

元青

徐長卿

斑猫各拾肆枚

貝母貳枚

右四十五味治下篩先食以酒服一乃圭日再不知漸

加之蟲隨大小便出

崔氏名蜀金牙散

白木散

治風入臟腑悶絕常自躁痛或風疰入身冷疰鬼

疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸瀉
移無有常劇驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲
食或進或退陰下濕癢或大便有血小便赤黃及中勞極

白木拾肆枚

附子

秦艽

人參

牡蠣

蜀椒

細辛

黃芩

芍藥

牛膝各叁分

乾薑

桂心

防風各伍分

茯苓

桔梗

當歸

獨活

柴胡

各肆分

烏頭

甘草

麻黃

石南

莽草

括萎根

天雄

杜仲

各貳分

右二十六味治下篩平日酒服五分匕訖如人行七里

久勢欲解更飲酒五合為佳

大乙治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼麻及中蠱

疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃

桂心

芫花

各貳分

丹砂

蜀椒

藜蘆

巴豆

各壹分

野葛

叁分

附子

伍分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更擣

合和調置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五匕可

加至半錢匕老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在腸

下利在四肢當汗出此之所為如湯沃雪手下皆愈方
宜秘之非賢不傳

龍牙散治百疰邪鬼飛尸萬病方

龍牙

茯苓各貳兩半雄黃

棗膏

芍藥各伍分

乾地黄

石劑

胡燕菜各叁分

鬼箭羽

烏頭

羌活

露蜂房

曾青

真珠

桂心

杏仁

防風

桃奴

鬼臼

鶴骨各壹兩

人參

大黃各壹兩半

白朮貳兩

蘇子肆合

銅鏡鼻

甘草

橘皮

芎藭

鬼督郵

遠志

鼈甲各半兩

狸陰貳具

蜈蚣壹枚

右三十二味治下篩酒服一斗圭以知為度當有蟲從大便出

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常者方

犀角 麝香 丹砂 雄黃 蜈蚣

鮫魚皮 丁香 鹿角 龍骨 藜荷根

蜀椒 乾薑各壹分 貝子拾枚

右干三味治下篩酒服方寸匕加至二七日三

備急散治卒中惡風氣忤迷絕不知人方見第十二卷

治暴心痛面無顏色欲死者方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之利即愈

治蠱疰方

燒猫兒屎灰水服之用雄猫兒

墨奴散治卒得惡疰腹脹方

金下墨壹合 鹽貳合

右二味合湯以水一升半煮取八合一服令盡須臾吐下即瘥

治哭疰方

梳齒間刮取垢水服之

又方

亂髮壹兩

臘月猪脂壹合

右二味取猪脂煎髮令消烱服之蟲死矣

又方

熬大豆帛裹熨之

治一切病食疰方

凡食上得病名曰為食疰

取金下土雞子大為末酢泔清一升和服之行五十

步吐即瘥

又方

還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如

杏人大米服之

蠶豆圓治遺尸飛尸積聚胃痛連背走無常處或在臟或腫在腹或奄奄然而痛者方

鶴骨

各肆分

丹砂

一作丹參

牡蠣

一作牡丹

雄黃

莽草

各肆分

藜蘆

桂心

野葛

各貳分

斑猫

芫青

各拾枚

巴豆

肆拾枚

蜈蚣

壹枚

右十二味為末蜜丸如小豆每服一丸日三以知為度

蠶腸圓

治癥堅水腫飛尸遺尸寒尸喪尸尸注骨血相注

惡氣鬼忤吐毒邪氣往來夢寤寤存亡流飲結積虎狼所齧

痢犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒毒即消婦人邪

氣鬼忤亦能遣之方

方與黃真聚篇重

蜥蜴

蜈蚣

蠶蟲

杏仁

各叁拾枚地膽伍拾

蠶蟲

肆拾枚

蜈蚣

朴消

巴豆

各壹分

澤漆

鬼督郵

桑赤雞

桃奴

犀角

各分

乾薑

虎骨

陸分

甘草

壹兩

芍藥

甘遂

各分

款冬花

右二十味別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下蜜搗

一萬杵丸如麻子大食前服三丸日一不下加之不取

吐下者一丸日服有人風冷注癖堅二十年得愈

杜神圓

治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消酒癖諸病

桔梗

藜蘆

皂莢

巴豆

附子

各分

右五味為末蜜和搗萬杵丸如梧子宿不食平日飲服

二丸仰臥服勿眠至食時膈上吐膈下下去惡物如科

斗蠟蟄子或長一一尺下後當大虛口乾可作雞羹飲

五合太極飲食粥一升三四日病未盡更服忌如藥法

十疰圓

治十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸

疰食疰水疰土疰等方

雄黃

巴豆

各貳兩人參

甘草

麥門冬

細辛

一作藁本桔梗

附子

皂莢

蜀椒

各壹兩

右十味末蜜丸如梧子空腹服五丸日再稍加以知度

大乙神明陷冰圖

治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長

病效逆唾噎辟除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胃中結

氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手

心中愠愠如有蟲狀毒注相染甚至滅門者方

雄黃

桂心

丹砂

礬石

礬石作礬蘆

大黃

各貳兩

元青

伍枚

真珠

附子

各壹兩半

麝香

人參

犀角

鬼臼

射罔

牛黃

各壹兩

蜈蚣

蜥蜴

各壹枚

烏頭

杏仁

各拾枚

斑蝥

標雞

地膽根各一兩

當歸各二兩

巴豆壹分

右二十四味為末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食服二

丸日再不知稍增以藥二丸著門上令衆邪不近傷寒

服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸聚

邪不能近也

胡洽無元青桂心真珠麝香白人參犀角烏頭射罔斯錫標雞牛黃當歸只十一味

積聚篇重

治萬病癥結積聚伏尸長病寒熱疰氣流行

皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣

惡症汗出口噤不開心痛方

蜀椒各二兩

人參

細辛

甘草各一兩

茯苓

丹砂

野葛

真珠

大黃

乾薑

烏頭

桂心

雄黃

麝香

鬼臼各一兩

烏頭

鬼臼各一兩

烏頭

烏頭

烏頭

烏頭

烏頭

牛黃各壹分附子

紫苑各壹分

巴豆陸拾枚

蜈蚣貳枚

右二十一味為末蜜丸如小豆飲服二丸加至四丸日二

加獺肝一具尤良

大度世圓

治萬病與前狀同者方

牛黃

大黃

雄黃

細辛

附子

真珠

甘草

人參

射罔

丹砂

鬼臼

莽草各壹兩

蜀椒

麝香

鬼箭羽

茯苓

桂心

紫苑各壹兩

乾薑冬三兩

野葛壹尺

蜥蜴

蜈蚣各壹枚

地膽伍拾枚

元青貳拾枚

樗雞冬三枚

巴豆人

捌拾枚

右二十六味末蜜丸如小豆飲服二丸日二先食服之

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝 壹斤

蜈蚣 壹枚

麝香 貳分

雄黃

莽草

丹砂

鬼臼

犀角

巴豆

大黃

牛黃 各壹分

右十一味末蜜丸如麻子空腹服二丸至三丸以知度

雷氏千金圓 治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺

及瘡方

消石 叁分

大黃 伍分

桂心

乾薑 貳兩

巴豆 人枚

右五味為末擣三千杵蜜丸如大豆服二丸神驗無比

已死者折齒灌之

治卒得尸疰毒痛往來方

杏仁

亂髮灰 各壹分

右二味研如脂丸如梧子每服酒下二丸日二姚氏緒膏和丸

治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心

乾薑 各壹兩

巴豆人 貳兩

右三味治下篩以上酢和如泥傅病上乾即易之

治遁尸尸疰心腹及身有痛處不得近者方

取艾小授令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令強熱

置艾上冷即易不過二二度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方

白芥子一升蒸熟擣以黃丹二兩攪和分作兩分用

踈布袋盛更蒸使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱

薄之如此三五度即定

治人皮膚中痛名曰癢疰方

醋和燕窠土傅之

治死症方

燒車釘令熱暫入水以濕布裹熨病上

治三十年氣症方

豉心半升

生椒壹合

右一味以水一升煮取半升適寒温用竹筒縮取汁令病者側卧手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥百千不可具說

灸法

凡五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸症也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胃傍攻兩脅或纒塊踊起或攣引腰背治之之法灸乳後二寸男左女右可一七壯不止者多其壯數取愈止○又灸兩手大拇指頭各

十壯○又灸心下二三寸十壯○又灸乳下一寸隨病左右

多其壯數○又以細繩量患人兩乳頭內即截斷中屈之

又從乳頭向外量使當肋鏡於繩頭灸三壯或七壯男左女右

又下疔攻心胃灸第七椎隨年壯○又灸心下一寸三壯

○又灸手肘文隨年壯

一切病食疔灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒疔不能飲食百病灸心下三寸胃管十壯

水疔中經云肺來乘腎食後吐水灸肺輸○又灸三陰

交○又灸期門穴在乳下一二肋間瀉肺補腎也各隨年壯

一切疔無新久先仰臥灸兩乳邊邪下三寸第二肋間隨

年壯可至二百壯又治諸氣神良一名注市

重刊孫真人備急千金要方卷之十七

還書日期

本校畢業生，現讀生及研究生均須照上述日期還書，若無其他讀者借閱，即可續借，本校教員與其他人員則須在每年第三學期末歸還所借書籍。

書 號 碼 善 510.87 V.19
 12-1
 著 譯 者 孫思邈
 書 名 (重刊孫真人) 備急千金要方

號 數 借 期 還 期

出借得

出借得

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

圖書號數 善 510.87 V.19
 圖書冊數 12-1
 登記號數 63290

