

善
510.87
12-1
16

16



63287

重刊孫真人備急千金要方卷之十四 小腸腑

孫真人備急千金要方

小腸腑論第一

孫真人備急千金要方

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者

受盛之腑也辨監倉君更重一斤十四兩長二丈四尺廣二

寸四分難經甲乙云長三丈二尺大後附脊左回疊積其

注於回腸者外傳臍上回運環反十六曲常留水穀一斗

四升其一斗二升是水一斗一升是穀難經云十六曲盛谷合貳斗四升水六升三合二十四氣也

合之太半甲乙云受三二斗三合合之太半膺厚人中長

以候小腸

小腸病者小腹痛腰脊控辜而痛時窘之復耳前執執若寒

甚獨肩^上熱及手小指次指之間執執若脈滑者脈經作略

此其候也

小腹控辜引腰脊上衝心邪在小腸者連辜系屬於脊貫
肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於育結聚
臍故取之育原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取
巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也若臍痺小腹中有疝
瘕王月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中
入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內
熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節
陷中

小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸脹者小腹臘脹引腹痛

心前受病移於小腸心欬不已則氣與欬俱出
惡氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮及厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者
小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉冲小
者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

扁鵲云手少陰與太陽爲表裏所以表清裏濁清實濁虛
故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則口張
口爲之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發暴水其根在
小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白
汗不止

手太陽之脈是動則噎痛頰腫不可以頰有似按臑似折
是主液所生病者有齲頰黃頰頰腫頰有臑肘臂外後廉
痛經脈支別已見心藏部中

小腸虛實第一 脈二條 方二首
灸法二首

小腸實熱

左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身執寒
去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱也

治小腸實熱脹口瘡方

柴胡 澤瀉 橘皮用黃芩 旋復花

枳實 升麻 芒消各三升 生地黃切壹升

右九味以水一斗煮取二升去滓下芒消分三服

大黃圓 治小腸實熱結滿不通方

大黃

芍藥

葶藶 各貳兩 大戟

朴消

各參兩

杏仁

伍拾枚

巴豆

柒枚

右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人七丸小兒二

三九日一熱去日一服

灸法

小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去一寸

小腸泄痢膿血灸魂舍一百壯小兒減之穴在俠臍兩邊

相去各一寸

翼云相去一寸

又灸小腸輸七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前筋陽虛者手太陽經也病苦顛際偏

頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊懷補之方

乾薑 冬三兩

當歸

黃蘗

地榆 冬三兩

黃連

阿膠 冬三兩

石榴皮 冬三枚

右七味以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取

膠烱盡分三服

舌論第三

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脉凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟

肺調之舌縮口噤腎青升麻前主之方見第六卷中

風眩第四補卷既有而風方不當分

以餘方相雜故此特立風眩方條專出徐氏

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自

謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究也少

採用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論

以貽於後云爾

夫風眩之病起於心氣不定胃上蓄實故有高風面熱之

所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩

大人曰癩小兒則為癩其實則一此方療治萬無不愈但

恐證候不審或致差違大都忌食十二屬肉而貴膠為患

發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因

此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜
急與續命湯也困急時但度灸穴便火針針之無不瘥者
初得針竟便灸最良灸法次列於後余業之以來二十餘
年所救活者數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸勿參
以餘術焉

續命湯治風眩發則煩悶無知口沫出四體角弓自反上
口噤不得言方

竹瀝膏升

生地黄汁膏龍齒

生薑

防風

麻黃各肆兩防已參兩

附子參三分

石膏柒兩

桂心貳兩

右十味以咀以水一斗煮取二升分二服有氣加附子
作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開四肢

尚未好定而心中尚不除者此藥石湯主之方見下第五篇紫石膏散是也

買移湯治氣奔急欲絕者方

吳茱萸壹斤 石膏

人參

半夏

芍藥各四分 桂心

芍藥

生薑各肆分

生葛根

茯苓各拾分 當歸肆兩

李根皮壹斤

右十一味咬咀以水七升清酒八升煮取三升分三服

防己地黃湯治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂

防己

甘草各貳兩 桂心

防風各叁兩

生地黃伍斤別切勿令合藥漬疾小輕用貳斤

右五味咬咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著竹

簣上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器承取

汁飯熟以向前藥汁合絞取之分再服

書爾湯治心中驚悸而四肢緩頭面熱心脅痠滿頭目眩

冒如欲搖動者方

薯蕷

麥門冬

人參各肆兩 生地黃

前胡

芍藥各捌分 枳實

遠志

生薑各叁分 茯苓

茯神各陸分 半夏伍分

甘草

黃芩

竹葉各貳分 秫米叁合

右十六味咬咀取江水高舉手揚二百九十下量取三

斗煮米減一斗內半夏復減九升去滓下藥煮取四升

分四服無江水處以千里東流水代之投手令上頭也

秦中無江水涇渭水可用諸葛灌劍由尚取之

少風湯服前湯後四體尚不涼冷頭目眩轉者服之此湯

大勝宜長將服但藥中小小消息隨冷隨暖耳仍不除痰者依此方

防風

石膏

人參

赤石脂

白石脂

生薑

龍骨

寒水石

茯苓各二分

桂心一分

紫石一分

右十一味咬咀以水八升煮取三升分三服凡用井花水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉續勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

醫類方

薯蕷一分

甘草一分

澤瀉

人參

當歸

白斂

桂心

防風

麥門冬

山茱萸

桔梗

芍藥

紫苑

大豆黃卷

乾地黄 白木

芍藥

乾薑

蜀椒各二分

上二十一味並用特篩生地黄拾捌斤搗碎取

麋鹿雜藥

鹿角膠兩大棗拾

麻子人

研蜜各叁升

桑根皮

伍升 忌岡上自出上者大青大已近

右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得一

斗去滓次下地黄汁膠髓各壹斤煎減半內前諸末併煎令

可丸如雞子黃大飲服一枚日二稍加至三九

黃蘗圓

治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲方

薯蕷

貳拾捌分

甘草

貳拾分

鹿角膠

大豆黃卷

桂心

各叁分

乾地黄

神麴

當歸

人參各拾分

麥門冬

防風

黃芩

芍藥

白木各陸分

柴胡

桔梗

茯苓

杏仁

黃蘗各伍分

白斂 乾薑 治女三 大棗 香油 拔毒膏

右一十二味為末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一九

天雄散 治頭目眩暈屋轉旋倒者方

天雄 防風 芎藭 人參 獨活

桂心 葛根各二分 莽草肆分 白朮 遠志

薯蕷 茯神 山茱萸各陸分

右十二味治下節先食以菊花酒服方寸匕日一漸加

至三匕以知為度九月九日取郢州甘菊

人參圓 治心中時恍惚不定者方

上黨人參 鬼臼 鐵精 牛黃

丹砂 雄黃 大黃 芎藭

防風

各言冊 蜥蜴

赤足蜈蚣

各言冊

右十一味為末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七九日
三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青衣人喪孝
不具足人及濁穢六畜雞犬鼠等

灸法

其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一
頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半
合於口之全度中屈之先覓頭上迴髮當迴髮灸之以度
度四邊左右前後當繩端而灸前以面為止並依年壯多
少一年凡一二灸皆須瘡瘻又灸壯數如前若連灸火氣引
上其數處迴髮者則灸其近當鼻也若迴髮近額者亦宜
灸若指面為癩則闕其面處然病重者亦不得計此也

良藥

虎兔龍蛇牛馬猪羊雞犬猴鼠

右十二相屬肉物比且不得食及以為藥牛黃龍骨藥用

不可廢

嗣伯啟其於方術豈有效益但風眩最是愚衷小瘥者常自寶秘誓不出手而為作治亦不令委曲得法凡有此病是其所治未有不瘥者若有病此而死不逢其故也伏願問人立知非其之自誇毀下既需此方謹封上呈其鄙志尚存謹自書寫年老日闇多不

成字伏願恕亮謹啟

風癩

論六首

針灸法四十八首

方三十四首

論曰黃帝問曰人生而病癩疾者安所得之岐伯對曰此

得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并
居故令子發為癩疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且
熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癩初發歲一
發不治月一發不治四五日一發名曰癩疾刺諸分其脉
充寒者以針補之病已止癩疾始生先不樂頭重直視舉
目赤其作極已而煩心候之於額取手太陽陽明太陰血
變而已癩疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太
陰手太陽血變而已癩疾始作而引口啼呼甲乙作喘悸者候
之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止
治癩疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者
即寫之置其血於瓢壺之中至其發時血獨動矣不動灸
窮骨二十壯窮骨者尾髀也

胃癲疾者頰齒諸刺分肉皆滿而胃倨強有汗出煩熱嘔
多涎沫氣下泄不療

筋癲疾者身拳攣急脈大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣
下泄不療

脈癲疾者暴仆四肢之脈皆脹而從滿脈盡刺之出血不
滿俠項灸太陽又灸帶脈於腰相去三三寸諸分肉本輸嘔
多涎沫氣下泄不療

治癲者病發而狂面皮厚數數者死不療

凡癲發則臥地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者
癲疾脈搏大滑久自已脈沈小急實死不療小牢急亦不
可治脈虛可療實則死矣厥成爲癲疾五臟不平六腑閉
塞之所生也厥成爲癲故附厥於此條也陰衰發執厥

寒發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首面重足不能行發爲胸仆陽明之厥癰疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛

髀不可以運太陰之厥腹滿腹脹後不利不欲食食則嘔
不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫
痛腹脹淫洩不利好卧在膝陰縮腫胛內外一作熱盛則瀉
之虛則補之不盛不虛以經取之上寒下熱先刺其項太
陽久留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而
上之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣
下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒
厥者留針反為熱刺熱厥者一陰一陽刺寒厥者一陽一
陰所謂一陰者一刺陰也所謂一陽者一刺陽也
論曰溫病熱入腎中亦為瘕小兒病瀉熱盛亦為瘕凡因
瘕暴尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言久厥則
成癰是以知似也

論曰癩病有五
一曰陽癩發時如死人遺溺有頃乃解二
曰陰癩坐初生小兒時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風
癩發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由執作汗
出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣
脈悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未
止得之五曰馬癩發時反目口噤手足相引身皆熱坐小
時膏氣腦熱不和得之

治五癩方

銅青

雄黃

空青

東門上雞頭

水銀

各壹兩

茯苓

猪苓

人參

白芷

白斂

白薇

石長生各兩

卷柏

烏翳

各半兩

硫黃

壹兩半

右十五味為末以青牛膽和著銅器中於甑中五斗大

豆上蒸之藥成丸如麻子先食服二十九日再夜一

分頭圓治濕癩瘰癧口眼張大口出白沫或作聲或死不

知人方 千金翼方曰大鎮心丸主諸癰所不療者

虎睛 春真酒浸一宿炙之

鬼箭羽

露蜂房 分獨活

遠志

細辛

貫衆

麝香

白斂 一作白薇

升麻

白鮮皮 炙 牛黃

防風

秦艽

防葵

龍齒

黃芩

雄黃

山茱萸

乾地黄 一方二升乾薑

防己

茯苓

鐵精

鬼臼

人參

大黃

銀屑 各肆分

茯神

石膏

天雄 各伍分

寒水石 陸分

蛇蛻 壹尺

右二十一味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再

稍加至一十五丸神方

凡癩發之候其狀多端口邊白沫動無常者治之方

秦朮

人參

防葵

防風作

茯神

一作

甘草 各貳兩

鈔丹

壹兩

貫衆

壹枚

右七味以水九升煮取三升半分三服

雄雄圓

治風癩失性顛倒欲死五癩驚驚攣方

雄黃

雌黃

真珠

各壹兩

鈔 貳兩熬

丹砂

貳分

水銀

捌分

右六味為末以蜜搗二萬杵丸如胡豆大先食服二丸

日一稍加以知為度

古今錄驗云療五癩牛顛則牛鳴馬顛則馬鳴狗顛則狗鳴羊顛則

羊鳴雞顛則雞鳴病五癩狂病者皆由氣起寒厥不識人氣爭言言方吐沫久而得蘇者

續命風引湯

治中風癩眩不知人狂言舌腫出方

麻黃

芍藥

石膏

人參

防風各三

桂心

甘草

獨活各二防已

附子

當歸各二

杏仁各二

陳薑各二

一本無陳字

右十二味咬咀以酒二升水一斗合煎取四升分四服

日三夜一

紫石膏治大人風引小兒驚癇瘈瘲日數十發醫所不療

紫石英

滑石

白石脂

凝水石

赤石脂

石膏各二

甘草

桂心

牡蠣各二

大黃

龍骨

乾薑各二

右十二味治下篩為粗散盛以韋囊懸於高涼處欲用

取二指撮以新汲井水二升煮取一升二合大人頓服

未白日兒服一合未能省綿活者口中熱多者日四五

服以意消息深冰節方只龍骨乾薑甘

治百二十種風癩癩驚狂發即吐沫不識人者四月五月

宜服之方

紫石英 芍藥

龍骨 一本用黃芩

青石脂

白鮮皮 麻黃

當歸

甘草

括婁根

桂心

人參略貳牡蠣參三兩大黃伍兩

右十三味治下節為粗散分作七裹每以大棗十枚水

二三升煮取一升半去滓下一裹大棗汁中煎取去滓頓服相

去七日一服服訖即瘥

治癩癩瘕時發作方

防葵

代赭

人參

鈔州

白殭蠶

生豬齒

釣藤

茯神

雷丸

虎骨

遠志 桂心 防風各一分 卷柏 蔓菁子

光明砂 升麻 附子 牡丹 龍齒各一分

牛黃貳分 白斂肆分 蚱蟬拾肆枚 蛇蛻皮

白馬眼睛各壹具

右二十五味治下節酒服方寸匕日一亦可為丸良驗

芎藭湯 治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭 藁本 閻茹各伍兩

右三味以咀內酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服

取大汗

治風癩方 經心錄名與頭丸

葶藶子 鈔丹 虎掌 烏頭 括婁根各一分

甘遂 天雄 蜀椒 大戟各貳分 白木壹分

鐵精

蘭如粉 膏 鴉頭 膏 拔

右十二味為末蜜丸如梧子湯酒下一丸日三服

又方 地黃 冬拾斤 天門冬 拾斤

右二味擣取汁作煎服之瘥

又方 良姜子二升擣篩酒一斗漬半日絞去滓湯中煎令

可丸先食服如小豆二丸加至如梧子二丸以知為

度額上手心中從文理中赤起是知也無此候更服病

日發者二日愈間日發者十日愈五日發者二十日

愈半歲發者一月愈

治癩癧痢瘰方

鉛丹 壹斤 飛鷓頭 貳枚

右二味為末蜜丸先食服二丸日二劑者夜一稍加之

通治五臟六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結
滯氣冷熱諸風癩癩寒疾耳聾頭風四肢拘攣
萬病久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長
而味苦令人利擣絞取汁一斗漬麴二升麴發以糯
米一斗准家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人
肌酸之酒熟取清服一盞常令酒氣相接勿至醉吐
慎生冷酢滑雞猪魚蒜特慎鯉魚亦忌油膩此是一
斗汁法餘一石二石亦准此以為大率服藥十日覺
身體癢疹大癢二十日更大癢三十日乃漸止此皆
是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有
所得五十日更覺大快當風坐臥覺風不著人身中

諸風悉盡用米法先淨淘米曝炕令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯甚宜且密封取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切去壓取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之又停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月多合擬到來年五月二十日以來相續服之春二月亦得合又四月不得合服酒時若得散服得力更倍速散方如左

散方 天門冬去心皮曝乾搗作末以上件酒服方寸匕日三加至二匕又服長生凡酒亦得服

灸法

大人癩小兒驚癩灸背第一椎及下窮骨兩處以繩度中
掛繩端一處是脊骨上也凡三處罷復斷繩作三折令各
等而參入合如么字以一角注中央灸下一二角俠脊兩邊便
灸之凡五處也故畫圖注以丹注所灸五處各百壯削竹
皮爲度勝繩也

卒癩灸陰空上宛宛中二壯得小便通即瘥

千金翼云當
系乳上是穴

○又灸陰空頭二壯○又灸足大趾上聚毛中七壯○又

灸囊下縫二七壯○又灸兩乳頭二壯○又灸督脉三十

壯二報穴在直鼻中上入髮際○又灸天窗百會各漸灸

三百壯炷惟小作○又灸耳上髮際各五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生於陽
曰陽何以使入狂曰陽氣因暴折如難決故善怒病名曰

陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少陽不動不動而動大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪之食即已使之服以生鐵落爲後飯夫生鐵落者下氣疾

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆瀆備諸火灸乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此爲邪非狂自依邪方治之邪入於陽則爲狂邪入於陰則爲血痺邪入於陽傳即爲癲瘖邪入於陰傳則爲痛瘖陽入於陰病靜陰入於陽病怒

論曰陽治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體中酸削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之後勞動疲極或觸犯忌諱衆譴不節婦人產生之後月經不利

時下青赤白脫體不生肉虛羸度小便不利或頭身發熱
旋復解散或一度交接彌日困極皆主之方

龜甲杀枚 甘草 白薇一作貝母 黃芩今略

麻黃 芍藥 白木各半 防風各二兩 凝水石

桂心 茯苓 知母各肆兩 石膏陸兩

右十四味以水二斗煮取四升溫服一升日三夜

分物 **黃圓** 治男子活鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休

止皆邪氣所為不能自絕方

牛黃土精 荆實人精 曾青龍精 玉屑白虎

空青天精 雄黃地精 玄參龍精 龍骨水精 赤石脂朱

右九味名曰九精上通九天天下通九地各一兩治下篩

蜜和丸如小豆先食服一九日二劑加以知為度千金云

凡邪病當服五
邪湯九精丸瘥

十言散治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽忽
喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高
墮下落水所致悉主之方

雄黃

人參各伍黃芩

大黃

黃蘗

黃耆

細辛

桂心各叁黃連

黃芩

蒲黃

麻黃各壹黃環

澤瀉

山茱萸壹

右十五味治下篩末食温酒服方寸匕日二不知加至
一二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生薑一分

崔氏有蜀椒伍
分乾薑肆分

以神散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁憂志怒喜
無常或半年數月一發動者方

桂心

茵芋

天雄

葛蒲

細辛

茜根

附子

乾薑及口薑兩

白朮

桑上寄生各二兩

右十味治下篩酒服方寸匕日三凡修合口勿入令婦人雞
大及病者病者家人知見令邪氣不主禁之為驗

治鬼魅方

東海禽頭即由數根

黃牙石一名金牙

菖若子

防葵各壹分

右四味治下篩酒服方寸匕欲令病人見鬼加防葵一
分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵菖若子亦令人
迷惑恍惚如狂不可多服

治邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

遠志

獨活

甘草

白朮

人參

石膏

牡蠣

秦艽

防己

葛蒲

茯神

雄黃

蘇頌作黃丹

蛇蛻皮

各壹兩

右十七味咬咀以水一斗煮取四升分四服亦可如煮

散法服之

人參湯 治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳

動恍惚不定方

茯神

人參

葛蒲

茯苓

赤小豆

右五味咬咀以水一斗煮取一升半分二服

人參湯

治風邪鬼氣往來發作有時

或無時節者方

人參

防風

烏頭

乾薑

澤瀉

栝蒌根作干餘糧

狗脊

遠志

附子

黃芩

獨活各日

秦艽

牡蠣

五味子

山茱萸

前胡

細辛

石膏

芎藭

蜀椒

牛膝

甘草

石南

桑根白皮

桂心

麻黃

竹皮

白朮

橘皮各日

鬼箭千金翼作澤蘭

茯苓各日

大棗拾陸枚

右三十一味以水六升酒六升合煮取四升分五

服日二夜一

虎睛湯

治狂邪發無常被髮大叫喚欲殺人不避水火方

虎睛

露蜂房

鴟頭各書具

楓上寄生各日

石長生拾分

茯苓

桂心

防風各日

獨活

甘草

人參

天雄各書具

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服夜一

方防葵

人參

貫衆

各五兩

防風

桂心

各三兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦可

又方

苦參五斤蜜和丸如酸棗大單服十九

治卒發狂方

令患人著地仰卧以冷水終日淋其面良

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆夫

治魅方

水服鹿角末方寸匕日二

又方

水服獺肝末日二

治狐狸諸色精魅作種種惡及令人恐怖狂癩風邪方

雄黃陰丹

油膏

右一味破雄黃如菓子大鑊中以盆合口頭作竈微火煎九日九夜不得少時火絕亦不得火冷須火熱微微不絕神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎減半去滓更煎之可丸如梧子大服一九合時勿令人見黃芩方及大豆紫湯皆可服汗出佳

又方燒蝦蟇末水服方寸匕日三

又方燒人屎交酒服慎生於酢滑猪雞魚蒜等

又方以水服伏龍肝方寸匕日三

治諸橫邪癩狂針灸圖訣

論曰九諸百邪之病源起多途其有種種形相示表癩邪
之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾談或或
或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝
夜遊走或嗔罵無度或是蜚語與精靈手亂目急如斯種種
癩狂之人今針灸與方藥並主治之凡占風之家亦以風
為鬼斷

扁鵲曰百邪所病者針有十二穴也凡針之體先從鬼宮
起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴
即可知矣若其邪蠱之精復自言只說論其由來往驗有實
立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右
起針若數處不言便遍穴針也依訣而行針灸等事並備
主之仍須依掌訣捻自治之萬不失一黃帝掌訣別是術

家秘要縛鬼禁劫五慈四瀆山精鬼魅並悉禁之有日在

人兩手中十指節間第一針人中名鬼宮從左邊下針右

邊出第二針手大指爪甲下名鬼信入肉二分第三針足

大趾爪甲下名鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心

入半寸即太陽穴也第五針外踝下白肉際足太陽名鬼路火

針七銜銜二下即中脈穴也第六針大椎上入髮際一寸名鬼

枕火針七銜銜二下第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五

分名鬼牀火針七銜銜二下第八針承漿名鬼市從左出

右第九針手橫文上二三寸兩筋間名鬼路即勞宮穴也第十針

直車上入髮際一寸名鬼堂火針七銜銜二下即上星第

十一針陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十一針

又澤橫文外頭接白肉際名鬼臣火針七銜銜二下此即

穴第十一二針舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼封
仍以一板橫口吻安針頭令舌不得動已前若是手足皆
相對針兩穴若是狐穴即單針之

邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口管裏中央絃絃者是也
鬼祿又用剛刀決斷絃絃者乃佳

邪病卧瞑瞑不自知風府主之一名鬼穴

邪病大喚罵言走灸十指端去爪一分一名鬼城

邪病大喚罵走遠三里主之一名鬼邪

邪病鬼癩四肢重恩上主之一名鬼門

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之尺中動脈一名鬼受

邪病語不止及諸雜候人中主之一名鬼凡人中其先押

鼻下是也

灸心法狂癲不識人癲病眩亂灸百會九壯

狂走擊癡灸王枕上三寸一法頂後一寸灸百壯

狂走癲疾灸頂後一寸十一壯

狂取鬼語灸天窻九壯

狂走癲疾灸大幽百壯

狂言恍惚灸天樞百壯

狂走癲癇灸季肋端三十壯

狂癲哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後六寸

狂走驚癲灸河口五十壯穴在腕後陷中動脈是明也此與陽

狂顛風癲吐舌灸胃管有壯不針

狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及狂言妄語灸

間使二十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間亦多發驚心歌哭

狂走喜怒悲泣灸臣覺一擗隨年壯穴在背上甲內側灸

手所不及者覺亡穴上捻之痛者是也

狂邪鬼語灸伏兔百壯

前依天窻九壯

悲泣鬼語灸天府五十壯

悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯

狂邪驚癇病灸承命二十壯穴在內踝後上行三寸動脈

上亦灸驚狂走

狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯

狂癲鬼語灸足太陽四十壯

狂走驚恍惚灸足陽明二十壯

狂癲癇易疾灸足少陽隨年壯

狂走癲歌如死人灸足大趾三毛中九壯翼云灸大敦

狂走易罵灸八會隨年壯穴在陽明下五分

狂癲驚走風恍惚噴喜罵笑歌哭鬼語灸腦戶風池

陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟骨隨

驚馬怖心忪少力灸大橫五十壯

狂風罵詈搥斫人名為執陽風灸口兩吻邊燕口處赤白

際各一壯○又灸陰囊縫二十壯令人立以筆正注當

已卧核外上灸之勿令近前中外核恐害陽氣也

狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白

際一壯○又灸兩肘內屈中五壯 又灸背胛中間三壯

報灸之倉公法神效

鬼魅灸入髮一寸百壯○又灸間使手心各五十壯

狐魅合掌大指縛指灸合間二十七壯當狐鳴即瘥

卒狂言鬼語以甌無急公縛兩手大指便灸左右脇下對

空肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐以

問之乃解其手

卒中邪魅恍惚振嚙灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本
令艾丸半在瓜上半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀
屎大

風邪灸間使隨年壯○又灸承漿七壯○又灸心輪七壯

○又灸三里七壯

卒狂鬼語斜其足大拇趾爪甲下入少許即止

風虛驚悸第六方二十一首

遠志湯補心治心氣虛驚悸喜忘心不進食方

遠志

乾薑

白朮

桂心

黃耆

紫石英

防風

當歸

人參

茯苓

甘草

芍藥

茯神

羌活

麥門冬

半真各肆斤大棗拾斤五味子貳合

右十八味以水一斗三升煮取三升半分五服日
三夜一

耳鳴方 **方**治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憤懣八煩悶

遠志

黃耆

茯苓

甘草

芍藥

當歸

桂心一方無

麥門冬

人參各貳兩

獨活肆兩

生薑伍兩

附子壹兩

右十一味以水一斗一升煮取四升每服八合人

羸服五合日三夜一

痰渴湯治風經五臟大虛驚悸安神定志方

茯神

防風各叁兩

人參

遠志

甘草

龍骨

桂心

活各二兩

白朮

細辛

乾薑

酸棗各一兩

右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服

又方治風虛滿頸項強心氣不定不能食方

茯神

麥門冬兩人參

羌活

遠志

當歸

甘草

紫石

五味子兩半夏

防風

黃耆各三兩

生薑伍兩

酸棗叁升

右十四味咬咀以水一斗二升煮酸棗取一斗去棗內

餘藥煎取三升半一服七合日二夜二

補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜

怒悲憂恐不自知常苦咽喉痛口唇黑嘔吐血舌本強不

通水漿方

紫石英

茯苓

人參

遠志

當歸

茯神深煎

甘草

紫苑各口貳兩

麥門冬

青升

赤小豆

參八口

大棗

參二拾枚

右十一味咬咀以水一斗上二升煮取二升分二服

又方治心氣不足多汗心煩喜驚語多夢不自覺咽喉痛

時吐血舌本強水漿不通方

紫石英

研

茯苓

人參

桂心

各貳兩

麥門冬

紫苑

甘草

大棗

柴枚

赤小豆

貳拾肆枚

右九味咬咀以水八升煮取二升半分三服春夏服佳

又方治奄奄忽忽朝瘥暮劇驚悸心中憧憧胃滿又下食

陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

人參

茯苓

遠志

甘草

枳實

當歸

龍齒

桔梗各三兩

半夏

桂心各伍兩

黃耆

肆兩

生薑

陸兩

茯神

貳兩

大棗

貳拾枚

右十四味咬咀以水一斗二升先煮粳米五合令熟去

滓次內藥煮取四升一服八合日三夜二

又方

治心氣不足心痛驚恐方

遠志

蒲黃

一兩

方用人參

茯苓各肆兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升半分二服

又方

治心氣不足腹背相引痛不能俛仰方

或作傷心湯

茯神

黃芩

遠志

乾地黄

各二兩

麥門冬

石膏

各肆兩

半夏

附子

桂心

生薑各肆兩

甘草

阿膠

糖

各壹兩

大棗

各拾枚

右十四味十二味咬咀以水一斗煮取三升去滓內糖

及膠更煎取一升一合只分二服此方治心驚悸多驚方

定心湯治虛羸心氣驚弱多驚方

茯苓詳前 桂心參前 甘草 芍藥

乾薑 遠志 人參各貳兩 大棗拾伍枚

右八味咬咀以水八升煮取二升分四服日二夜一

定心湯治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足

人參 茯苓 茯神 遠志 赤石脂

龍骨 乾薑 當歸 甘草 白朮

芍藥 桂心 紫苑 防風各貳兩 大棗貳枚

右十五味咬咀以水一斗二升煮取三升半分五服日

三夜二

治驚勞失志方

甘草

桂心各一兩

龍骨

防風

麥門冬

牡蠣

遠志各一兩

茯神

伍兩

大棗

貳拾枚

右九味以水八升煮取二升分二服相去如人行五里乃再進

荆瀝湯

治心虛驚悸不定羸瘦病方

荆瀝 貳升

茯神

白鮮皮

各一兩

人參 貳兩

白銀

拾兩以水壹斗煮取叁升

右五味二味以水八升煮取一升四分三服相去如人行十里又進一服

又方

荆瀝一升緩火煎取一升六合勿溫每服四合日三

夜一

續命湯

治風痺癱冷心氣不足喜忘恐怖神志不定方

防風

當歸

大黃

麥門冬各一分此味

澤瀉

大豆卷

白斂各一分

葛葉

人參

桔梗

桂心

遠志

薯蕷

石膏各一分

紫苑

乾薑

茯苓各一分

白朮

甘草各一分

粳米

大棗各一分附子

茯神各一分

秦艽各一分

右二十四味以水一斗一升先煮粳米令熟去滓

內藥煮取四升分服八合日三夜并金匱不用粳米

十九丸加至

大領人散治心虛驚悸夢寐恐畏方

紫石英

茯苓

防風

人參

甘草

澤瀉各一分

黃耆

秦艽

白朮

薯蕷

白斂務陸麥門冬當歸分伍梧樓大豆卷

柏子人桂心遠志大黃石膏各分

蜀椒芍藥乾薑細辛各分

右二十四味治下篩酒服二方寸七日三一方無紫石

茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十五丸

又方治風虛心氣驚弱恍惚失常忽噴恚悲志意不樂方

紫石英白石英乾地黃無朱砂龍齒

人參細辛天雄附子遠志

乾薑茯苓白朮桂心防風各分

右十五味治下篩酒服兩方寸七日三

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定

惕然驚者方

人參

遠志

白朮

附子

乾地黃

赤小豆

桂心

黃耆

細辛

乾薑

龍齒

防風

芎藭各五兩

茯苓肆兩

右十四味治下篩酒服二方寸七日二

心圓

治男子婦人虛損夢寤驚悸或失精神婦人赤白

注漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚憂志結

氣諸病方

紫石英

茯苓

芎藭

茯苓

遠志

麥門冬

大黃

當歸

細辛

卷柏

大豆卷

乾薑各五兩

防風

人參

澤瀉

秦朮

丹參各陸分

石膏

芍藥

柏子各三分

烏頭

桂心

桔梗

甘草

薯蕷各七

白欵

鐵精

銀屑

前胡

牛黃各別

乾地黄分白木

半夏各別

蜜蠱拾貳

大棗伍

右三十五味為末蜜棗和搗五千杵丸如梧子大酒服

五丸日三加至二十九一本無大豆卷大棗

大鎮心圓所治與前方大同凡是心病悉皆主之

乾地黄分牛黃伍分一用牛膠

羌活

桂心

麥門冬

秦光

芎藭

人參

遠志

紫石英

丹砂

阿膠

甘草

大黃

銀屑

白欵

當歸

乾薑

防風各別

杏仁

蜀椒各別

澤瀉

黃耆

茯苓

大豆卷

薯蕷

茯神

前胡

鐵精

拍子入伍分

大棗肆拾

桑螵蛸拾壹

拾壹

右三十二味為末白蜜聚和丸酒服七九日二加陸地

補心圓治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣驚夢參鉤藤

恍惚方

紫石英 朱砂 茯神 銀屑 雄黃

葛蒲 人參 桔梗 乾薑 遠志

甘草 當歸 桂心各貳分 防風 細辛

鐵精 防己各壹兩 一方用茯苓一分為十八味

右十七味末蜜丸如大豆飲服十九日二加至二十九

定志小圓治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽

忽喜忘心朝差暮劇暮差朝發狂眩者方

葛蒲 遠志各貳兩 茯苓 人參各叁兩

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七九日二加茯苓為

茯神丸散服之亦佳

紫石英酒 治久風虛冷心氣不足或時候怖方

紫石英 壹斤 鍾乳

防風

遠志

桂心 各肆兩

麻黃

茯苓

白朮

甘草 各叁兩

右九味咬咀以酒三斗春月漬五日每服四合日三亦

可至醉常令人有酒氣

好忘第七方十六首

孔子大聖知**秘中方**

龜甲

龍骨

遠志

菖蒲

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三常服令人大聰

千金方云
食後水服

治多忘令人不忘方

葛蒲 貳分 茯苓

茯神

人參 各壹分 遠志 各壹分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一五日後知神良

又方 茯苓

續斷 各壹分 遠志

葛蒲

茯苓 各壹分

右五味治下篩酒服方寸匕日三至老不忘

開心散 治好忘方

遠志

人參 各壹分

葛蒲 壹兩

茯苓 貳兩

右四味治下篩飲服方寸匕日三

葛蒲益智圓 治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳

自方

葛蒲

遠志

人參

杜仲

牛膝

各伍分

附子

伍分

茯苓

茶分

桂心

叁分

右八味為末蜜丸如梧子一服七丸加至二十凡日一

夜一禁如樂法

養命開心益智方

乾地黃

人參

茯苓

各二兩

茯苓

菟絲子

遠志

各一兩

蛇床子

二兩

右七味治下篩服方寸匕日一忌兔肉餘無忌

北平太守八味散方

天門冬

陸分 桂心

茯苓

各壹兩

乾地黃

肆分

五味子

芎藭

遠志

石韋

各叁分

右八味治下篩後食或酒或水服方寸匕二十日力倍

六十日氣力強志意足

治健忘方

天門冬

遠志

茯苓

乾地黃

右四味各等分爲末蜜丸如梧子大酒服二十九日三
加至三十九常服勿絕

治好忘父服聰明益智方

龍骨

虎骨

遠志各等分

右三味治下篩食後服方寸匕日二

又方七月七日取菖蒲酒服三方寸匕飲不至醉

又方常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者陰乾白日治

合豆下篩服方寸匕日二耳目聰明不忘出備州此

又方七月七日麻勃一升人參二兩爲末蒸令氣遍臨夜

卧服一刀圭盡知四方之事

又方戊子日取東邊桃枝一七枚縛著卧床中枕之不忘

又方常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木入

著人帶中令人不忘

艾方 丁酉日自往市買遠志裹著衣中角頭還未服之不

復忘

治人心昏塞多亡心喜誤方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

重刊孫真真人備急千金要方卷之十四

善
510.87
12-1
V.16
書號碼
著譯者 孫思邈
書名 (重刊孫真人) 備急千金要方

號數	借期	還期	號數	借期	還期
----	----	----	----	----	----

出借得不

出借得不

借閱者注意

(一) 加意愛護勿失原有
形狀

(二) 損壞或遺失應照原價加倍
賠償

(三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者
須持書至館聲明但本館於必要收回時須
即繳還

(四) 逾期不歸還者應照章納金

善
510.87
12-1
V.16
圖書號數
圖書冊數
登記號數 63287

