


## Corticoterapia Antenatal



# Descrição

### Benefícios comprovados

- Redução da incidência de síndrome do desconforto respiratório
- Redução das hemorragias periventriculares e intraventriculares
- Redução da mortalidade neonatal

### Possíveis efeitos benéficos adicionais

- Potencializa a ação do surfactante exógeno
- Redução de enterocolite necrosante
- Favorece a estabilização cardiovascular
- Auxilia na maturidade tubular renal
- Acelera aspectos da maturidade hepática e pancreática

### Principais indicações de uso

- Trabalho de parto prematuro em inibição
- Nos casos de risco para ocorrência de parturição prematura, espontânea ou eletiva, ponderar o uso do corticóide
  - :: Síndromes hipertensivas
  - :: Diabetes melito
  - :: Colagenoses
  - :: Insuficiência istmocervical
  - :: Prenhez múltipla
  - :: Doença hemolítica perinatal
  - :: Polidrâmnio
  - :: Restrição do crescimento fetal
  - :: Inserção baixa de placenta
  - :: Rotura prematura de membranas
  - :: Malformações congênitas
  - :: Parto prematuro prévio
  - :: Gestação e leiomioma do útero
  - :: Cervicodilatação precoce

### Premissas fundamentais

- Não utilizar se o parto for ocorrer imediatamente
- Ciclos incompletos já promovem efeitos benéficos
- Utilizar somente um ciclo de corticoterapia; excepcionalmente realizar dois ciclos, separados por cerca de 2 a 3 semanas

### Observação importante

Ciclos repetitivos devem ser evitados devido aos possíveis efeitos maternos e, principalmente, conceptuais a curto e longo prazo. Destaca-se a supressão transitória do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, materno e fetal.

# Tratamento

### Idade gestacional de uso

De 24 semanas a 34 semanas. O melhor efeito é descrito quando utilizado de 28 semanas a 32 semanas.

### Esquema de uso

#### Opção 1

Betametasona (Celestone Soluspan®) – 2 ampolas (12 mg) por via intramuscular, dose única diária, durante 2 dias consecutivos (total de 4 ampolas) = 1 ciclo

#### Opção 2

Dexametasona (Decadron®) – 1 ampola (4 mg) por via intramuscular, a cada 8 horas, durante 2 dias consecutivos (total de 6 ampolas) = 1 ciclo

Duração do efeito: 7 dias.

O efeito já é considerado satisfatório 24 horas após o término das injeções.