

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2020)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

A maioria dos casos de úlcera por pressão (UPP) pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados com risco. De acordo com o Protocolo para Prevenção de Úlceras por Pressão do Ministério da Saúde (2013), assinale a opção que apresenta a estratégia de prevenção para UPP.

- (A) Deve-se massagear as áreas de proeminências ósseas ou hiperemiadas. A massagem também é indicada na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados.
- (B) Todo paciente, independentemente de sua gravidade ou complexidade, deve ser avaliado sistematicamente na admissão.
- (C) Em virtude da rápida mudança de fatores de risco em pacientes agudamente enfermos, a inspeção semanal da pele é fundamental.
- (D) O tratamento da pele ressecada com hidratantes tem se mostrado pouco efetivo na prevenção de UPP.
- (E) Deve-se limpar a pele sempre que necessário e utilizar de água fria e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento da pele.

QUESTÃO 2

Choque é definido como um distúrbio orgânico ameaçador à vida, caracterizado pelo suprimento insuficiente de sangue para os tecidos e células do corpo. Segundo Lima e Matão (2010), são características clínicas específicas do choque neurogênico:

- (A) oligúria e pressão venosa alta.
- (B) queda da pressão venosa e aumento da resistência periférica.
- (C) prostração e calafrios.
- (D) distúrbios emocionais e anestesia medular alta.
- (E) hipotensão e taquicardia.

QUESTÃO 3

Segundo Lima e Matão (2010), é finalidade da enteroclise:

- (A) preparar o estômago para exames ou cirurgias.
- (B) remover do estômago conteúdo gástrico excessivo ou nocivo.
- (C) estancar hemorragia gástrica.
- (D) introduzir solução estéril até a bexiga.
- (E) facilitar a eliminação de fezes, nos casos de constipação intestinal.

QUESTÃO 4

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde (2013), dentre os profissionais envolvidos na aferição da pressão arterial (PA), as medidas realizadas pelos Técnicos de Enfermagem apresentaram efeito do avental branco com uma frequência menor que os demais, destacando assim a importância do trabalho desse profissional na verificação da PA em serviços de saúde. Sobre a técnica de medida da pressão arterial, assinale a opção correta.

- (A) paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e acima da altura da escápula.
- (B) deve-se evitar repouso antes da medição.
- (C) deve-se desinflar o manguito rapidamente.
- (D) a pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos.
- (E) a pressão diastólica corresponde ao valor em que começam a ser ouvidos os ruídos de korotkoff.

QUESTÃO 5

Carmagnani et al (2017) descrevem que para a administração de determinados fármacos por via intramuscular faz-se necessária a utilização da técnica em Z. Com relação a essa técnica, marque a opção correta.

- (A) Não é recomendada para medicamentos com alta probabilidade de refluxo (oleosos e suspensões).
- (B) É utilizada e recomendada a todas as faixas etárias.
- (C) Com essa técnica, os tecidos musculares são deslocados. E ao retornarem à posição original, o canal formado pela agulha assume um trajeto irregular que impede o refluxo do medicamento.
- (D) É recomendada principalmente para medicações em casos que o refluxo pode causar danos à pele como anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro.
- (E) O conteúdo da seringa deve ser injetado rapidamente (ainda com a pele esticada).

QUESTÃO 6

O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Sobre esse tema é correto afirmar que segundo as recomendações do Ministério da Saúde (2013):

- (A) o intervalo entre os exames deve ser de cinco anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- (B) o início da coleta deve ser aos 45 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- (C) os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos um exame negativo nos últimos cinco anos.
- (D) para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
- (E) o início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, mesmo em mulheres que nunca tiveram atividade sexual.

QUESTÃO 7

Um idoso, desorientado, emagrecido, desidratado, cardiopata, com histórico de edema agudo de pulmão, deu entrada na unidade de emergência de um hospital. Foi prescrito pela equipe médica hidratação com 500 mL de soro fisiológico 0,9% a cada 8 horas. Naquele momento, não havia disponível bomba de controle de infusão, sendo necessária a utilização de infusão gravitacional, com equipo de macrogotas. Diante dessa situação, o número de gotas por minutos infundido foi de aproximadamente:

- (A) 14 gotas por minuto.
- (B) 20 gotas por minuto.
- (C) 21 gotas por minuto.
- (D) 63 gotas por minuto.
- (E) 27 gotas por minuto.

QUESTÃO 8

De acordo com Kawamoto e Fortes (2013), a temperatura corporal é proveniente do calor produzido pelo metabolismo. Vários processos físicos e químicos promovem a produção ou a perda de calor, mantendo o organismo com temperatura relativamente constante. Com relação a esse sinal vital, é possível afirmar que:

- (A) indivíduos desnutridos geralmente apresentam temperatura mais alta pela deficiência do metabolismo celular.
- (B) as regiões mais frequentes para aferição da temperatura são: oral, axilar e retal.
- (C) hipertermia é o aumento da temperatura seguido de pele quente e úmida, bradipneia e bradicardia.
- (D) a aferição da temperatura corporal por via oral é contraindicada em adultos jovens.
- (E) a fase de ovulação diminui a temperatura em mulheres em idade fértil.

QUESTÃO 9

Com base na Instrução normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação 2020, para efeito de emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) para Febre Amarela, deve-se seguir o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que recomenda:

- (A) no mínimo 2 (duas) doses, desde que o viajante tenha sido vacinado pelo menos 10 dias antes da viagem.
- (B) que seja realizada dose de reforço em pessoas entre 5 a 59 anos.
- (C) uma única dose na vida, desde que o viajante tenha sido vacinado pelo menos 3 dias antes da viagem.
- (D) uma única dose na vida, desde que o viajante tenha sido vacinado pelo menos 10 dias antes da viagem.
- (E) que seja realizada dose de reforço caso o adulto tenha sido vacinado há mais de 10 anos.

QUESTÃO 10

São recomendações da American Heart Association para Ressuscitação Cardio-Pulmonar (2018) em adultos, EXCETO:

- (A) comprimir com força (pelo menos 5 cm) e rapidez (100 - 120/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- (B) manter relação compressão-ventilação 15:2, em caso de pacientes sem via aérea avançada.
- (C) minimizar interrupções nas compressões.
- (D) evitar ventilação excessiva.
- (E) alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço.

QUESTÃO 11

A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) tipo adulto - dTpa foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação como reforço ou complementação do esquema da vacina dupla adulta (dT) com o objetivo de diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos recém-nascidos. Segundo a Instrução Normativa do Calendário de Vacinação 2020, qual é o esquema da vacina adsorvida dTpa em gestantes?

- (A) 3 (três) doses a cada gestação, a partir da décima segunda semana de gestação.
- (B) 1 (uma) dose a cada gestação, a partir da vigésima semana de gestação.
- (C) 3 (três) doses com intervalo de 60 dias entre as doses.
- (D) Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, não se deve administrar dose de dTpa no puerpério.
- (E) 2 (duas) doses a cada gestação, a partir da décima segunda semana de gestação.

QUESTÃO 12

Constitui a medida mais simples e menos dispendiosa para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde:

- (A) higienização das mãos.
- (B) restrição de visitas e acompanhantes.
- (C) precaução-padrão.
- (D) uso de luvas.
- (E) uso de máscaras cirúrgicas.

QUESTÃO 13

Segundo Lima e Matão (2010), é um cuidado prestado pelo Técnico de Enfermagem no pré-operatório imediato:

- (A) orientar quanto ao uso de comadre e compadre para prevenir desconfortos pós-operatórios.
- (B) melhorar a capacidade respiratória através de exercícios respiratórios.
- (C) colher material para exames (urina e fezes).
- (D) promover a assistência espiritual, pois a fé traz esperança e segurança.
- (E) retirar próteses dentárias, óculos, jóias e roupas íntimas.

QUESTÃO 14

Os nove certos na administração de medicamentos não garantem que os erros não ocorrerão, mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente. Segundo o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde (2013), fazem parte dos nove certos na administração de medicamentos, EXCETO:

- (A) Paciente certo e Documentação certa (Registro certo).
- (B) Medicamento certo e Razão.
- (C) Paciente certo e Dose certa.
- (D) Medicamento certo e Notificação de evento adverso.
- (E) Hora certa e Via certa.

QUESTÃO 15

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2017), a seleção de um cateter periférico para punção venosa deve ser feita com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido e nas condições de acesso venoso. Nesse sentido, é correto afirmar que:

- (A) cateteres com maior calibre causam menos flebite mecânica (irritação da parede da veia pela cânula) e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
- (B) para crianças menores de 03 (três) anos, não considerar as veias da cabeça para punção.
- (C) em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as das regiões de flexão.
- (D) agulha de aço só deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única, sem manter o dispositivo no sítio.
- (E) um novo cateter periférico deve ser utilizado somente a cada 03 (três) tentativas de punção no mesmo paciente.

QUESTÃO 16

Segundo Carmagnani et al (2017), com relação aos cuidados que devem ser observados na monitoração da oximetria de pulso, assinale a opção correta.

- (A) Em pacientes adultos, a escolha do dedo médio é preferencial para colocação do sensor (insira o sensor no dedo do paciente até o fim).
- (B) O sensor do oxímetro de pulso deve ser colocado preferencialmente no braço onde esteja sendo aferida a pressão arterial, para fornecer maior confiabilidade ao resultado.
- (C) Os valores normais da saturação de oxigênio devem variar de 85 a 100%.
- (D) O sensor reutilizável deve ser mudado de local a cada hora em pacientes com monitoramento contínuo.
- (E) Baixa perfusão e alterações da hemoglobina são fatores que podem alterar a medição da saturação de oxigênio.

QUESTÃO 17

Com relação ao manuseio correto do cateter vesical de demora, recomenda-se:

- (A) manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga.
- (B) utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobianas em sacos de drenagem urinária.
- (C) quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas, proceder à irrigação com sistema aberto.
- (D) Após a inserção, fixar o cateter de modo seguro e que não permita tração.
- (E) para coleta de exame de urina, desconectar o cateter, coletar pequena amostra, reconectar o cateter e levar a amostra imediatamente ao laboratório.

QUESTÃO 18

Segundo Viana et al. (2011), as doenças do aparelho cardiovascular estão atualmente entre as principais causas de morbidade e mortalidade, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Assinale a opção que apresenta a principal causa de Doença Coronariana.

- (A) Endocardite.
- (B) Edema pulmonar.
- (C) Pericardite.
- (D) Aterosclerose.
- (E) Diabetes.

QUESTÃO 19

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), marque a opção que apresenta uma atribuição do Técnico de Enfermagem no cuidado à gestante no pré-natal de baixo risco.

- (A) Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
- (B) Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal.
- (C) Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero.
- (D) Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal.
- (E) Realizar a consulta odontológica de pré-natal de gestação de baixo risco.

QUESTÃO 20

Segundo as estratégias do Ministério da Saúde para o cuidado da pessoa com diabetes mellitus (2013), a prescrição de insulina exige que a equipe de enfermagem domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema. Sobre as recomendações para o armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, é correto afirmar que:

- (A) deve-se esperar cinco segundos após a aplicação antes de se retirar a agulha do subcutâneo, para garantir injeção de toda a dose de insulina.
- (B) após 60 dias de uso, a insulina perde sua potência, principalmente se mantida fora da geladeira, sendo importante seguir a recomendação de anotar a data de abertura do frasco.
- (C) durante a aplicação, a pinça subcutânea deve ser realizada entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente, em ângulo de 45 graus.
- (D) em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação intermediária (regular) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação curta (NPH).
- (E) as insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 10°C.

QUESTÃO 21

Um paciente deu entrada na emergência de um hospital de grande porte no Rio de Janeiro com queixa de dor epigástrica. Após ser atendido, o médico concedeu a esse paciente alta, mediante o término da medicação endovenosa prescrita. Ao avistar um técnico de enfermagem, o paciente perguntou quanto tempo faltava para a infusão terminar. Ao observar que havia 60 mL de solução e que a velocidade de gotejamento estava 4 gotas por minuto, o técnico de enfermagem respondeu que faltavam:

- (A) 5 minutos para o término da infusão.
- (B) 15 minutos para o término da infusão.
- (C) 2 horas para o término da infusão.
- (D) 5 horas para o término da infusão.
- (E) 25 minutos para o término da infusão.

QUESTÃO 22

Segundo Kawamoto e Fortes (2013), a escolha do curativo irá depender do tamanho da lesão, presença de secreção e sinais de infecção ou necrose. Dessa forma, considerando os tipos de curativos ou coberturas, é correto afirmar que:

- (A) o Hidrogel tem ação de absorção e adsorção, bactericida e desodorante.
- (B) os Ácidos Graxos Essenciais são usados para remover crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados e necróticos.
- (C) o Carvão Ativado é aplicado no preenchimento de espaços e cavidades.
- (D) o Alginato de Cálcio absorve o excesso de exsudado, formando um gel. Promove desbridamento autolítico, mantém a umidade local e tem ação bacteriostática.
- (E) a Colagenase a 10% é utilizada para prevenção e tratamento em lesão colonizada ou infectada.

QUESTÃO 23

Segundo o Ministério da Saúde (2015), é considerado um dos pontos-chaves da pega adequada:

- (A) bochechas do bebê encovadas em cada sucção.
- (B) mama aparentando estar esticada durante a mamada.
- (C) ruídos da língua.
- (D) mais auréola visível abaixo da boca do bebê.
- (E) lábio inferior virado para fora.

QUESTÃO 24

Em relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos da *Influenza*, assinale a opção correta.

- (A) Infecção aguda do trato respiratório, com distribuição global e baixa transmissibilidade.
- (B) Nos idosos, a temperatura pode atingir níveis mais altos. As crianças sempre se apresentam febris, mas, em geral, a temperatura não atinge níveis tão altos.
- (C) Sua importância deve-se ao caráter epidêmico e à alta morbidade, com elevadas taxas de hospitalização de idosos ou pacientes portadores de doenças crônicas.
- (D) O modo de transmissão mais comum é o indireto, sendo as mãos o principal veículo, ao propiciarem a introdução de partículas nas mucosas oral, nasal e ocular.
- (E) As complicações são mais comuns em crianças e indivíduos com doença crônica pulmonar e cardiopatias.

QUESTÃO 25

O conceito de tanatologia apresentado por Elisabeth Kubler-Ross descreve que uma pessoa, diante da morte, apresenta cinco estágios de reações emocionais. Essas reações nem sempre ocorrem na mesma sequência e nem todas as pessoas passam por todos os estágios. Kawamoto e Fortes (2013) descrevem que o conhecimento dessas reações é fundamental para definir a abordagem mais propícia ao paciente conforme o momento. Na prática, ao se deparar com um paciente em manifestação de raiva, revolta, irritação e rispidez a tudo que o cerca, a equipe pode inferir que ele encontra-se no estágio de:

- (A) negação.
- (B) barganha.
- (C) depressão.
- (D) ira.
- (E) aceitação.

QUESTÃO 26

De acordo com o manual de Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância - Neonatal - AIDPI Neonatal (2014), a causa mais frequente de convulsão no recém-nascido é a:

- (A) Hipocalcemia.
- (B) Hiperglicemia.
- (C) Hipertermia.
- (D) Hipoglicemia.
- (E) Hipoxemia.

QUESTÃO 27

Septoplastia é o deslocamento da membrana mucosa, com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo nasal. Segundo Lima e Matão (2010), são cuidados de enfermagem no pós-operatório de septoplastia, EXCETO:

- (A) estimular deambulação precoce.
- (B) realizar higiene oral com frequência.
- (C) manter cabeceira do leito a 0°.
- (D) estar atento à ocorrência de náuseas, vômitos, dispneia e sangramento.
- (E) evitar exposição a correntes de ar frio.

QUESTÃO 28

Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para favorecer a adequada reexpansão pulmonar. Com relação aos cuidados de enfermagem com o dreno pleural, podemos destacar:

- (A) manter o frasco de drenagem acima do nível do tórax.
- (B) em caso de saída acidental do dreno, não vedar o sítio de inserção.
- (C) avaliar a movimentação da oscilação do nível do dreno durante a respiração.
- (D) ao substituir o frasco de drenagem, não pinçar o dreno.
- (E) clampear o dreno durante o transporte do paciente ou deambulação.

QUESTÃO 29

De acordo com Lima e Matão (2010), a Toxemia Gravídica, conhecida também como doença hipertensiva específica da gravidez, é uma complicação que ocorre após a 20ª semana de gestação. Sendo assim, sobre os cuidados que devem ser observados nessa situação, analise as afirmativas abaixo, classifique como V (verdadeiras) ou F (falsas) e assinale a opção correta:

- () No pós-parto, manter vigilância contínua, pelo risco de acidente convulsivo.
- () Aumentar estímulos ambientais.
- () Promover diurese e balanço hídrico.
- () Administrar medicação prescrita: sedativos, tranquilizantes, diuréticos e hipertensores.
- () Manter a paciente em repouso, preferencialmente em decúbito lateral esquerdo.

- (A) (V) (F) (V) (F) (V)
- (B) (F) (F) (F) (V) (V)
- (C) (F) (V) (V) (F) (F)
- (D) (V) (F) (V) (V) (F)
- (E) (V) (F) (F) (F) (V)

QUESTÃO 30

De acordo com Lima e Matão (2010), os sinais vitais refletem o estado geral da criança. A identificação de tendências (diferenças e desvios) desses sinais revela as alterações físicas e funcionais que estão se processando nos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida. Sobre esse tema, marque a opção correta.

- (A) Devido à imaturidade do sistema termorregulador, a temperatura da criança pode apresentar poucas variações. No primeiro ano de vida, a criança independe da temperatura ambiental para manutenção da sua própria temperatura interna.
- (B) A pressão arterial da criança varia de acordo com a idade e se relaciona a seu peso e altura. Há variação de PA entre crianças com a mesma constituição física e a mesma idade.
- (C) As crianças apresentam respiração de característica regular, rítmica, intermitente e com alternâncias de profundidade.
- (D) Um dos fatores que altera o resultado da pressão arterial (PA) é o uso do esfigmomanômetro inadequado (manguito largo ou estreito demais). Na criança, o manguito deve cobrir um terço do braço.
- (E) A hipotermia pode causar aumento da sensibilidade, fraqueza muscular, sonolência, estimulação cardiorrespiratória por produção de arritmia e do processo metabólico-orgânico, provocando lesões teciduais irreversíveis.

QUESTÃO 31

O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos continua a crescer. A sua utilização para aplicação de medicamentos ou infusão de soluções encontra amplo respaldo na literatura internacional. De acordo com o Guia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2016), assinale a opção que apresenta uma desvantagem na utilização da hipodermóclise:

- (A) Irritação da mucosa gástrica.
- (B) Alto custo.
- (C) Altos riscos de efeitos adversos sistêmicos.
- (D) Aumento da flutuação das concentrações plasmáticas de opioides.
- (E) Limitação do uso de medicamentos e eletrólitos que podem ser infundidos.

QUESTÃO 32

Segundo o Manual de Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância Neonatal - AIDPI Neonatal (2014), são sinais de desidratação em crianças de 0 a 2 meses de idade, EXCETO:

- (A) sangue nas fezes.
- (B) sucção débil.
- (C) inquietude ou irritabilidade.
- (D) olhos fundos.
- (E) letárgica ou inconsistente.

QUESTÃO 33

Segundo Viana et al (2011), são complicações que podem ocorrer durante à hemodiálise em pacientes crônicos:

- (A) hipertensão, febre e câibras.
- (B) cefaleia, dor torácica e prurido.
- (C) hipotensão, hipotermia e dor nos membros superiores.
- (D) hipertensão, arritmias e náuseas.
- (E) vômitos, hipotermia e dor nos membros inferiores.

QUESTÃO 34

Com relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos do sarampo, é correto afirmar que:

- (A) o início da doença é caracterizado por manchas escurecidas na pele.
- (B) é uma doença de notificação compulsória sem a obrigatoriedade de investigação epidemiológica imediata.
- (C) o modo de transmissão se dá principalmente pelas vias fecal-oral.
- (D) é uma doença grave de natureza bacteriana de expressão clínica pleomórfica.
- (E) é doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa.

QUESTÃO 35

Segundo Lima e Matão (2010), a fototerapia consiste num processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. O recém-nascido (RN) recebe esse tipo de tratamento quando apresenta icterícia. É considerado cuidado com o recém-nascido em fototerapia:

- (A) em caso de berço, permitir entrada de correntes de ar.
- (B) retirar toda a roupa do RN, inclusive a fralda.
- (C) manter a proteção ocular apenas no início da exposição.
- (D) mudar a posição do RN a intervalos frequentes.
- (E) manter o RN em exposição por ocasião do banho e da alimentação.

QUESTÃO 36

Considerando o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído em abril de 2013 pela Portaria Nº. 529 do Ministério da Saúde, correlacione os conceitos e as definições, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

- I - Segurança do Paciente.
- II - Dano.
- III - Incidente.
- IV - Evento adverso.
- V - Cultura de Segurança.
- VI - Gestão de risco.

- () comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- () incidente que resulta em dano ao paciente.
- () evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- () redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- () configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização.
- () aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

- (A) (II) (IV) (III) (I) (V) (VI)
- (B) (II) (III) (IV) (V) (I) (VI)
- (C) (IV) (II) (III) (V) (I) (VI)
- (D) (II) (III) (VI) (IV) (V) (I)
- (E) (I) (II) (III) (IV) (V) (VI)

QUESTÃO 37

Segundo Kawamoto e Fortes (2013), a posição indicada para realização de clister é a:

- (A) de Fowler.
- (B) de Sims.
- (C) de Prona.
- (D) de Trendelenburg.
- (E) ereta.

QUESTÃO 38

Com base em Viana et al (2011), analise as afirmativas relacionadas aos cuidados de enfermagem que devem ser observados em pacientes em Unidade Pós Operatória:

- I- Avaliar o nível de consciência;
- II- Monitorar parâmetros hemodinâmicos;
- III- Retirar na admissão todos os dispositivos invasivos a fim de prevenir infecção;
- IV- Avaliar a intensidade da dor e administrar analgésicos prescritos;
- V- Monitorar perdas (ferida operatória, drenos, sonda vesical, sonda nasogástrica, estomas, drenos):

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV são corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são corretas.
- (D) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são corretas.

QUESTÃO 39

Infração ética e disciplinar é toda ação, omissão ou conveniência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Sobre as penalidades impostas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), é correto afirmar que a:

- (A) multa consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário desse infrator, na presença de duas testemunhas.
- (B) advertência verbal consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a que pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) suspensão consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande publicação.
- (D) cassação consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande publicação e comunicada aos órgãos empregadores.
- (E) censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande publicação.

QUESTÃO 40

Toda transfusão de hemocomponentes traz riscos imediatos (até 24 horas após transfusão) ou tardios (após 24 horas de transfusão) ao receptor. É considerado um risco tardio:

- (A) hemólise não imune.
- (B) contaminação bacteriana.
- (C) edema pulmonar não-cardiogênico.
- (D) reações alérgicas.
- (E) doença do enxerto contra o hospedeiro.

QUESTÃO 41

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos, em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é considerado um dever desses profissionais:

- (A) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (B) exercer atividades em locais de trabalho livres de riscos, danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
- (C) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.
- (D) executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente.
- (E) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

QUESTÃO 42

Os psicofármacos são um dos recursos utilizados para o tratamento em Saúde Mental e o seu uso deve ser associado a um contexto de vínculo e de escuta. Nesse sentido, qual psicofármaco é indicado para os sintomas-alvo "delírios e alucinações"?

- (A) Estabilizadores de humor.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) Antidepressivos.
- (D) Antipsicóticos.
- (E) Anti-inflamatórios.

QUESTÃO 43

As complicações relacionadas à administração da dieta enteral podem ser classificadas em gastrointestinais, mecânicas, infecciosas, respiratórias e psicológicas. Correlacione alguns exemplos dessas complicações às principais intervenções de enfermagem e assinale a opção correta.

COMPLICAÇÕES

- I- Obstrução do acesso enteral
- II- Irritação nasofaríngea
- III- Sinusite aguda
- IV- Deslocamento da sonda enteral
- V- Depressão / ansiedade

INTERVENÇÕES

- () Higienização das cavidades oral e nasal.
- () Nova passagem de sonda e verificação do posicionamento antes de iniciar uma nova infusão.
- () Irrigação da sonda antes/após a suspensão da administração da dieta.
- () Reavaliação da fixação da sonda, evitando compressão das narinas.
- () Orientação do paciente/familiares sobre a importância da terapia nutricional.

- (A) (III) (IV) (I) (II) (V)
- (B) (I) (II) (III) (IV) (V)
- (C) (II) (III) (I) (IV) (V)
- (D) (I) (IV) (III) (II) (V)
- (E) (III) (II) (V) (IV) (I)

QUESTÃO 44

Segundo o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde (1998), as reações clínicas desencadeadas pela picada de abelhas são variáveis, de acordo com o local e o número de ferroadas, as características e o passado alérgico do indivíduo atingido. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- (A) as reações alérgicas sistêmicas são de início lento e se manifestam pela presença de artralgia, febre e encefalite.
- (B) as reações alérgicas regionais se apresentam como manifestações clássicas de anafilaxia.
- (C) pessoas hipersensíveis podem apresentar choque anafilático e morte com apenas uma picada.
- (D) nos acidentes causados por enxames, a retirada dos ferrões da pele deve ser feita pelo pinçamento de cada um deles.
- (E) nas reações sistêmicas com manifestações circulatórias, a hipertensão é o sinal maior.

QUESTÃO 45

Segundo o Ministério da Saúde (2012), são critérios para a identificação de fatores de risco no recém-nascido (RN):

- (A) baixo peso ao nascer (menor que 2.500g), RN de família sem fonte de renda, história de morte de criança com mais de 5 anos de idade na família.
- (B) RN de mãe adolescente (com menos de 16 anos de idade), RN de mãe analfabeta, história de morte de criança com menos de 5 anos de idade na família.
- (C) RN de família sem fonte de renda, residente fora de área de risco, RN de mãe portadora de deficiência ou distúrbio psiquiátrico ou drogadição que impeça o cuidado da criança.
- (D) baixo peso ao nascer (menor do que 2.500g), história de morte de criança, aborto ou malformações congênitas por sífilis congênita; RN de mãe alfabetizada.
- (E) RN de mãe analfabeta, história de morte de criança com mais de 5 anos de idade na família; RN de família sem fonte de renda.

QUESTÃO 46

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para atenção ao pré-natal de baixo risco, a escolha do método anticoncepcional durante o aleitamento deve ser sempre personalizada. Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. Sobre esse tema, marque a opção correta:

- (A) Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia, está associada ao aumento da fertilidade.
- (B) Os métodos comportamentais (tabelinha, muco cervical) poderão ser usados antes da regularização do ciclo menstrual.
- (C) O Dispositivo Intrauterino (DIU) está indicado para os casos que cursaram com infecção puerperal até (três) meses após a cura.
- (D) O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal devem ser utilizados em lactantes, pois não interferem na qualidade e na quantidade do leite materno.
- (E) O anticoncepcional injetável trimestral pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após (seis) semanas do parto.

QUESTÃO 47

Segundo viana (2011), o atendimento a pacientes com dor torácica na sala de emergência é tempo-dependente. Portanto, é imprescindível uma ABORDAGEM INICIAL rápida. Os cuidados de enfermagem neste momento consistem em:

- (A) avaliação do eletrocardiograma e interpretação dos marcadores de necrose miocárdica.
- (B) coleta dos marcadores de necrose miocárdica e intervenção farmacológica.
- (C) avaliação clínica e exame físico.
- (D) monitoração multiparamétrica, punção venosa e instalação de oxigênio.
- (E) avaliação do eletrocardiograma e exame físico.

QUESTÃO 48

A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar. Com base nos "Protocolos Básicos de Segurança do Paciente" preconizado pelo Ministério da Saúde (2013), assinale a opção correta.

- (A) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar somente um identificador.
- (B) Para pacientes atendidos em regime ambulatorial, é dispensada a identificação através de pulseiras.
- (C) Pulseiras coloridas de alerta ou etiquetas devem ser utilizadas como identificadoras do paciente.
- (D) Os identificadores do paciente a serem incluídos na pulseira de identificação devem ser impressos diretamente do computador do serviço de saúde, sendo vedada a utilização de pulseiras manuscritas.
- (E) O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no serviço.

QUESTÃO 49

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Com relação à vacina *Influenza* (fracionada, inativada), analise as afirmativas abaixo, classifique como V (verdadeiras) ou F (falsas) e assinale a opção correta:

- () Administrada em gestantes em qualquer idade gestacional.
- () Indicada para todos os povos indígenas a partir de 6 (seis) meses de idade.
- () Administrada em puérperas após 45 dias de pós-parto.
- () Para pessoas a partir de 9 (nove) anos, administrar 1 (uma) dose.
- () Para crianças entre 6 (seis) meses e 2 (dois) anos 11 meses e 29 dias, administrar 0,5 mL, via intramuscular ou subcutânea.

- (A) (V) (V) (V) (F) (F)
- (B) (F) (V) (V) (V) (F)
- (C) (V) (V) (F) (V) (F)
- (D) (V) (V) (F) (F) (F)
- (E) (F) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 50

Segundo a Instrução Normativa do Calendário de Vacinação 2020, marque a opção correta sobre a Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) - Tetra viral:

- (A) É contraindicada para crianças expostas ao HIV. Essas crianças devem ser vacinadas com as vacinas tríplice viral e varicela (atenuada).
- (B) Deve ser administrado 0,5 mL, via intramuscular.
- (C) Deve-se administrar 1 (uma) dose aos 12 meses de idade em crianças que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.
- (D) Pode ser administrada simultaneamente às demais vacinas do calendário de vacinação, exceto a vacina pneumocócica 10 valente, em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.
- (E) Crianças não vacinadas oportunamente aos 15 meses de idade poderão ser vacinadas até 6 (anos) anos 11 meses e 29 dias.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **2 (duas) horas**.
- 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50