

**MARINHA DO BRASIL**  
**SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA**

***CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE  
PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP/2024)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

De acordo com o Documento de Consenso do câncer de mama de 2004, citado no caderno de Atenção Básica sobre Controle dos cânceres do colo do útero e mama (2013), assinale a opção que exemplifica um grupo populacional com risco muito elevado para o desenvolvimento do câncer de mama.

- (A) Mulheres com história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 30 anos de idade.
- (B) Mulheres com história familiar de parente de qualquer grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária.
- (C) Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino.
- (D) Mulheres com histórico de exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos.
- (E) Mulheres com histórico de ingestão regular de álcool.

### QUESTÃO 2

Segundo o livro O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos (2017), qual medicamento NÃO é recomendado para uso pela via subcutânea?

- (A) Diazepam.
- (B) Haldol.
- (C) Cefepime.
- (D) Morfina.
- (E) Dipirona.

### QUESTÃO 3

De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental (2013), assinale a opção que apresenta o papel do profissional da saúde diante de uma situação de crise.

- (A) Assumir conduta de juiz buscando estabelecer o certo e o errado.
- (B) Apoiar internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida.
- (C) Mediar as partes envolvidas buscando consenso entre as mesmas.
- (D) Incentivar medidas involuntárias.
- (E) Promover a intervenção terapêutica sem consensos possíveis.

### QUESTÃO 4

De acordo com a publicação Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso (2010), assinale a opção que apresenta os sinais clínicos de raiva humana.

- (A) Disfagia, aerofobia, acúsia e fotofobia.
- (B) Sialorreia, febre, delírios, espasmos musculares involuntários generalizados e convulsões.
- (C) Mal-estar geral, diminuição da temperatura corpórea, polifagia, polidipsia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia.
- (D) Paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstinação intestinal.
- (E) Espasmos dos músculos da laringe, da faringe e da língua e sensação de boca seca ao ingerir líquido.

### QUESTÃO 5

De acordo com a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies do Ministério da Saúde (ANVISA, 2010), sobre o álcool, é correto afirmar que:

- (A) tem ação bactericida, virucida, fungicida, esporicida, de fácil aplicação e ação imediata.
- (B) promove a desnaturação das proteínas que compõem a parede celular dos microrganismos e opacifica acrílico.
- (C) é inflamável, volátil, não opacifica acrílico, resseca pele, plásticos e borrachas.
- (D) é indicado para uso de mobiliário em geral, de fácil aplicação e ação lenta.
- (E) a concentração de uso deve ser de 70% a 95% em solução de água volume/ volume.

### QUESTÃO 6

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, citada no caderno da Anvisa "Assistência Segura: uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática" (2017), são tipos de incidente:

- (A) incidente doloso, incidente sem risco e incidente com erro.
- (B) incidente intencional, incidente adverso e incidente com dano.
- (C) incidente danoso, incidente não danoso e incidente ocasional.
- (D) near miss, incidente sem dano e incidente com dano.
- (E) near miss, incidente adverso e incidente sem dano.

### QUESTÃO 7

Segundo o livro O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos (2017), assinale a opção que apresenta um dos cuidados de enfermagem após punção via subcutânea no paciente em geriatria e cuidados paliativos.

- (A) A tampa Luer Lock deve ser trocada a cada 48h, se estiver em ambiente hospitalar.
- (B) A infusão em *bolus* deve ser sempre rápida por não oferecer risco e ter menor absorção.
- (C) A recomendação é de trocar o cateter agulhado a cada cinco dias e o cateter não agulhado a cada onze dias.
- (D) As coberturas com esparadrapo e fita micropore devem ser trocadas a cada 72h.
- (E) A troca do sítio de punção a cada 96h é preconizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

### QUESTÃO 8

Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº32, do Ministério da Saúde (2012), qual opção apresenta características do *baby blues* ou *maternity blues*?

- (A) Choro, flutuação de humor, irritabilidade, fadiga, tristeza, insônia, dificuldade de concentração, ansiedade relacionada ao bebê.
- (B) Confusão mental, alucinações ou delírios, agitação psicomotora, angústia, pensamentos que podem induzir a machucar o bebê, comportamentos estranhos, insônia, sintomas que evoluem para formas maníacas, melancólicas ou até mesmo catatônicas.
- (C) Episódios de bipolaridade, humor elevado, angústia, comportamentos repetitivos, insônia, sintomas que evoluem para formas maníacas.
- (D) Tristeza, choro fácil, desalento, abatimento, labilidade, anorexia, náuseas, distúrbios de sono, insônia inicial e pesadelos, ideias suicidas e perda do interesse sexual.
- (E) Humor deprimido, perda da fala, estado catatônico, insônia e ganho de peso.

### QUESTÃO 9

Segundo o Manual do Técnico em Enfermagem (2010), a circulação extracorpórea é realizada através:

- (A) de um dispositivo constituído por uma unidade geradora de energia elétrica (bateria) que envia impulsos da frequência cardíaca.
- (B) da remoção do divertículo esofágico (evaginação em forma de bolsa).
- (C) da comunicação cirúrgica do jejuno com o plano cutâneo da parede abdominal.
- (D) da abertura cirúrgica entre o 2º e o 3º anel da traqueia, inserindo-se uma cânula nessa abertura.
- (E) do aparelho que substitui a função cardíaca e a pulmonar durante cirurgias cardíacas.

### QUESTÃO 10

A capnografia é o registro do gás carbônico no final da expiração (ETCO<sub>2</sub>). Ela contribui diretamente para a monitoração da função respiratória. De acordo com o livro Enfermagem em Terapia Intensiva: Práticas e Vivências (2011), qual situação ocasiona um aumento súbito no ETCO<sub>2</sub>?

- (A) Hiperventilação súbita.
- (B) Parada cardíaca.
- (C) Queda repentina do débito cardíaco.
- (D) Embolia pulmonar maciça.
- (E) Aumento do débito cardíaco.

### QUESTÃO 11

Segundo o livro Enfermagem em terapia intensiva (2011), assinale a opção que apresenta as condutas a serem tomadas durante uma reação transfusional.

- (A) Manter a transfusão em velocidade lenta, verificar sinais vitais do paciente e registrar as ações no prontuário do paciente.
- (B) Interromper a transfusão imediatamente, descartar a bolsa e o equipo usados na transfusão e verificar sinais vitais do paciente.
- (C) Interromper a transfusão imediatamente, verificar sinais vitais do paciente e registrar as ações no prontuário do paciente.
- (D) Manter a transfusão em velocidade lenta, notificar o médico e registrar as ações na prescrição do paciente.
- (E) Interromper a transfusão imediatamente, manter acesso venoso com solução salina a 0,9% e descartar a bolsa e o equipo usados na transfusão.

### QUESTÃO 12

De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental (2013), assinale a opção que apresenta o fármaco que pode acarretar os seguintes efeitos indesejáveis: edema, polidipsia, poliúria, diarreia, ganho de peso, gosto metálico, náusea e tremores finos.

- (A) Carbamazepina.
- (B) Carbonato de lítio.
- (C) Ácido valproico.
- (D) Sertralina.
- (E) Amitriptilina.

### QUESTÃO 13

Segundo o livro Procedimentos de enfermagem: guia prático (2017), qual é a recomendação correta para o preparo e a administração de Medicamento de Alta Vigilância (MAV)?

- (A) Devem permanecer nas unidades de internação todos os MAV que tenham a possibilidade de uso na assistência do paciente.
- (B) Os MAV devem ser armazenados juntos com os demais medicamentos do paciente na unidade de internação.
- (C) Na prescrição, não há necessidade de destaque dos MAV, pois todos os medicamentos são de alta vigilância.
- (D) Deve-se realizar a dupla checagem (por dois profissionais) dos "certos", no preparo e na administração do MAV (medicamento, dose/ cálculos, diluição, via, horário, paciente, velocidade de infusão, monitoramento e anotação).
- (E) O preparo de misturas intravenosas que contêm MAV deve sempre ser centralizado na farmácia hospitalar.

### QUESTÃO 14

Segundo o Caderno de Atenção Básica, Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus, nº36, do Ministério da Saúde (2013), sobre a cetoacidose, é correto afirmar que:

- (A) ocorre principalmente em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2.
- (B) os principais sintomas são: polidipsia, anúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, edema, hipoventilação e alterações do estado mental.
- (C) os principais fatores precipitantes são infecção, má aderência ao tratamento, uso de medicações hiperglicemiantes e outras intercorrências graves (AVC, IAM ou trauma).
- (D) ocorre quando há hipoglicemia grave (abaixo de 40 mg/dL) acompanhada de desidratação e alteração do estado mental.
- (E) decorre da descompensação hiperglicêmica crônica.

### QUESTÃO 15

Segundo o Manual do Técnico em Enfermagem (2010), assinale a opção que apresenta um cuidado prestado pelo técnico de enfermagem na drenagem torácica.

- (A) Manter o paciente em decúbito lateral onde realizou a drenagem para exercer uma pressão local e assim facilitar a drenagem.
- (B) Colocar água, não necessitando ser estéril, já que ela atua como selo d'água e não terá contato direto com o paciente.
- (C) Desencorajar o indivíduo a respirar profundamente para não aumentar a pressão intrapleural, pois pode indicar fistula, dreno mal posicionado ou de vazamento no sistema.
- (D) Manter o frasco de drenagem acima do nível do tórax, para evitar o reflexo de drenagem.
- (E) Estimular a mudança de decúbito para favorecer a drenagem e promover melhor troca gasosa e contrações.

### QUESTÃO 16

Segundo o livro Procedimentos de enfermagem: guia prático (2017), o risco de queda é dividido em fatores de riscos intrínsecos funcionais e fatores de riscos intrínsecos relacionados às patologias. Assim, assinale a opção que apresenta um fator de risco intrínseco funcional.

- (A) Doenças osteomioarticulares.
- (B) Patologias neurológicas.
- (C) Patologias otológicas.
- (D) Patologias cardiovasculares.
- (E) História de queda recente.

### QUESTÃO 17

De acordo com o Calendário Vacinal da gestante (2023), a vacina dTpa deve ser administrada a partir de quantas semanas de idade gestacional?

- (A) 32 semanas.
- (B) 28 semanas.
- (C) 20 semanas.
- (D) 16 semanas.
- (E) 12 semanas.

### QUESTÃO 18

Segundo a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação (2023), qual vacina tem via intradérmica?

- (A) BCG.
- (B) Pneumo 10.
- (C) HPV.
- (D) Hepatite A.
- (E) Meningo C.

### QUESTÃO 19

Segundo a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação (2023), a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba) é contraindicada para:

- (A) idosos.
- (B) gestantes.
- (C) crianças entre 8 a 12 meses.
- (D) pessoas alérgicas a ovo.
- (E) pessoas com imunodepressão.

### QUESTÃO 20

Segundo o Guia para uso de Hemocomponentes do Ministério da Saúde (2015), qual é o tempo máximo para infusão de albumina?

- (A) 8h.
- (B) 6h.
- (C) 4h.
- (D) 2h.
- (E) 1h.

### QUESTÃO 21

Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº37, do Ministério da Saúde (2013), na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos da doença. Assinale a opção que apresenta o fator de baixo risco/intermediário.

- (A) Nefropatia.
- (B) Sexo masculino.
- (C) Diabetes Mellitus.
- (D) Estenose de carótida sintomática.
- (E) Ataque isquêmico transitório (AIT).

### QUESTÃO 22

Segundo o livro Enfermagem em terapia intensiva (2011), qual é o cuidado de enfermagem correto na realização da técnica do registro eletrocardiográfico?

- (A) Se o paciente tiver pelos em demasia no local, não é necessário realizar a tricotomia, visto que o eletrodo possui gel.
- (B) A derivação V1 é obtida posicionando o eletrodo no 4º espaço intercostal com a borda esternal direita.
- (C) A onda P, por vezes seguida da onda U, representa a regularização ventricular.
- (D) Alterações do complexo QRS e a onda ST podem ser observadas com o aumento do átrio.
- (E) Não é mais preconizada a identificação do eletrocardiograma com nome do paciente, idade, data e hora da realização do teste.

### QUESTÃO 23

Segundo o caderno da Anvisa de Medidas de Prevenção de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (2017), é uma medida para prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter vesical:

- (A) trocar todo o sistema a cada 96h.
- (B) manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
- (C) manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga.
- (D) realizar irrigação do cateter com antimicrobianos.
- (E) fechar previamente o cateter antes de removê-lo.

### QUESTÃO 24

De acordo com o livro Procedimentos de enfermagem: guia prático (2017), os profissionais de enfermagem devem ser orientados sobre como e quando realizar os cuidados, treinamentos e orientações sobre o protocolo de lesões por pressão. Dentre as principais recomendações, assinale a opção correta.

- (A) A avaliação nutricional deve ser realizada somente pela equipe de nutrição.
- (B) A realização de massagens sobre proeminências ósseas deve ser estimulada.
- (C) Deve-se utilizar sabão esfoliante e com pH mais ácido.
- (D) Os dispositivos do tipo anel ou boia não são recomendados.
- (E) Películas protetoras de poliuretano, espuma ou hidrocoloide extrafino devem ser utilizadas somente em lesões de terceiro grau.

### QUESTÃO 25

De acordo com o Ministério da Saúde, em seu caderno de Atenção Básica sobre Controle dos cânceres do colo do útero e mama (2013), a faixa etária para rastreamento do câncer do colo do útero é de:

- (A) 18 a 50 anos.
- (B) 21 a 65 anos.
- (C) 25 a 64 anos.
- (D) 40 a 69 anos.
- (E) 30 a 55 anos.

### QUESTÃO 26

De acordo com ANVISA (2010), qual o fator que favorece a contaminação do ambiente dos serviços de saúde?

- (A) Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies.
- (B) Isolar áreas em reformas ou em construção.
- (C) Profissionais de saúde manterem as mãos em contato com as superfícies.
- (D) Profissionais de saúde utilizarem técnicas básicas.
- (E) Manter as superfícies sempre limpas e secas.

### QUESTÃO 27

Segundo o livro Fundamentos da enfermagem (2017), qual processo refere-se à capacidade do sistema cardiovascular para bombear o sangue oxigenado para os tecidos e retornar o sangue desoxigenado para os pulmões?

- (A) Ventilação.
- (B) Perfusão.
- (C) Difusão.
- (D) Filtração.
- (E) Excreção.

### QUESTÃO 28

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde (2001), assinale a opção que apresenta os primeiros socorros em acidentes com aracnídeos.

- (A) Usar compressas mornas que auxiliam no alívio da dor.
- (B) Realizar tomiquete ou garrote na distância de 1(um) cm do local da picada.
- (C) Realizar corte próximo ao local da picada e drenar por 1(um) minuto.
- (D) Usar compressas com gelo ou água gelada, que auxiliam no alívio da dor.
- (E) Lavar o local da picada com solução alcoólica.

### QUESTÃO 29

Assinale a opção que NÃO apresenta uma contraindicação para aspiração das vias aéreas, segundo o livro Procedimentos e Intervenções de enfermagem (2017).

- (A) Cirurgia facial.
- (B) Distúrbio hemorrágico.
- (C) Epistaxe.
- (D) Pneumonia.
- (E) Laringoespasmó.

### QUESTÃO 30

Segundo o Guia para uso de Hemocomponentes do Ministério da Saúde (2015), as reações transfusionais são classificadas em:

- (A) imediatas, mediatas, tardias e irreversíveis.
- (B) imediatas, mediatas, reversíveis e irreversíveis.
- (C) imediatas, tardias, imunológicas e não imunológicas.
- (D) reversíveis, irreversíveis, imunológicas e não imunológicas.
- (E) mediatas, reversíveis, imunológicas e não imunológicas.

### QUESTÃO 31

Segundo o Caderno de Atenção Básica sobre Hipertensão Arterial (2014), são sintomas de crise hipertensiva:

- (A) cefaleia, alterações visuais, diminuição da força muscular/dormência, dor precordial e dispneia.
- (B) cefaleia, dispneia, afasia, dor precordial e poliúria.
- (C) dor precordial, disúria, alterações visuais, taquicardia e edema dos membros inferiores.
- (D) cefaleia, dor precordial, boca seca, poliúria e dispneia.
- (E) cefaleia, dispneia, dorsalgia, alterações visuais e taquicardia.

### QUESTÃO 32

De acordo com o Caderno de Atenção Básica, nº23, do Ministério da Saúde (2015), o aleitamento materno NÃO deve ser recomendado quando:

- (A) a mãe estiver em fase aguda da dengue.
- (B) a mãe estiver infectada pelo HTLV1 e HTLV2.
- (C) tiver ultrapassado o período de 24h do consumo de barbitúricos pela mãe.
- (D) tiver ultrapassado o período de 12h do consumo de morfina pela mãe.
- (E) a mãe for portadora da doença de Chagas, na fase crônica da doença.

### QUESTÃO 33

De acordo com a Resolução COFEN 564/2017, as infrações graves são as que:

- (A) provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (B) provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (C) ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- (D) provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou não causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- (E) provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.

### QUESTÃO 34

Segundo o Caderno de Atenção Básica sobre Diabetes Mellitus (2013), são sinais e sintomas de hipoglicemia:

- (A) fraqueza, bradicardia, dor de cabeça, tremor e dispneia.
- (B) fome, bradicardia, dor de cabeça, tremor e sudorese.
- (C) fraqueza, tremor, sudorese, dor de cabeça e taquicardia.
- (D) tontura, tremor, sudorese, dispneia e disúria.
- (E) dor de cabeça, dispneia, taquicardia, sudorese e poliúria.

### QUESTÃO 35

De acordo com a publicação da Anvisa "Assistência Segura: uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática" (2017), no que diz respeito ao preparo e à administração de medicamentos, uma das estratégias para prevenção de erros é o uso dos 9 (nove) certos. Assinale a opção que lista os 9 (nove) certos.

- (A) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente certa, direito a recusar o medicamento e anotação certa.
- (B) Armazenamento do medicamento certo, temperatura do medicamento certa, paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, compatibilidade medicamentosa e orientação ao paciente certa.
- (C) Armazenamento do medicamento certo, temperatura do medicamento certa, paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, orientação ao paciente certa e anotação certa.
- (D) Identificação do medicamento certa, paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, orientação ao paciente certa, direito a recusar o medicamento e anotação certa.
- (E) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, temperatura do medicamento certa, hora certa, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente certa, direito a recusar o medicamento e anotação certa.

### QUESTÃO 36

Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº37, do Ministério da Saúde (2013), sobre as condições padronizadas para a medida da pressão arterial, é correto afirmar que:

- (A) o paciente deve estar deitado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
- (B) na primeira vez, deve-se medir a pressão nos dois braços; se discrepantes, considerar o valor mais alto; nas vezes subsequentes, medir no mesmo braço (o direito de preferência).
- (C) a média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia; se os valores observados diferirem em mais de 5 (cinco) mmHg, não é necessário medir novamente.
- (D) deve-se evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 15 minutos precedentes.
- (E) devem ser utilizados manguitos adequados para a circunferência do braço de cada pessoa, a largura do manguito deve ser de pelo menos 30% do comprimento do braço, e o comprimento, de pelo menos 70% da circunferência do braço.

### QUESTÃO 37

De acordo com o Ministério da Saúde, em seu caderno de Atenção Básica sobre Controle dos cânceres do colo do útero e mama (2013), é fator de risco para o câncer de mama, EXCETO:

- (A) menopausa precoce.
- (B) obesidade.
- (C) sedentarismo.
- (D) história familiar.
- (E) primeira gestação após 30 anos.

### QUESTÃO 38

De acordo com o Calendário Vacinal da criança (2023), quais vacinas devem ser aplicadas ao nascer?

- (A) BCG e VIP.
- (B) Hepatite B e pneumo 10.
- (C) BCG e hepatite B.
- (D) BCG e pentavalente.
- (E) Hepatite A e meningococo C.

### QUESTÃO 39

Segundo o livro Procedimentos de enfermagem: guia prático (2017), assinale a opção que apresenta um medicamento antiarrítmico.

- (A) Epinefrina.
- (B) Propofol.
- (C) Enoxaparina.
- (D) Lidocaína.
- (E) Rocurônio.

### QUESTÃO 40

Qual situação pode ocasionar nível de consciência diminuído (confusão, letargia, coma), talvez sede, convulsão, quando se desenvolve rapidamente ou quando é muito intenso, e apresenta achados laboratoriais com nível de  $\text{Na}^+$  sérico acima de 145 mEq/L, segundo o livro Fundamentos da enfermagem (2017)?

- (A) Administração IV excessiva de SG5%.
- (B) Diabetes insípido.
- (C) Hormônio antidiurético excessivo.
- (D) Uso de soluções de irrigação hipotônicas.
- (E) Enemas de água corrente.

### QUESTÃO 41

De acordo com a publicação Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso (2010), sobre doença Meningocócica (DM), assinale a opção que apresenta o seguinte sinal clínico característico: "flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia, ao se tentar antefletir a cabeça".

- (A) Sinal de Filatov.
- (B) Sinal de Giordano.
- (C) Sinal de Kerning.
- (D) Sinal de Theodor.
- (E) Sinal de Brudzinski.

### QUESTÃO 42

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde (2001), quais são as possíveis reações tardias, que ocorrem de cinco a 24 dias após o uso da soroterapia antiveneno (SAV) também conhecidas como "Doença do Soro"?

- (A) Hipotermia, artralgia, linfadenomegalia, urticária e proteinúria.
- (B) Febre, artralgia, linfadenomegalia, urticária e proteinúria.
- (C) Hipotermia, cianose, sudorese e extremidades frias.
- (D) Alteração do nível de consciência, hipertermia, necrose e insuficiência respiratória.
- (E) Febre, cefaleia, náuseas, tiragem subcostal e cianose central.

### QUESTÃO 43

De acordo com o livro Fundamentos de Enfermagem (2011), qual é o termo técnico para dor muscular?

- (A) Mialgia.
- (B) Entorse.
- (C) Artralgia.
- (D) Lombalgia.
- (E) Cefaleia.

### QUESTÃO 44

Segundo a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação (2023), em menores de 2 anos, a vacina contra febre amarela NÃO deve ser administrada simultaneamente com qual vacina?

- (A) Tríplice viral.
- (B) VIP.
- (C) DTP.
- (D) Pentavalente.
- (E) Meningo C.

### QUESTÃO 45

Segundo a American Heart Association (2020), qual é o requisito correto para uma qualidade na ressuscitação cardiopulmonar?

- (A) Manter ventilação excessiva para uma melhor oxigenação.
- (B) Comprimir com força (pelo menos um centímetro) e rápido (50 a 60 compressões por minuto) e aguardar o retorno total do tórax.
- (C) Alternar os responsáveis pela compressão a cada 2 (dois) minutos, ou antes, se houver cansaço.
- (D) Utilizar relação compressão-ventilação de 30:2 com via aérea avançada.
- (E) Não utilizar capnografia quantitativa.

#### QUESTÃO 46

Assinale a opção que apresenta um medicamento que é um analgésico, antiagregante plaquetário, anti-inflamatório não esteróide (AINE), antitérmico e antirreumático, segundo o livro Cálculo e Administração de Medicamentos na Enfermagem (2021).

- (A) Fenobarbital.
- (B) Digoxina.
- (C) Ciprofloxacino.
- (D) Ácido acetilsalicílico.
- (E) Cefuroxima.

#### QUESTÃO 47

De acordo com a Resolução COFEN 564/2017, assinale a opção que apresenta o direito do profissional de enfermagem.

- (A) Recusar-se a executar prescrição médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
- (B) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- (C) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem.
- (D) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.
- (E) Esclarecer à pessoa, à família e à coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.

#### QUESTÃO 48

Segundo o Caderno de Atenção Básica sobre Diabetes Mellitus (2013), em caso de hipoglicemia grave, a primeira conduta no serviço de saúde deve ser administrar por via endovenosa:

- (A) soro fisiológico 0,9%.
- (B) soro glicosado 5%.
- (C) ringer lactato.
- (D) soro glicosado a 10%.
- (E) glicose a 50%.

#### QUESTÃO 49

Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº36, do Ministério da Saúde (2013), sobre as recomendações para armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, é correto afirmar que:

- (A) após aberto, o frasco não pode ser mantido em temperatura ambiente.
- (B) em crianças ou indivíduos muito magros, a agulha não pode ser introduzida em ângulo de 45 graus.
- (C) na ausência de bolsa térmica ou caixa de isopor, o transporte não pode ser realizado em bolsa comum.
- (D) após o uso, a seringa deve ser "recapada" pela pessoa.
- (E) é necessário limpar o local de aplicação com álcool.

#### QUESTÃO 50

Segundo o livro Procedimentos de enfermagem: guia prático (2017), assinale a opção que apresenta uma recomendação que NÃO constitui um cuidado para aplicação de compressa fria no paciente.

- (A) A água gelada pode ser adquirida colocando o frasco de água destilada (no volume necessário) na geladeira, antes do horário de realizar a compressa.
- (B) A indicação de compressa fria é feita de acordo com a avaliação médica ou de enfermagem e deve constar na prescrição.
- (C) Em pacientes com sensibilidade tátil diminuída, deve-se ter cuidado redobrado para evitar queimaduras e atentar-se para a avaliação da temperatura da água.
- (D) Quando forem necessárias aplicações com gelo, deve-se colocar o gelo em um saco plástico, envolver em uma compressa e aplicar no local indicado.
- (E) Em caso de retenção urinária, o uso de compressa de água fria na região suprapúbica relaxa a musculatura, induzindo a micção espontânea.

## PROVA DE REDAÇÃO

### INSTRUÇÕES


1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

### TEXTO I

O resultado da adoção das práticas éticas é a constituição do ambiente de trabalho saudável e propício à satisfação profissional das pessoas, aumento da capacidade organizacional de recrutar e manter talentos, fidelização dos clientes e agregação de valor à imagem da empresa. A adoção da postura clara e transparente e que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade social e suas atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas relações.

(Fonte: [www.ethos.org.br](http://www.ethos.org.br) - Instituto Ethos-Sebrae, Boletim Interno nº. 16, 2006. Acesso em 18 de junho 2024).

### TEXTO II



(Fonte: <https://blog.qualyilife.com.br/como-melhorar-o-clima-organizacional-dicas-praticas/>. Acesso em 18 de junho 2024).

**PROPOSTA DE REDAÇÃO** - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema "A ética profissional e o clima organizacional". Dê um título ao seu texto.















# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

