

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR  
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2012)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

- 1) De acordo com a Lei 7498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem, EXCETO:
- (A) participar da programação da assistência de enfermagem.
  - (B) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
  - (C) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
  - (D) participar da equipe de saúde.
  - (E) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- 2) Um paciente deu entrada em uma Unidade de Saúde apresentando tosse produtiva com secreção espumosa e esbranquiçada, intensa dispneia e agitação, retração dos espaços intercostais e supraclaviculares, distensão das veias cervicais, taquicardia e pressão arterial elevada, o que levou a equipe de enfermagem a suspeitar de um quadro de:
- (A) infarto agudo do miocárdio.
  - (B) acidente vascular encefálico.
  - (C) trombose venosa profunda.
  - (D) trauma abdominal fechado.
  - (E) edema agudo de pulmão.
- 3) Um paciente de 20 anos necessita viajar para o Distrito Federal. Esse paciente não possui a carteira de vacinação para comprovação de imunizações anteriores e não sabe informar seu estado vacinal. Tendo conhecimento do calendário de vacinação do adulto, quais vacinas devem ser administradas nesse paciente pelo profissional de enfermagem do posto de saúde?
- (A) Anti-tetânica, vacina contra Febre Amarela e Tríplice Viral.
  - (B) Anti-influenza e Anti-hepatite B.
  - (C) BCG e Anti-tetânica.
  - (D) BCG e Tríplice viral.
  - (E) Anti-influenza e Tetra Viral.

- 4) Assinale a opção que apresenta uma intervenção de enfermagem em um neonato com diagnóstico de Hidrocefalia.
- (A) Medir o perímetro cefálico diariamente.
  - (B) Colher o líquido para exame semanalmente.
  - (C) Manter a cabeceira do leito abaixo de zero grau.
  - (D) Medir a drenagem de hora em hora.
  - (E) Instalar oxigenioterapia preventiva a 3 litros/min.
- 5) Em relação à técnica correta de medição da pressão arterial, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) Se o manguito do esfigmomanômetro for pequeno para o paciente, resultará em leituras falsamente baixas.
  - ( ) A largura do manguito deve ser 40% da circunferência do ponto médio do membro que está sendo acessado.
  - ( ) Deve-se soltar lentamente o bulbo da válvula de pressão, deixando a agulha do manômetro cair a uma taxa de 2 a 3 mmHg por segundo.
  - ( ) O primeiro som de Korotkoff reflete a pressão sanguínea diastólica.
- (A) (F) (V) (V) (F)
  - (B) (F) (F) (V) (F)
  - (C) (F) (V) (F) (V)
  - (D) (V) (F) (F) (V)
  - (E) (V) (V) (F) (F)
- 6) Um paciente adulto chegou ao Pronto Socorro com queimaduras no membro superior direito e face anterior de tórax e abdome. De acordo com a Regra dos Nove, que estima a área de superfície corporal envolvida em uma queimadura, qual é o percentual de área de comprometimento neste paciente?
- (A) 9
  - (B) 10
  - (C) 18
  - (D) 20
  - (E) 36

- 7) Em relação à Dengue, pode-se afirmar que:
- (A) é uma doença emergente.
  - (B) não é necessária sua notificação.
  - (C) tem o Anopheles como principal vetor de transmissão do vírus ao indivíduo.
  - (D) é transmissível através do contato direto com secreções do indivíduo.
  - (E) o paciente apresenta febre de início súbito, cefaleia, mialgia, náuseas e exantema.
- 8) Segundo OGUISSO (2007), em relação à definição de Ética, é correto afirmar que:
- (A) é o estudo minucioso da lei do exercício profissional de enfermagem, no contexto da imperícia, imprudência e negligência.
  - (B) é um ramo da filosofia que estuda os juízos de apreciação que se referem à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal.
  - (C) é a prestação de informações adequadas ao cliente e à família a respeito da assistência de enfermagem.
  - (D) é o estudo de um contexto pluralista e interdisciplinar de problemas advindos de avanços tecnológicos.
  - (E) é o trabalho em equipe e o compromisso de ser fiel no relacionamento com o paciente.
- 9) São fatores de risco para úlceras por pressão, EXCETO:
- (A) imobilidade ou mobilidade comprometida.
  - (B) idade avançada e debilitação.
  - (C) incontinência de urina e fezes.
  - (D) uso prolongado de vasodilatadores.
  - (E) perfusão cutânea deficiente.
- 10) Dentre as opções abaixo, qual é considerada uma consequência comum das modificações fisiológicas do organismo da gestante?
- (A) Colo uterino endurecido.
  - (B) Hipercolesterolemia.
  - (C) Aréolas hipopigmentadas.
  - (D) Diminuição do volume de sangue circulante.
  - (E) Polaciúria.

- 11) Correlacione as terminologias referentes à infecção hospitalar com as suas respectivas definições e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

TERMINOLOGIAS	DEFINIÇÕES
I - ANTISSEPISIA	( ) Infecção transmitida entre pacientes.
II - ASSEPSIA	( ) Conjunto de meios para impedir a multiplicação bacteriana em tecidos vivos.
III- INFECÇÃO CRUZADA	( ) Destruição de todas as formas de microorganismos por meio de agentes físico-químicos.
IV - INFECÇÃO	( ) Invasão e multiplicação microbiana nos tecidos e órgãos de um hospedeiro.
V - ESTERILIZAÇÃO	( ) Conjunto de meios para impedir a contaminação microbiana.
VI - INFECÇÃO HOSPITALAR	

(A) (III) (I) (V) (IV) (II)  
(B) (VI) (II) (V) (III) (I)  
(C) (VI) (V) (I) (III) (II)  
(D) (III) (V) (I) (III) (II)  
(E) (VI) (V) (II) (III) (I)

- 12) A síndrome caracterizada por paroxismos de dor ou sensação de opressão na região anterior do tórax, que surge como consequência de um fluxo sanguíneo coronariano insuficiente ou de um suprimento inadequado de oxigênio ao tecido miocárdico, denomina-se:

- (A) Insuficiência Cardíaca Congestiva.  
(B) Infarto do Miocárdio.  
(C) Endocardite.  
(D) Angina Pectoris.  
(E) Hipertensão Arterial.

- 13) Qual dos medicamentos descritos abaixo é utilizado na estabilização do humor e uma intoxicação com este medicamento é considerada uma emergência com risco de vida?

- (A) Lítio.  
(B) Diazepam.  
(C) Buscopan.  
(D) Paracetamol.  
(E) Clonazepam.

Prova : Amarela  
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : CP-CAP/12

- 14) Assinale a opção que apresenta o cuidado de enfermagem adequado a um paciente em uso de punção venosa periférica que apresente flebite.
- (A) Instilar soro fisiológico 0,9% no local.
  - (B) Interromper a infusão e retirar o cateter.
  - (C) Aplicar compressa de gelo sem interromper a infusão.
  - (D) Aguardar a decisão médica.
  - (E) Aplicar Repartil gel sem interromper a infusão.
- 15) A Salmonelose é uma forma de intoxicação alimentar que causa gastroenterite aguda. Segundo Pegoraro e Hermann (2006), os alimentos que mais causam salmonelose são:
- (A) iogurtes e massas.
  - (B) enlatados, frutas e iogurtes.
  - (C) ovos, carnes e leite.
  - (D) frutas, carnes e massas.
  - (E) enlatados e massas.
- 16) Uma paciente deu entrada em uma maternidade no dia 28-05-2012, com sinais de trabalho de parto ativo. Tendo informado que a data de sua última menstruação (DUM) foi 15-08-2011, sua idade gestacional é de:
- (A) 40 semanas e 6 dias.
  - (B) 41 semanas.
  - (C) 39 semanas.
  - (D) 39 semanas e 5 dias.
  - (E) 40 semanas e 5 dias.
- 17) Em relação às hepatites virais, é INCORRETO afirmar que:
- (A) a hepatite B é transmissível de pessoa para pessoa por meio da relação sexual, transfusão sanguínea e seringas contaminadas.
  - (B) a hepatite A raramente é transmitida por transfusão sanguínea.
  - (C) existe vacina disponível para hepatite C.
  - (D) a hepatite A é transmissível por via fecal-oral e é mais comum na infância.
  - (E) as hepatites A, B e C acometem o fígado.

- 18) Puerpério é o período de aproximadamente 6 semanas após o parto. Em relação a este período considera-se normal a ocorrência de:
- (A) perda do tampão mucoso.
  - (B) dequitação da placenta.
  - (C) degeneração da cérvix uterina.
  - (D) progressão uterina.
  - (E) liberação de lóquios.
- 19) A lipodistrofia é uma complicação decorrente do uso de insulina subcutânea. Para preveni-la deve-se:
- (A) colocar compressa de gelo antes da aplicação da insulina.
  - (B) colocar compressa morna após a aplicação da insulina.
  - (C) aquecer o frasco de insulina com água morna antes de administrá-la.
  - (D) realizar o rodízio dos locais de aplicação.
  - (E) aplicar a insulina sempre na região periumbilical.
- 20) As sondas para alimentação são usadas para atender às necessidades nutricionais, quando a ingestão oral é inadequada ou impossível. No entanto, a dietoterapia enteral pode apresentar complicações, dentre elas:
- (A) oligúria.
  - (B) diarreia.
  - (C) arritmia.
  - (D) polaciúria.
  - (E) taquicardia.
- 21) Assinale a opção que apresenta um cuidado de enfermagem essencial no pós-operatório imediato de biópsia hepática.
- (A) Verificar a pressão arterial a cada 12 horas.
  - (B) Fazer reserva de sangue compatível.
  - (C) Deitar o paciente com um travesseiro sob a borda costal direita por duas horas.
  - (D) Aplicar compressa de gelo sobre o curativo cirúrgico.
  - (E) Estimular a deambulação até seis horas após o procedimento.

- 22) Ao administrar uma medicação errada a um paciente, o profissional de enfermagem estará cometendo um ato de:
- (A) imperícia.
  - (B) violação dos direitos do paciente.
  - (C) imprudência.
  - (D) agressão.
  - (E) negligência.
- 23) Assinale a opção que corresponde à tríade clássica da pré-eclâmpsia.
- (A) Hipertensão, proteinúria e cefaleia.
  - (B) Hipertensão, proteinúria e edema.
  - (C) Hipotensão, edema e proteinúria.
  - (D) Hipotensão, hipotermia e tremores.
  - (E) Hipertensão, cefaleia e edema.
- 24) O cateterismo vesical é um procedimento que pode ter como complicação:
- (A) bexigoma.
  - (B) hiponatremia.
  - (C) hemorragia.
  - (D) incontinência urinária.
  - (E) infecção urinária.
- 25) Um paciente adulto foi submetido a uma biópsia renal na unidade hospitalar em que estava internado. A equipe de enfermagem deve adotar a seguinte conduta, como cuidado pós-biópsia:
- (A) o paciente deve ser encorajado a deambular nas primeiras doze horas após o procedimento.
  - (B) os sinais vitais devem ser checados a cada 30 minutos na primeira hora pós-biópsia.
  - (C) sintomas como dor nas costas e disúria são comuns e apenas devem ser registrados, mas não necessitam ser comunicados imediatamente.
  - (D) toda a urina eliminada pelo paciente deve ser examinada para se evidenciar sinais de sangramento.
  - (E) o curativo compressivo no local da punção deve ser retirado na primeira hora para evitar desconforto ao paciente.



- 26) Um importante cuidado de enfermagem na assistência neonatal é a administração de 1 mg de vitamina K no recém-nascido, com o objetivo de prevenir a Doença Hemorrágica do Recém-Nascido. A via de administração da vitamina K nesse caso é:
- (A) intramuscular.
  - (B) subcutânea.
  - (C) oral.
  - (D) ocular.
  - (E) sublingual.
- 27) Em relação à infecção pelo vírus da influenza, pode-se afirmar que:
- (A) é possível confirmar a infecção através dos sinais e sintomas do paciente.
  - (B) não possui vacinação preventiva.
  - (C) a vacinação é realizada de forma aleatória, de acordo com o período do ano e região.
  - (D) a transmissão inter-humana ocorre através das vias respiratórias.
  - (E) os tipos A e B não causam mortalidade.
- 28) Segundo o Manual de Procedimentos de Vacinação do Ministério da Saúde, para que sejam conservadas as propriedades dos imunobiológicos, estes devem ser conservados em refrigeradores a uma temperatura entre:
- (A) +4 e +12°C
  - (B) +2 e +8°C
  - (C) 0 e +8°C
  - (D) -2 e +8°C
  - (E) -6 e +12°C
- 29) Assinale a opção que apresenta um cuidado de enfermagem ao paciente em pós-operatório de toracotomia.
- (A) Manter a cabeceira do leito a 15°.
  - (B) Incentivar a deambulação precoce.
  - (C) Aspirar vias aéreas de duas em duas horas.
  - (D) Estimular a tosse.
  - (E) Verificar frequência, profundidade e padrão respiratório.

- 30) Assinale a opção que apresenta três doenças que exigem isolamento respiratório.
- (A) Sarampo, Meningite e Dengue.
  - (B) Sarampo, Raiva e Poliomielite.
  - (C) Coqueluche, Tuberculose e Febre Amarela.
  - (D) AIDS, Tuberculose e Leishmaniose.
  - (E) Sarampo, Meningite Meningocócica e Tuberculose.
- 31) Assinale a opção que apresenta um cuidado de enfermagem adequado ao paciente em crise convulsiva.
- (A) Manter a boca aberta com auxílio de um objeto.
  - (B) Colocar o paciente em decúbito ventral.
  - (C) Manter grades do leito abaixadas.
  - (D) Manter cabeça livre para não prejudicar a respiração do paciente.
  - (E) Afrouxar as roupas constrictivas.
- 32) Um paciente em pós-operatório imediato de uma grande cirurgia abdominal sofreu uma deiscência de sutura da ferida operatória, com evisceração. Qual procedimento deve ser adotado pela equipe de enfermagem?
- (A) Colocar o órgão exposto de volta à cavidade abdominal e fazer curativo compressivo.
  - (B) Proteger o órgão exposto com compressa estéril embebida em soro fisiológico.
  - (C) Realizar novo curativo no local, sem tentar recolocar o órgão exposto na cavidade abdominal.
  - (D) Proteger o órgão exposto com gaze estéril seca.
  - (E) Chamar imediatamente a equipe médica, sem tocar no local da evisceração.
- 33) Assinale a opção que apresenta exemplos de sinais de choque hipovolêmico.
- (A) Visão turva e desvio de comissura labial.
  - (B) Náuseas, vômitos e bradicardia.
  - (C) Pele fria e pegajosa, pulso fraco e rápido.
  - (D) Sudorese e hipertensão.
  - (E) Pulso lentificado e rubor facial.

- 34) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, de acordo com o "Contexto Biopsicossocial dos Cuidados de Enfermagem Psiquiátrica", assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) O ritmo circadiano é como uma rede de relógios internos que regulam e coordenam eventos dentro do corpo, de acordo com um ciclo aproximado de 24 horas.
  - ( ) A irritabilidade pode sugerir um distúrbio de ansiedade. A apatia pode estar ligada à depressão, e o comportamento sedutor pode ter relação com a doença bipolar.
  - ( ) A ideação suicida não é comum em pacientes com distúrbios de ansiedade e esquizofrenia.
  - ( ) Os fatores de risco socioculturais para a doença psiquiátrica compreendem: idade, etnia, sexo, nível de instrução, nível de renda e sistema de crença.
  - ( ) O movimento corporal excessivo pode estar associado à ansiedade, mania ou uso abusivo de estimulantes.
- (A) (V) (V) (V) (V) (V)  
(B) (V) (V) (F) (V) (V)  
(C) (V) (V) (V) (F) (F)  
(D) (F) (F) (V) (V) (F)  
(E) (V) (F) (V) (V) (V)
- 35) De acordo com Brunner (2009), assinale a opção correta em relação a administração de sangue e hemoderivados e suas possíveis complicações.
- (A) Se o sangue precisar ser amornado, deve-se fazê-lo esquentando em água.
  - (B) O tempo de administração não deve exceder 6 horas.
  - (C) Os sinais vitais devem ser registrados antes de iniciar a transfusão e monitorados a intervalos regulares durante todo o procedimento.
  - (D) A transfusão de Plasma Fresco não possui riscos.
  - (E) Medicamentos podem ser administrados na mesma linha de infusão do sangue ou hemoderivados.
- 36) O meio mais eficiente de quebrar a cadeia de infecção é através
- (A) do uso de luvas.
  - (B) da colocação de pacientes em isolamento.
  - (C) da higiene das mãos.
  - (D) do fornecimento de quartos privativos para os pacientes.
  - (E) da restrição de visitas aos pacientes.

Prova : Amarela  
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : CP-CAP/12

- 37) Um paciente será submetido a um procedimento cirúrgico na região do períneo. A equipe de enfermagem, ao prepará-lo sobre a mesa cirúrgica, deverá colocá-lo na seguinte posição:
- (A) litotômica.
  - (B) trendelemburg.
  - (C) posição de Sims.
  - (D) decúbito lateral direito.
  - (E) decúbito lateral esquerdo.
- 38) São cuidados do técnico de enfermagem ao neonato em um pós-operatório, EXCETO:
- (A) verificar sinais vitais.
  - (B) realizar o balanço hídrico.
  - (C) observar sinais de infecção.
  - (D) realizar coleta de sangue para gasometria.
  - (E) monitorizar padrão respiratório.
- 39) Os instrumentais, objetos, utensílios e acessórios de equipamentos utilizados nos procedimentos invasivos da pele, mucosas, tecidos subepiteliais e sistema vascular são classificadas como artigos
- (A) semicríticos.
  - (B) críticos.
  - (C) descartáveis.
  - (D) não-críticos.
  - (E) processados.
- 40) A administração de medicamentos através de um aparelho que transforma um medicamento líquido em vapor denomina-se:
- (A) infusão.
  - (B) oxigenioterapia.
  - (C) instilação.
  - (D) pressão contínua.
  - (E) nebulização.

- 41) A Escala de Apgar é um instrumento de avaliação da vitalidade do neonato no primeiro e quinto minutos de vida. Ela avalia os seguintes parâmetros: cor da pele; tônus muscular;
- (A) frequência cardíaca; temperatura corpórea.
  - (B) frequência cardíaca; peristalse; frequência respiratória.
  - (C) frequência cardíaca; esforço respiratório; irritabilidade reflexa.
  - (D) esforço respiratório; temperatura corpórea; frequência cardíaca.
  - (E) frequência respiratória; irritabilidade reflexa; temperatura corpórea.
- 42) Assinale a opção que NÃO é considerada uma complicação da hemodiálise.
- (A) Hipertensão.
  - (B) Hipotensão.
  - (C) Câibra.
  - (D) Embolia gasosa.
  - (E) Náuseas.
- 43) O Captopril é um medicamento classificado como:
- (A) antibiótico.
  - (B) sedativo.
  - (C) broncodilatador.
  - (D) antiagregador plaquetário.
  - (E) anti-hipertensivo.
- 44) Assinale a opção que apresenta uma vantagem do aleitamento materno e do leite materno.
- (A) Aumento ponderal da mãe.
  - (B) Não fornece gordura ao neonato.
  - (C) Oferece proteção contra diarreia infecciosa.
  - (D) Diminui a incidência de insuficiência renal.
  - (E) Diminui a absorção de proteína.

45) Em relação ao câncer de mama, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas frases abaixo e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) A incidência de câncer de mama é mais elevada nas mulheres acima de 65 anos.
- ( ) Não há causas específicas para seu surgimento, mas um grupo de fatores de risco.
- ( ) Não são considerados fatores de risco para o câncer de mama a história familiar, obesidade e reposição hormonal.
- ( ) O aspecto de casca de laranja da pele e a retração do mamilo são sintomas clássicos encontrados em pacientes nos estágios iniciais do câncer de mama.
- ( ) O tratamento pode ser cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, podendo estes estarem associados ou não.

- (A) (V) (V) (F) (F) (V)
- (B) (V) (V) (F) (V) (V)
- (C) (F) (V) (F) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V) (F)
- (E) (F) (F) (V) (F) (V)

46) A técnica de aplicação de medicamentos por via subcutânea deve ser realizada no ângulo de:

- (A) 90° com agulha 13 x 4,0
- (B) 45° com agulha 13 x 4,0
- (C) 15° com agulha 25 x 7,0
- (D) 70° com agulha 40 x 12
- (E) 90° com agulha 25 x 7,0

47) O Diabetes Mellitus pode cursar com complicações agudas ou a longo prazo. Assinale a opção que apresenta uma complicação aguda desta doença.

- (A) Doença vascular cerebral.
- (B) Retinopatia diabética.
- (C) Nefropatia.
- (D) Cetoacidose diabética.
- (E) Neuropatia.

- 48) Qual das doenças abaixo é considerada uma zoonose de grande importância social e econômica, pois apresenta elevada incidência, alto custo hospitalar e alta letalidade; tem sua ocorrência relacionada às precárias condições sanitárias; e, nos quadros leves, o paciente pode apresentar febre, cefaleia e mialgia, e, na forma grave, é conhecida como Síndrome de Weil?
- (A) Peste.
  - (B) Raiva.
  - (C) Leptospirose.
  - (D) Leishmaniose tegumentar.
  - (E) Leishmaniose visceral.
- 49) No atendimento a uma vítima de parada cardiorrespiratória, para uma massagem cardíaca adequada, o socorrista deve:
- (A) se posicionar acima da cabeça da vítima.
  - (B) manter os braços em extensão, com as articulações dos cotovelos fixas, transmitindo ao esterno da vítima a pressão exercida pelo peso dos ombros e do tronco.
  - (C) aplicar uma pressão no tórax suficiente para deprimir o esterno da vítima de 7 a 10 cm, no caso de a vítima ser um adulto.
  - (D) realizar 20 compressões torácicas para 2 ventilações, independente do número de socorristas.
  - (E) manter a vítima em decúbito dorsal, numa superfície macia e confortável.
- 50) Para administrar Keflin 300 mg EV de 6/6 horas, conforme prescrição médica, se o frasco disponível for de 1,0 grama, em quanto deve ser diluído e administrado, respectivamente, este medicamento?
- (A) 20 ml e 12 ml
  - (B) 10 ml e 2 ml
  - (C) 20 ml e 6 ml
  - (D) 10 ml e 6 ml
  - (E) 20 ml e 3 ml