

衣原体 (Chlamydia)

衣原体是一种常见细菌性 STI，在没有避孕套或其他保护措施的情况下通过性交传染。

资料快速一览

- 衣原体会感染宫颈、尿道、肛门、喉咙和眼睛。
- 大多数有衣原体感染的人没有症状
- 抗生素对治疗衣原体很有效

这是什么病？(What is this?)

衣原体是一种常见细菌性传染病 (STI)。

如果你有阴道，衣原体会感染宫颈、肛门和喉咙，偶尔还有眼睛。

如果你有阴茎，衣原体会感染尿道、肛门和喉咙，偶尔还有眼睛。

你怎么会得这种病？(How do you get it?)

和有衣原体感染的人进行性交、肛交和口交时会得衣原体。

使用避孕套或保护膜能减少得衣原体的机会。

有哪些症状？(What are the symptoms?)

大多数人没有症状

阴道 (Vagina)

如果你有阴道，你有可能经历：

- 阴道分泌物有变化
- 异常出血（特别是性交之后）
- 盆腔疼痛，包括在性交时感到疼痛
- 小便时有刺痛或灼烧感

阴茎 (Penis)

如果你有阴茎，你有可能经历：

- 阴茎开口处发红
- 小便时有刺痛或灼烧感
- 阴茎有分泌物（通常透明的颜色）
- 阴囊疼痛发肿大

肛门 (Anus)

肛门可能有分泌物、出血或疼痛

如何做检查？ (How do you test for it?)

衣原体检查要么采用尿检、要么采用宫颈、阴道、喉咙或肛门的拭子检查。

如何治疗？ (How is it treated?)

抗生素对治疗衣原体很有效不过，如果怀疑有并发症，需要加长治疗时间。


如果你有症状，开始治疗后过几天症状通常会消失。

如果开始治疗后过了一周仍有症状，你应该再去看医生。

不治疗的话是否出现并发症？ (Are there any complications if not treated?)

如果你有阴道，有衣原体不治的话会引起盆腔炎（PID），这是一种子宫和输卵管的感染。PID 会导致不孕。

如果你有阴茎，有衣原体不治的话会导致不孕。

 了解盆腔炎的更多资料：StaySTIFree (staystifree.org.au)

治疗后有可能复发吗？ (Is it likely to come back after treatment?)

要避免复发、把衣原体传给其他人：

- 开始治疗后一周内不应该有任何性接触，戴避孕套或保护膜也不行。
- 开始治疗后一周内不应该与任何伴侣有任何性生活。
- 如果你的伴侣在你之后接受治疗，就是说在他们开始接受治疗后一周内不应该有性生活。否则你可能再次感染，需要重新接受治疗。

我们建议治疗后一个月再做一次肛门衣原体检查、治疗后三个月在做一次其他所有类型的衣原体检查。

如何保护自己？ (How can I protect myself?)

避免再感染衣原体的最佳保护办法是：

- 让你的性伴侣知道你有过衣原体感染
- 确保你现在的性伴侣也接受衣原体的治疗
- 与今后的伴侣使用避孕套或其他保护措施。

告诉他们 (Let them know)

当你确诊得像这样的 STI 时，最近几个月所有性伴侣都应该让医生检查。

你所有的性伴侣（经常的和临时的）都要做检查，这非常重要，因为 STIs 不治的话以后有可能带来严重的问题。

如果你难以向你的伴侣启齿，你可以参考 [Let Them Know \(告诉他们\)](http://letthemknow.org.au) (letthemknow.org.au)里的谈话、电子邮件、短信和信函样本，亲自或匿名向你的伴侣传递这方面的信息。

去哪里寻求帮助 (Where can I get help?)

- 去你附近的性健康诊所
- 去看你本地的医生
- 去你本地的社区健康中心

查找性健康服务机构：StaySTIFree (staystifree.org.au)

免责声明 (DISCLAIMER)

本资料单提供普通性健康信息，其意图不是替代咨询医生的需要。

如果你担心你的健康问题，你应该去请教医生。

如果你有紧急需要，你应该去最近的急诊部或拨打 000。